

**Филиал РГП «Казгидромет» по Жамбылской области Министерства экологии
и природных ресурсов Республики Казахстан**



ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ О СОСТОЯНИИ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ ЖАМБЫЛСКОЙ ОБЛАСТИ

II квартал 2025 года

**Тараз
2025 год**

	СОДЕРЖАНИЕ	Стр.
	Предисловие	3
1	Основные источники загрязнения атмосферного воздуха	4
2	Мониторинг качества атмосферного воздуха г. Тараз	4
2.1	Мониторинг качества атмосферного воздуха г. Жанатас	6
2.2	Мониторинг качества атмосферного воздуха г. Каратау	7
2.3	Мониторинг качества атмосферного воздуха г. Шу	8
2.4	Мониторинг качества атмосферного воздуха с. Кордай	10
3	Состояние качества атмосферных осадков	11
4	Состояние качества поверхностных вод	11
5	Радиационная обстановка Жамбылской области	13
6	Состояние загрязнения почв тяжёлыми металлами	13
	Приложение 1	14
	Приложение 2	16
	Приложение 3	18

Предисловие

Информационный бюллетень подготовлен по результатам работ, выполняемых специализированными подразделениями РГП «Казгидромет» по ведению мониторинга за состоянием окружающей среды на наблюдательной сети национальной гидрометеорологической службы.

Бюллетень предназначен для информирования государственных органов, общественности и населения о состоянии окружающей среды на территории Жамбылской области и необходим для дальнейшей оценки эффективности мероприятий в области охраны окружающей среды РК с учетом тенденции происходящих изменений уровня загрязнения.

Оценка качества атмосферного воздуха Жамбылской области

1. Основные источники загрязнения атмосферного воздуха

Согласно данным департамента статистики Жамбылской области фактические суммарные выбросы загрязняющих веществ от стационарных источников в Жамбылской области составляют 51,2 тысяч тонн. В г.Тараз фактические суммарные выбросы загрязняющих веществ от стационарных источников составляют 24,8 тысяч тонн.

В Жамбылской области наличие зарегистрированных автотранспортных средств составляет 276,9 т.ед.

Согласно данным департамента статистики в Жамбылской области в городе Тараз насчитывается 36 474 индивидуальных домов; в городе Жанатас 1439 индивидуальных домов; городе Каратау 3 185 индивидуальных домов; городе Шу 6 650 индивидуальных домов. В городских населенных пунктах удельный вес общей площади оборудованной газом 100%, водоснабжением 100%, в сельских населенных пунктах газом 100%, водоснабжением 100%.

2. Мониторинг качества атмосферного воздуха в г.Тараз

Наблюдения за состоянием атмосферного воздуха на территории г. Тараз проводятся на 5 постах наблюдения, в том числе на 4 постах ручного отбора проб и на 1 автоматической станции (Приложение 1).

В целом по городу определяется до 13 показателей: 1) взвешенные частицы (пыль), 2) диоксид серы; 3) оксид углерода; 4) диоксид азота; 5) оксид азота; 6) фтористый водород; 7) формальдегид; 8) сероводород; 9) бенз(а)пирен; 10) марганец; 11) свинец; 12) кобальт; 13) кадмий.

В таблице 1 представлена информация о местах расположения постов наблюдений и перечне определяемых показателей на каждом посту.

Таблица 1

Место расположения постов наблюдений и определяемые примеси

№	Отбор проб	Адрес поста	Определяемые примеси
1	ручной отбор проб	ул. Чимкентская, 22	взвешенные частицы (пыль), диоксид серы, оксид углерода, диоксид азота, оксид азота, фтористый водород, формальдегид, бенз(а)пирен, свинец, марганец, кадмий, кобальт.
2		ул. Рысбек батыра, 15, угол ул. Ниеткалиева	
3		угол ул. Абая и Толе би	
4		Пересечение ул.Байзак батыра и проспекта Абая	
6	в непрерывном режиме – каждые 20 минут	ул. Сатпаева и проспект Жамбыла	диоксид серы, оксид углерода, сероводород

Результаты мониторинга качества атмосферного воздуха г. Тараз за 2 квартал 2025 года.

По данным стационарной сети наблюдения уровень загрязнения атмосферного воздуха города **Тараз** характеризуется как «**низкий**», он определялся значением СИ=1,2 (низкий) по оксиду углерода в районе ПНЗ №6 (ул. Сатпаева и проспект Жамбыла) и НП=0% (низкий) В загрязнение атмосферного воздуха основной вклад внес оксид углерода (количество превышений ПДК за 2 квартал: 5 случаев).

Максимальные разовые концентрации оксида углерода составили 1,2 ПДК_{м.р.}, взвешенных веществ (пыль) 1,0 ПДК_{м.р.}, концентрации других загрязняющих веществ и тяжелых металлов в атмосферном воздухе не превышали ПДК. Превышения по среднесуточным нормативам наблюдались по диоксиду азота 1,5 ПДК_{с.с.}.

Случаи экстремально высокого и высокого загрязнения (ВЗ и ЭВЗ): ВЗ (более 10 ПДК) и ЭВЗ (более 50 ПДК) не были отмечены.

Фактические значения, а также кратность превышений нормативов качества и количество случаев превышения указаны в Таблице 2.


Таблица 2

Характеристика загрязнения атмосферного воздуха

Примесь	Средняя концентрация		Максимальная разовая концентрация		НП %	Число случаев превышения ПДК _{м.р.}		
	мг/м ³	Кратность ПДК _{с.с.}	мг/м ³	Кратность ПДК _{м.р.}		> ПДК	>5 ПДК	>10 ПДК
							В том числе	
г. Тараз								
Взвешенные частицы (пыль)	0,114	0,76	0,5	1,00	0,00	0	0	0
Диоксид серы	0,013	0,27	0,371	0,74	0,00	0	0	0
Оксид углерода	0,913	0,30	6,2	1,23	0,07	5	0	0
Диоксид азота	0,059	1,47	0,18	0,90	0,00	0	0	0
Оксид азота	0,04	0,67	0,12	0,30	0,00	0	0	0
Фтористый водород	0,002	0,41	0,013	0,65	0,00	0	0	0
Формальдегид	0,007	0,67	0,024	0,48	0,00	0	0	0
Сероводород	0,0004		0,002	0,25	0,00	0	0	0
Бенз(а)пирен	0,00023	0,23	0,0006					
Свинец	0,000022	0,072	0,000069					
Марганец	0,000028	0,028	0,000058					
Кадмий	0	0	0					
Кобальт	0	0	0					

Выводы:

Последние пять лет уровень загрязнения атмосферного воздуха во 2 квартале менялся следующим образом:



Из графика видно, что уровень загрязнения атмосферного воздуха оценивается как повышенный, как низкий в 2025 году.

Количество превышений максимально-разовых ПДК было отмечено по оксиду углероду (5 случаев). Превышения нормативов среднесуточных концентраций наблюдались по диоксиду азота.

Увеличение среднесуточных показателей диоксида азота свидетельствует о значительном вкладе в загрязнение воздуха автотранспорта на загруженных перекрестках города и о постоянном накоплении этого загрязняющего вещества в атмосфере города. Основными источниками загрязнения оксидом углерода является автотранспорт и сжигание твердого топлива. Взвешенные вещества (пыль) это твёрдые частицы и жидкие капли, находящиеся в воздухе. Это смесь разных видов частиц органического и неорганического происхождения, включая пыль, пыльцу, сажу, дым и т.д

Метеорологические условия

Погодные условия за 2 квартал определяла частая смена барических образований. В апреле в горных районах области временами наблюдались осадки (дождь, снег), в других районах области временами дождь, гроза, в 1-ой и во 2-ой декадах град. При прохождении атмосферных фронтальных разделов наблюдалось усиление ветра до 15-20 м/с.

Выпадение осадков, в виде кратковременных дождей в мае, июне было связано с влиянием циклонов и связанных с ним атмосферных разделов. Гроза в мае и в июне наблюдалась часто, жара до 37-42 градусов наблюдалась в середине 2-ой декады.

Количество выпавших осадков во 2-ом квартале было меньше нормы и составило в апреле 20%, в мае 20%, в июне 14%.

Количество дней с НМУ во 2-ом квартале (неблагоприятные метеорологические условия) не наблюдалось.

2.1 Мониторинг качества атмосферного воздуха в г.Жанатас

Наблюдения за состоянием атмосферного воздуха на территории г. Жанатас проводятся на 1 автоматической станции (Приложение 1).

В целом по городу определяется до 5 показателей: 1) диоксид серы; 2) оксид углерода; 3) диоксид азота; 4) оксид азота, 5) аммиак.

В таблице 3 представлена информация о месте расположения поста наблюдений и перечне определяемых показателей на посту.

Таблица 3

Место расположения постов наблюдений и определяемые примеси

№	Отбор проб	Адрес поста	Определяемые примеси
1	в непрерывном режиме – каждые 20 минут	учетный квартал 001, №18	диоксид серы, оксид углерода, диоксид азота, оксид азота, аммиак

Результаты мониторинга качества атмосферного воздуха в г. Жанатас за 2 квартал 2025 года.

По данным сети наблюдений, уровень загрязнения атмосферного воздуха города Жанатас оценивался как **«низкий»**, он определялся значением СИ равным 0,2 (низкий) по оксиду углероду и НП = 0% (низкий).

Средние концентрации и максимальные разовые концентрации загрязняющих веществ не превышали ПДК.

Случаи экстремально высокого и высокого загрязнения (ВЗ и ЭВЗ): ВЗ (более 10 ПДК) и ЭВЗ (более 50 ПДК) не были отмечены.

Фактические значения, а также крастность превышений нормативов качества и количество случаев превышения указаны в Таблице 4.


Таблица 4

Характеристика загрязнения атмосферного воздуха

Примесь	Средняя концентрация		Максимальная разовая концентрация		НП	Число случаев превышения ПДК _{м.р.}		
	мг/м ³	Кратность ПДК _{с.с.}	мг/м ³	Кратность ПДК _{м.р.}	%	> ПДК	>5 ПДК	>10 ПДК
							В том числе	
г. Жанатас								
Диоксид серы	0,017	0,34	0,026	0,05	0,00	0	0	0
Оксид углерода	0,274	0,09	1,075	0,21	0,00	0	0	0
Диоксид азота	0,031	0,78	0,035	0,17	0,00	0	0	0
Оксид азота	0,013	0,21	0,035	0,09	0,00	0	0	0
Аммиак	0,0006	0,15	0,008	0,04	0,00	0	0	0

Выводы:

Последние пять лет уровень загрязнения атмосферного воздуха во 2 квартале менялся следующим образом:



Из графика видно, что уровень загрязнения оценивался как низкий в 2021, 2024, 2025 годах, в 2022, 2023 годах как повышенный.

2.2 Мониторинг качества атмосферного воздуха в г. Каратау

Наблюдения за состоянием атмосферного воздуха на территории г. Каратау проводятся на 1 автоматической станции (Приложение 1).

В целом по городу определяется 2 показателя: 1) диоксид серы; 2) оксид углерода.

В таблице 5 представлена информация о месте расположения поста наблюдений и перечне определяемых показателей на посту.

Таблица 5

Место расположения постов наблюдений и определяемые примеси

№	Отбор проб	Адрес поста	Определяемые примеси
1	в непрерывном режиме каждые 20 минут	ул. Тамды аулие, №130	диоксид серы, оксид углерода

Результаты мониторинга качества атмосферного воздуха в г. Каратау во 2 квартале 2025 года.

По данным сети наблюдений, уровень загрязнения атмосферного воздуха города **Каратау** характеризовался как «**низкий**», он определялся значением СИ равным 0,3 (низкий) по диоксиду серы и значением НП =0% (низкий).

Средние концентрации и максимальные разовые концентрации загрязняющих веществ не превышали ПДК.

Случаи экстремально высокого и высокого загрязнения (ВЗ и ЭВЗ): ВЗ (более 10 ПДК) и ЭВЗ (более 50 ПДК) не были отмечены.

Фактические значения, а также кратность превышений нормативов качества и количество случаев превышения указаны в Таблице 6.


Таблица 6

Характеристика загрязнения атмосферного воздуха

Примесь	Средняя концентрация		Максимальная разовая концентрация		НП	Число случаев превышения ПДК _{м.р.}		
	мг/м ³	Кратность ПДК _{с.с.}	мг/м ³	Кратность ПДК _{м.р.}	%	> ПДК	>5 ПДК	>10 ПДК
							В том числе	
г. Каратау								
Диоксид серы	0,044	0,88	0,128	0,26	0,00	0	0	0
Оксид углерода	0,006	0,002	0,068	0,01	0,00	0	0	0

Выводы:

Последние пять лет уровень загрязнения атмосферного воздуха во 2 квартале менялся следующим образом:



Из графика видно, что уровень загрязнения атмосферного воздуха в целом оценивался как низкий, в 2021 году как повышенный.

2.3 Мониторинг качества атмосферного воздуха в г. Шу

Наблюдения за состоянием атмосферного воздуха на территории г. Шу проводятся на 1 автоматической станции (Приложение 1).

В целом по городу определяется 6 показателей: 1) взвешенные частицы РМ 2,5; 2) взвешенные частицы РМ 10; 3) диоксид серы; 4) оксид углерода; 5) озон (приземный), 6) сероводород.

В таблице 7 представлена информация о месте расположения поста наблюдений и перечне определяемых показателей на посту.

Таблица 7

Место расположения постов наблюдений и определяемые примеси

№	Отбор проб	Адрес поста	Определяемые примеси
1	в непрерывном режиме каждые 20 минут	возле Шуйской городской больницы	взвешенные частицы РМ 2,5, взвешенные частицы РМ 10, диоксид серы, оксид углерода, озон (приземный), сероводород

Результаты мониторинга качества атмосферного воздуха в г. Шу за 2 квартал 2025 года.

По данным сети наблюдения атмосферный воздух г. Шу оценивался как **«повышенный»** он определялся значением СИ равным 2,7 (повышенный) и НП=8% (повышенный) по сероводороду. В загрязнение атмосферного воздуха основной вклад внес сероводород (количество превышений ПДК за 2 квартал: 507 случаев).

Средние концентрации загрязняющих веществ не превышали ПДК. Максимальные разовые концентрации сероводорода составили 2,7 ПДК_{м.р.}, концентрации других загрязняющих веществ не превышали ПДК.

Случаи экстремально высокого и высокого загрязнения (ВЗ и ЭВЗ): ВЗ (более 10 ПДК) и ЭВЗ (более 50 ПДК) не были отмечены.

Фактические значения, а также крастность превышений нормативов качества и количество случаев превышения указаны в Таблице 8.


Таблица 8

Характеристика загрязнения атмосферного воздуха

Примесь	Средняя концентрация		Максимальная разовая концентрация		НП	Число случаев превышения ПДК _{м.р.}		
	мг/м³	Кратность ПДК _{с.с.}	мг/м³	Кратность ПДК _{м.р.}	%	> ПДК	>5 ПДК	>10 ПДК
							В том числе	
г. Шу								
Взвешенные частицы РМ 2,5	0,0015	0,04	0,002	0,01	0,00	0	0	0
Взвешенные частицы РМ 10	0,0012	0,02	0,001	0,004	0,00	0	0	0
Диоксид серы	0,016	0,32	0,035	0,07	0,00	0	0	0
Оксид углерода	0,217	0,07	1,732	0,35	0,00	0	0	0
Озон (приземный)	0,021	0,68	0,062	0,39	0,00	0	0	0
Сероводород	0,004		0,022	2,69	7,74	507	0	0

Выводы:

Последние пять лет уровень загрязнения атмосферного воздуха во 2 квартале менялся следующим образом:



Из графика видно, что уровень загрязнения атмосферного воздуха в целом характеризовался как повышенный, в 2023 году как низкий.

Сероводород образуется при бактериальном разложении отходов жизнедеятельности человека и животных, присутствует в выбросах очистных сооружений и свалок, образуется при разложении белков и входит в состав газовой смеси, присутствующей в коллекторах и канализациях, может скапливаться в подвалах.

2.4 Мониторинг качества атмосферного воздуха в с. Кордай

Наблюдения за состоянием атмосферного воздуха на территории села Кордай проводятся на 1 автоматической станции (Приложение 1).

В целом в селе определяется 2 показателя: 1) диоксид серы; 2) оксид углерода.

В таблице 9 представлена информация о месте расположения поста наблюдений и перечне определяемых показателей на посту.

Таблица 9

Место расположения поста наблюдений и определяемые примеси

№	Отбор проб	Адрес поста	Определяемые примеси
1	в непрерывном режиме каждые 20 минут	ул. Жибек жолы, № 496«А»	диоксид серы, оксид углерода

Результаты мониторинга качества атмосферного воздуха в с.Кордай за 2 квартал 2025 года.

По данным сети наблюдений, уровень загрязнения атмосферного воздуха с.Кордай характеризуется как **«низкий»**, он определялся значением СИ равным 0,3 (низкий) по оксиду углероду и НП =0% (низкий).

Средние и максимальные разовые концентрации загрязняющих веществ не превышали ПДК.

Случаи экстремально высокого и высокого загрязнения (ВЗ и ЭВЗ): ВЗ (более 10 ПДК) и ЭВЗ (более 50 ПДК) не были отмечены.

Фактические значения, а также крастность превышений нормативов качества и количество случаев превышения указаны в таблице 10.


Таблица 10

Характеристика загрязнения атмосферного воздуха

Примесь	Средняя концентрация		Максимальная разовая концентрация		НП	Число случаев превышения ПДК _{м.р.}		
	мг/м³	Крат-ность ПДК _{с.с.}	мг/м³	Крат-ность ПДК _{м.р.}	%	> ПДК	>5 ПДК	>10 ПДК
							В том числе	
с. Кордай								
Диоксид серы	0,016	0,32	0,027	0,05	0,00	0	0	0
Оксид углерода	0,313	0,10	1,476	0,30	0,00	0	0	0

Выводы:

Последние пять лет уровень загрязнения атмосферного воздуха во 2 квартале менялся следующим образом:



Из графика видно, что уровень загрязнения характеризуется как низкий.

3. Состояние качества атмосферных осадков

Наблюдения за химическим составом атмосферных осадков заключались в отборе проб дождевой воды на 3 метеостанциях (Каратау, Тараз, Толе би).

В пробах осадков преобладало содержание гидрокарбонатов 31,22%, сульфатов 25,57%, ионов кальция 15,84%, хлоридов 8,79%.

Наибольшая общая минерализация отмечена на МС Тараз 60,5 мг/л, наименьшая на МС Каратау 31,6 мг/л.

Удельная электропроводимость атмосферных осадков находилась в пределах от 53,7 мкСм/см на МС Каратау до 108,0 мкСм/см на МС Тараз.

Кислотность выпавших осадков колеблется от слабокислой среды до нейтральной и находится в пределах от 6,41 (МС Каратау) до 6,8 (МС Толе би).

Концентрации всех определяемых загрязняющих веществ в осадках не превышали предельно допустимые концентрации (ПДК).

4. Мониторинг качества поверхностных вод на территории Жамбылской области

Наблюдения за качеством поверхностных вод по Жамбылской области проводились на 12 створах в 7 водных объектах (реки Шу, Талас, Асса, Аксу, Карабалта, оз. Биликоль и вдхр. Тасоткель).

При изучении поверхностных вод в отбираемых пробах воды определяются 32 физико-химических показателей качества: *визуальные наблюдения, уровень и расход воды, температура воды, водородный показатель, прозрачность, растворенный кислород, взвешенные вещества, БПК₅, ХПК, главные ионы солевого состава, биогенные элементы, органические вещества (нефтепродукты, фенолы), тяжелые металлы.*

Результаты мониторинга качества поверхностных вод на территории Жамбылской области

Основным нормативным документом для оценки качества воды водных объектов Республики Казахстан является «Единая система классификации качества воды в водных объектах».

По Единой классификации качество воды оценивается следующим образом:

Наименование водного объекта	Класс качества воды		Параметры	Ед. изм.	Концентрация
	2 квартал 2024 год	2 квартал 2025 год			
река Талас	-	3 класс (умеренно загрязненные)	ХПК	мг/дм ³	27,69
			Сульфаты	мг/дм ³	123,17
			Магний	мг/дм ³	29,63
			Медь	мг/дм ³	0,0013
река Асса	-	5 класс (очень загрязненные)	Взвешенные вещества	мг/дм ³	63,2
река Шу	-	3 класс (умеренно загрязненные)	БПК ₅	мг/дм ³	2,56
			ХПК	мг/дм ³	28,25
			Сульфаты	мг/дм ³	217,83
			Магний	мг/дм ³	31,6
река Аксу	-	4 класс (загрязненные)	Медь	мг/дм ³	0,0022
река Карабалта	-	5 класс (очень загрязненные)	ХПК	мг/дм ³	32,77
вдхр. Тасоткель	-	4 класс (загрязненные)	Сульфаты	мг/дм ³	626,0
			БПК ₅	мг/дм ³	3,24
			ХПК	мг/дм ³	34,75
			Взвешенные вещества	мг/дм ³	79,0

За 2 квартал 2025 года реки Талас, Шу относятся к 3 классу, река Аксу и водохранилище Тасоткель к 4 классу, реки Асса и Карабалта относятся к 5 классу.

Основными загрязняющими веществами в водных объектах на территории Жамбылской области являются сульфаты, магний, химическое и биохимическое потребление кислорода также медь и взвешенные вещества.

Случаи высокого загрязнения (ВЗ) и экстремально высокого загрязнения (ЭВЗ) не обнаружены.

Информация по качеству водных объектов в разрезе створов указана в Приложении 2.

Информация по результатам качества поверхностных вод: озера Биликоль указана в Приложении 3.

5. Радиационная обстановка

Наблюдения за уровнем гамма излучения на местности осуществлялись ежедневно на 3-х метеорологических станциях (Тараз, Толе би, Чиганак).

Значения радиационного гамма-фона приземного слоя атмосферы по населенным пунктам области находились в пределах 0,08-0,25 мкЗв/ч. В среднем по области радиационный гамма-фон составил 0,17 мкЗв/ч.

Наблюдение за радиоактивным загрязнением приземного слоя атмосферы на территории Жамбылской области осуществлялся на 3-х метеорологических станциях (Тараз, Толе би, Чиганак) путем отбора проб воздуха горизонтальными планшетами. На всех станциях проводился пятисуточный отбор проб.

Плотность радиоактивных выпадений в приземном слое атмосферы на территории области колебалась в пределах 1,3-2,4 Бк/м². Средняя величина плотности выпадений по области составила 1,9 Бк/м².

6. Состояние загрязнения почв тяжёлыми металлами

За весенний период в пробах почвы, отобранных в различных районах **в городе Тараз** концентрации хрома находились в пределах 0,13-0,57 мг/кг, цинка 1,49-6,44 мг/кг, меди 0,36-1,01 мг/кг, свинца 8,44-37,78 мг/кг, кадмия 0,06-0,18 мг/кг. Концентрации свинца в районе парка культуры и отдыха составили 1,03 ПДК, в районе объездной дороги концентрации свинца составили 1,18 ПДК. В районе Сахарного завода, центральной площади «Достык» и школы №40 концентрации определяемых тяжелых металлов находились в пределах нормы.

За весенний период в городе Каратау в районе 500 м от горно-перерабатывающего комбината и в районе метеостанции (расстояние от источника (автотранспорт) - 500 м) концентрации кадмия, цинка, свинца, хрома, меди находились в пределах 0,13-23,54 мг/кг. Концентрации всех определяемых загрязняющих веществ не превышали предельно допустимые концентрации (ПДК).

За весенний период в городе Жанатас на окраине города в районе заправки и в районе ГПК (горно-перерабатывающего комбината) содержание кадмия, цинка, свинца, хрома, меди находилось в пределах 0,09-11,72 мг/кг. Концентрации всех определяемых загрязняющих веществ не превышали предельно допустимые концентрации (ПДК).

За весенний период в городе Шу содержание свинца, цинка, меди, кадмия и хрома находилось в пределах 0,06-10,27 мг/кг. Концентрации всех определяемых загрязняющих веществ не превышали предельно допустимые концентрации (ПДК).

За весенний период в районе подстанции и в центре **села Кордай** в пробах почв содержание тяжелых металлов находились в пределах 0,09-25,56 мг/кг. Концентрации всех определяемых загрязняющих веществ не превышали предельно допустимые концентрации (ПДК).




Рис.1 – карта мест расположения постов наблюдения и метеостанции г. Тараз




Рис.2 - карта мест расположения поста наблюдений и метеостанции г. Жанатас




Рис.3 - карта мест расположения поста наблюдений и метеостанции г. Каратау




Рис.4 - карта мест расположения поста наблюдений г. Шу




Рис.5 - карта мест расположения поста наблюдений с.Кордай

Приложение 2

Информация о качестве поверхностных вод Жамбылской области по створам за 2 квартал 2025 года

Водный объект и створ	Характеристика физико-химических параметров	
река Талас	Температура воды находилась в пределах от 11,0 до 26,0°С, водородный показатель 8,05 – 8,35, концентрации растворенного в воде кислорода в пределах 8,0 – 12,5 мг/дм ³ , БПК ₅ 1,47 – 2,86 мгО/дм ³ , прозрачность 9 – 11 см во всех створах.	
с. Жасоркен, 0,7 км выше с. Жасоркен, в створе водпоста	3 класс	БПК ₅ – 2,26 мгО/дм ³ , ХПК – 29,63 мг/дм ³ , сульфаты – 130,33 мг/дм ³ , магний – 26,27 мг/дм ³ , медь – 0,0013 мг/дм ³ . Фактические концентрации химического потребления кислорода и сульфатов превышают фоновый класс. Концентрации биохимического потребления кислорода, магния, меди не превышают фоновый класс.
п. Солнечный, 0,5 км ниже гидропоста	3 класс	ХПК – 27,97 мг/дм ³ , сульфаты – 111,67 мг/дм ³ , магний – 28,63 мг/дм ³ , медь – 0,0013 мг/дм ³ . Фактические концентрации химического потребления кислорода и магния превышают фоновый класс. Концентрации сульфатов и меди не превышают фоновый класс.
г. Тараз, 7,5 км выше г. Тараз, 0,7 км выше сброса сточных вод ГРЭС, 3,0 км выше водпоста	3 класс	БПК ₅ – 2,15 мгО/дм ³ , ХПК – 28,53 мг/дм ³ , сульфаты – 130,67 мг/дм ³ , магний – 32,6 мг/дм ³ . Фактические концентрации химического потребления кислорода, сульфатов и магния превышают фоновый класс. Концентрация биохимического потребления кислорода не превышает фоновый класс.
г. Тараз, 10 км ниже г. Тараз, 0,7 км ниже выхода коллекторно-дренажных вод с полей фильтрации сахарного и спирт. комбинатов.	3 класс	ХПК – 24,63 мг/дм ³ , сульфаты – 120,0 мг/дм ³ , магний – 31,03 мг/дм ³ , медь – 0,0013 мг/дм ³ . Фактические концентрации химического потребления кислорода, меди не превышают фоновый класс. Концентрации сульфатов и магния превышают фоновый класс.
река Асса	Температура воды находилась в пределах от 13,0 до 25,0°С, водородный показатель 8,25 – 8,40, концентрации растворенного в воде кислорода в пределах 8,24 – 10,1 мг/дм ³ , БПК ₅ 1,1 – 3,33 мгО/дм ³ , прозрачность 7 – 10 см во всех створах.	
Окраина микрорайона Чолдала (Шолдала), Кумшагалский с.о.(у моста)	3 класс	БПК ₅ – 2,48 мгО/дм ³ , ХПК – 24,67 мг/дм ³ , магний – 27,57 мг/дм ³ , медь – 0,0017 мг/дм ³ .
р. Асса, 500м ниже с. Асса	4 класс	Взвешенные вещества – 60,0 мг/дм ³ . Фактическая концентрация взвешенных веществ превышает фоновый класс.
озеро Биликоль	Температура воды находилась в пределах от 26,0 до 28,0°С, водородный показатель 8,35–8,40, концентрации растворенного в воде кислорода 7,17– 7,18 мг/дм ³ , БПК ₅ 10,6– 11,8 мгО/дм ³ ,	

	ХПК 47,1– 47,2 мг/дм ³ , сухой остаток 1592– 1697 мг/дм ³ , взвешенные вещества 93,0– 128,0 мг/дм ³ , минерализация 1501– 1651 мг/дм ³ , прозрачность 5– 10 см.	
река Шу	Температура воды находилась в пределах от 11,4 до 26,0°С, водородный показатель 7,90 – 8,40, концентрации растворенного в воде кислорода 7,79 – 10,8, БПК ₅ 2,12 – 3,42 мгО/дм ³ , прозрачность воды 2–14 см во всех створах.	
с. Кайнар (с.Благовещенское), 0,5 км ниже с. Кайнар: 65 м. ниже водпоста	3 класс	БПК ₅ – 2,77 мгО/дм ³ , ХПК – 28,03 мг/дм ³ , сульфаты – 193,0 мг/дм ³ , магний – 26,9 мг/дм ³ , медь – 0,0023 мг/дм ³ , железо общий – 0,127 мг/дм ³ . Фактические концентрации химического потребления кислорода, сульфатов, магния и железа общего превышают фоновый класс. Концентрации биохимического потребления кислорода и меди не превышают фоновый класс.
с. Д. Конаева, 0,5 км ниже с. Д. Конаева	5 класс	Взвешенные вещества – 88,0 мг/дм ³ . Фактическая концентрация взвешенных веществ превышает фоновый класс.
река Аксу	Температура воды находилась в пределах от 13,2 до 27,0°С, водородный показатель 8,10 – 8,35, концентрации растворенного в воде кислорода в пределах 8,51 – 9,17 мг/дм ³ , БПК ₅ 2,22 – 2,96 мгО/дм ³ , прозрачность 2–5 см во всех створах.	
а. Аксу, 0,5 км выше а. Аксу, 10 км от устья р. Аксу	4 класс	ХПК – 32,77 мг/дм ³ . Фактическая концентрация химического потребления кислорода превышает фоновый класс.
река Карабалта	Температура воды находилась в пределах от 15,0 до 26,0°С, водородный показатель 8,25 – 8,40, концентрации растворенного в воде кислорода в пределах 8,99 – 10,2 мг/дм ³ , БПК ₅ 2,80 – 3,24 мгО/дм ³ , прозрачность 2 – 7 см во всех створах.	
на границе с Кыргызстаном, с. Баласагун 29 км от устья реки	5 класс	Сульфаты – 626,0 мг/дм ³ . Фактическая концентрация сульфатов превышает фоновый класс.
водохранилище Тасоткель	Температура воды находилась в пределах от 17,5 до 22,6°С, водородный показатель 8,0 – 8,30, концентрации растворенного в воде кислорода в пределах 8,27 – 8,81 мг/дм ³ , БПК ₅ 2,70 – 3,78 мгО/дм ³ , прозрачность 12 см во всех створах.	
на границе с Кыргызстаном с. Жаугаш Батыр, 78 км от устья реки окраины с. Жаугаш Батыра	4 класс	БПК ₅ – 3,24 мгО/дм ³ , ХПК – 34,75 мг/дм ³ , взвешенные вещества – 79,0 мг/дм ³ . Фактические концентрации химического и биохимического потребления кислорода, взвешенных веществ превышают фоновый класс.

**Результаты качества поверхностных вод озер
на территории Жамбылской области**

№	Наименование ингредиентов	Единицы измерения	за 2 квартал 2025г.
			озеро Биликоль
1	Визуальные наблюдения		чисто
2	Температура	°С	27,0
3	Водородный показатель		8,375
4	Растворенный кислород	мг/дм ³	7,175
5	Прозрачность	см	7,5
6	БПК ₅	мгО/дм ³	11,2
7	ХПК	мг/дм ³	47,15
8	Взвешенные вещества	мг/дм ³	110,5
9	Гидрокарбонаты	мг/дм ³	333
10	Жесткость	мг/дм ³	9,76
11	Минерализация	мг/дм ³	1576
12	Натрий + калий	мг/дм ³	317
13	Сухой остаток	мг/дм ³	1644,5
14	Кальций	мг/дм ³	93
15	Магний	мг/дм ³	62,4
16	Сульфаты	мг/дм ³	684
17	Хлориды	мг/дм ³	83,15
18	Фосфат	мг/дм ³	0,02
19	Фосфор общий	мг/дм ³	0,022
20	Азот нитритный	мг/дм ³	0,033
21	Азот нитратный	мг/дм ³	3,365
22	Железо общее	мг/дм ³	0,075
23	Аммоний солевой	мг/дм ³	0,19
24	АПАВ /СПАВ	мг/дм ³	0,03
25	Фенолы	мг/дм ³	0,0005
26	Нефтепродукты	мг/дм ³	0,055
27	Уровень воды	м	3,36

Справочный раздел

**Предельно-допустимые концентрации (ПДК) загрязняющих веществ
в воздухе населенных мест**

Наименование примесей	Значения ПДК, мг/м ³		Класс опасности
	максимально разовая	средне- суточная	
Азота диоксид	0,2	0,04	2
Азота оксид	0,4	0,06	3
Аммиак	0,2	0,04	4
Бенз/а/пирен	-	0,1 мкг/100 м ³	1
Бензол	0,3	0,1	2
Бериллий	0,09	0,00001	1
Взвешенные вещества (частицы)	0,5	0,15	3
Взвешенные частицы РМ 10	0,3	0,06	
Взвешенные частицы РМ 2,5	0,16	0,035	

Хлористый водород	0,2	0,1	2
Кадмий	-	0,0003	1
Кобальт	-	0,001	2
Марганец	0,01	0,001	2
Медь	-	0,002	2
Мышьяк	-	0,0003	2
Озон	0,16	0,03	1
Свинец	0,001	0,0003	1
Диоксид серы	0,5	0,05	3
Серная кислота	0,3	0,1	2
Сероводород	0,008	-	2
Оксид углерода	5,0	3	4
Фенол	0,01	0,003	2
Формальдегид	0,05	0,01	2
Фтористый водород	0,02	0,005	2
Хлор	0,1	0,03	2
Хром (VI)	-	0,0015	1
Цинк	-	0,05	3

«Гигиенический норматив к атмосферному воздуху в городских и сельских населенных пунктах» (№ КР ДСМ-70 от 02 августа 2022 года)

Оценка степени индекса загрязнения атмосферы

Градации	Загрязнение атмосферного воздуха	Показатели	Оценка за месяц
I	Низкое	СИ НП, %	0-1 0
II	Повышенное	СИ НП, %	2-4 1-19
III	Высокое	СИ НП, %	5-10 20-49
IV	Очень высокое	СИ НП, %	>10 >50

РД 52.04.667–2005, Документы состояния загрязнения атмосферы в городах для информирования государственных органов, общественности и населения. Общие требования к разработке, постороению, изложению и содержанию

Дифференциация классов водопользования по категориям (видам) водопользования

Категория водопользования	Назначение/тип очистки	Классы водопользования					
		1 класс	2 класс	3 класс	4 класс	5 класс	6 класс
Функционирование водных экосистем	-	+	+	-	-	-	-
Рыбоводство/охрана ихтиофауны	Лососевые	+	+	-	-	-	-
	Карповые	+	+	+	-	-	-
Хозяйственно-питьевое водоснабжение и водоснабжение предприятий пищевой промышленности	Простая обработка	+	+	-	-	-	-
	Нормальная обработка	+	+	+	-	-	-
	Интенсивная обработка	+	+	+	-	-	-

Культурно-бытовое водопользование	Туризм, спорт, отдых, купание	+	+	+	-	-	-
Орошение	Без подготовки	+	+	+	+	-	-
	При использовании карт отстаивания	+	+	+	+	+	-
Промышленное водопользование	Технологические процессы, процессы охлаждения	+	+	+	+	+	-
Гидроэнергетика		+	+	+	+	+	+
Водный транспорт		+	+	+	+	+	+
Добыча полезных ископаемых		+	+	+	+	+	+

Примечание:

«+» – качество вод обеспечивает назначение;

«-» – качество вод не обеспечивает назначение.

* Единая система классификации качества воды в водных объектах (Приказ КВР МСХ №151 от 09.11.2016 с внесенными изменениями от 20 марта 2024 года № 70).

Норматив радиационной безопасности

Нормируемые величины	Пределы доз
Эффективная доза	Население
	1 мЗв в год в среднем за любые последовательные 5 лет, но не более 5 мЗв в год

* «Санитарно-эпидемиологические требования к обеспечению радиационной безопасности»

Предельно-допустимые концентрации (далее - ПДК) химических веществ в почве

Наименование вещества	Предельно-допустимая концентрация (далее-ПДК) мг/кг в почве
Свинец (валовая форма)	32,0
Хром (подвижная форма)	6,0

* Гигиенические нормативы к безопасности среды обитания Утверждены приказом Министра здравоохранения Республики Казахстан от 21 апреля 2021 года № КР ДСМ -32

ФИЛИАЛ РГП «КАЗГИДРОМЕТ» ПО ЖАМБЫЛСКОЙ ОБЛАСТИ

АДРЕС:
ГОРОД ТАРАЗ
УЛ. ЧИМКЕНТСКАЯ 22
ТЕЛ. 8-(7262)-31-60-81
8-(7262)-56-80-51
E MAIL: info_zmb@meteo.kz