

Информационный бюллетень о состоянии окружающей среды г. Атырау

Выпуск №14
октябрь 2021 года



Министерство экологии, геологии и природных ресурсов
Республики Казахстан
Филиал РГП "Казгидромет" по Атырауской области

	СОДЕРЖАНИЕ	Стр.
	Предисловие	3
1	Основные источники загрязнения атмосферного воздуха	4
2	Состояние качества атмосферного воздуха	4
3	Состояние качества поверхностных вод	13
4	Состояние загрязнения почв тяжелыми металлами	15
5	Химический состав атмосферных осадков	15
6	Радиационная обстановка	15
	Приложение 1	17
	Приложение 2	27
	Приложение 3	28
	Приложение 4	29
	Приложение 5	29

Предисловие

Информационный бюллетень подготовлен по результатам работ, выполняемых специализированными подразделениями РГП «Казгидромет» по ведению мониторинга за состоянием окружающей среды на наблюдательной сети национальной гидрометеорологической службы.

Бюллетень предназначен для информирования государственных органов, общественности и населения о состоянии окружающей среды на территории Атырауской области и необходим для дальнейшей оценки эффективности мероприятий в области охраны окружающей среды РК с учетом тенденции происходящих изменений уровня загрязнения.

Оценка качества атмосферного воздуха в Атырауской области

1. Основные источники загрязнения атмосферного воздуха

По сообщениям Департамента экологии Атырауской области основными источниками загрязнения в г. Атырау являются объекты нефтепереработки, транспортировки:

«Атырауский нефтеперерабатывающий завод», «Тенгизшевройл», «Атыраунефтемаш», «Эмбаунагаз», «Интергаз-Центральная Азия». Кроме того, в городе имеется два пруда-накопителя производственных сбросов, расположенных с обеих подветриваемых сторон города (северо-западная сторона - пруд-накопитель «Квадрат» и восточная сторона – «Тухлая балка»). Все городские сбросы в накопитель осуществляются практически без очистки, в итоге формируется основной источник сероводорода – накопитель в 1000 гектаров, в котором идут процессы гниения органических веществ – канализационных стоков, в том числе нефтепродуктов.

В Атырауской области имеется 142 предприятий первой категории. Фактический суммарный выброс от предприятий за 2020 год составил 150,07 тыс. тонн.

Город Атырау, город Кульсары и Макатский район полностью снабжены природным газом.

Согласно данным АПФ АО «КазТрансгазАймак» автономных котельных по городу Атырау – 80 030 ед., по Макатскому району – 1783 ед.

2. Мониторинг качества атмосферного воздуха

Наблюдения за состоянием атмосферного воздуха на территории г. Атырау проводятся на 5 постах наблюдения, в том числе на 2 постах ручного отбора проб и на 3 автоматических станциях (Приложение 1).

В целом по городу определяется до 12 показателей: 1) взвешенные частицы (пыль); 2) взвешенные частицы РМ-2,5; 3) взвешенные частицы РМ-10; 4) диоксид серы; 5) оксид углерода; 6) диоксид азота; 7) оксид азота; 8) аммиак; 9) сероводород; 10) озон; 11) фенол; 12) формальдегид.

В таблице 1 представлена информация о местах расположения постов наблюдений и перечне определяемых показателей на каждом посту.

Таблица 1

Место расположения постов наблюдений и определяемые примеси

№	Сроки отбора	Проведение наблюдений	Адрес поста	Определяемые примеси
1	3 раза в сутки	ручной отбор проб (дискретные методы)	мкр Самал, ул. А. Кекильбаева 15	взвешенные частицы (пыль), диоксид серы, оксид углерода, диоксид и оксид азота сероводород, фенол, аммиак, формальдегид
5			мкр Курсай, ул. Карабау строение 12	
6	в непрерывн		мкр Жулдыз, 6-я улица, 29	взвешенные частицы РМ-2,5, взвешенные частицы РМ-10, диоксид

	ом режиме – каждые 20 минут	в непрерывном режиме		серы, оксид углерода, диоксид и оксид азота озон, сероводород, аммиак
8	район Сырдарья 3		взвешенные частицы РМ-2,5, взвешенные частицы РМ-10, диоксид серы, оксид углерода, диоксид и оксид азота озон, сероводород, аммиак	
9	мкр.Береке, район промзоны Береке		взвешенные частицы РМ-2,5, взвешенные частицы РМ-10, диоксид серы, оксид углерода, диоксид и оксид азота озон, сероводород, аммиак	
10	мкр Нурсая, пр. Елорда д. 24, территория ТОО «высший колледж АРЕС»		взвешенные частицы РМ-2,5, взвешенные частицы РМ-10, диоксид серы, диоксид азота, сероводород, оксид углерода.	

Результаты мониторинга качества атмосферного воздуха в г. Атырау за октябрь 2021 года.

По данным сети наблюдений г. Атырау, уровень загрязнения атмосферного воздуха оценивался как **повышенный**, он определялся значением СИ= 2,7 (повышенный уровень) по оксиду углерода в районе поста №6 (мкр Жулдыз, 6-я улица,29) и НП= 14,1% (повышенный уровень) по взвешенным частицам (пыль) в районе поста №1 (мкр Самал, ул. А.Кекильбаева 15).

Максимально-разовые концентрации составили: взвешенных частиц (пыль)- 1,4 ПДК_{м.р.}, взвешенных частиц РМ-2,5 – 2,8 ПДК_{м.р.}, взвешенных частиц РМ-10 – 1,8 ПДК_{м.р.}, оксида углерода-2,7 ПДК_{м.р.}, диоксида азота-1,8 ПДК_{м.р.}, сероводорода – 2,5 ПДК_{м.р.} По другим показателям превышений ПДК_{м.р.} не наблюдалось.

Превышения по среднесуточным нормативам наблюдались: взвешенным частицам (пыль) составили 1,26 ПДК_{с.с.} По другим показателям превышений ПДК_{с.с.} не наблюдалось.

Случаи экстремально высокого и высокого загрязнения (ВЗ и ЭВЗ): ВЗ (более 10 ПДК) и ЭВЗ (более 50 ПДК) не были отмечены.

Фактические значения, а также кратность превышений нормативов качества и количество случаев превышения указаны в Таблице 2.

Таблица 2

Характеристика загрязнения атмосферного воздуха

Примесь	Средняя концентрация		Максимальная разовая концентрация		НП %	Число случаев превышения ПДК _{м.р.}		
	мг/м ³	Кратность ПДК _{с.с.}	мг/м ³	Кратность ПДК _{м.р.}		>ПДК	>5 ПДК	>10 ПДК
г. Атырау								
Взвешенные частицы (пыль)	0,19	1,26	0,7	1,4	14,1	15	0	0
Взвешенные частицы РМ-2,5	0,0127	0,36	0,4476	2,8	5,0	311	0	0
Взвешенные частицы РМ-10	0,0143	0,24	0,5387	1,8	0,1	3	0	0
Диоксид серы	0,001	0,02	0,3946	0,8	0,0	0	0	0

Оксид углерода	0,07	0,02	13,38	2,7	2,1	50	0	0
Диоксид азота	0,01	0,13	0,35	1,8	1,1	42	0	0
Оксид азота	0,0027	0,04	0,04	0,1	0,0	0	0	0
Озон	0,0049	0,16	0,0856	0,5	0,0	0	0	0
Сероводород	0,0003		0,0198	2,5	3,6	52	0	0
Фенол	0,001	0,35	0,003	0,3	0,0	0	0	0
Аммиак	0,003	0,07	0,0201	0,1	0,0	0	0	0
Формальдегид	0,002	0,21	0,003	0,1	0,0	0	0	0

Выводы:

За последние пять лет уровень загрязнения атмосферного воздуха в октябре изменялся следующим образом:

Сравнение СИ и НП за октябрь 2017-2021гг. в г. Атырау



Как видно из графика, в октябре месяце с 2017 года по 2021 года уровень загрязнения атмосферного воздуха города Атырау оценивался как «повышенный».

Количество превышений максимально-разовых ПДК было отмечено по сероводороду (52 случаев), оксида углерода (50 случаев), диоксида азота (42 случаев) взвешенным частицам РМ-2,5 (311случаев), взвешенным частицам РМ-10 (3 случая), взвешенным частицам (пыль) (15 случаев).

Увеличению концентрации сероводорода способствуют объекты нефтепереработки, транспортировки и пруд-накопитель производственных сбросов «Тухлая балка», расположенных на восточной подветриваемой стороне города, которые являются основными источниками загрязнения воздуха сероводородом. Превышением концентрации диоксида азота и оксида углерода свидетельствует о влиянии автотранспорта и выбросов от теплоэнергетических предприятий. Кроме того, повышению концентрации взвешенных частиц в воздухе способствует частые ветра в регионе, поднимающие пыль с подстилающей поверхности земли. Увеличению концентрации диоксида азота и оксида углерода свидетельствует о влиянии автотранспорта и выбросов от теплоэнергетических предприятий.

2.1 Метеорологические условия

В течение периода область находился под влиянием антициклона, в начале второй и третьей декады с прохождением фронтальных разделов наблюдалась

неустойчивая погода, местами прошли кратковременные дожди, отмечалась пыльная буря, местами усиливался ветер 15-20 м/с. В течение третьей декады по области наблюдалась туман. В конце месяца метеорологические условия способствовали накоплению загрязняющих веществ в атмосфере города.

2.2 Мониторинг качества атмосферного воздуха в г. Кульсары.

Наблюдения за состоянием атмосферного воздуха на территории г. Кульсары проводятся на стационарном посту наблюдения (Приложение 1).

В целом по городу определяется до 6 показателей: 1) взвешенные частицы РМ-10; 2) диоксид серы; 3) оксид углерода; 4) диоксид азота; 5) оксид азота; б) озон.

В таблице 1 представлена информация о местах расположения постов наблюдений и перечне определяемых показателей на каждом посту.

Таблица 1

Место расположения постов наблюдений и определяемые примеси				
Номер поста	Сроки отбора	Проведение наблюдений	Адрес поста	Определяемые примеси
7	каждые 20 минут	в непрерывном режиме	ул.Махамбет Утемисова,37 А	взвешенные частицы РМ-10, диоксид серы, оксид углерода, диоксид и оксид азота, озон (приземный)

Результаты мониторинга качества атмосферного воздуха в г. Кульсары за октябрь 2021 года.

По данным сети наблюдений г. Кульсары, уровень загрязнения атмосферного воздуха оценивался как **низкий**, он определялся значением СИ=1,1 (низкий уровень) и НП=0,0% (низкий уровень).

Максимально-разовые концентрации озон (приземный)- составил 1,1 ПДК_{м.р.}. Превышения по среднесуточным нормативам озон (приземный) составил 2,18 ПДК_{с.с.}. По другим показателям превышений ПДК_{с.с.} не наблюдалось.

Случаи экстремально высокого и высокого загрязнения (ВЗ и ЭВЗ): ВЗ (более 10 ПДК) и ЭВЗ (более 50 ПДК) не были отмечены.

Фактические значения, а также кратность превышений нормативов качества и количество случаев превышения указаны в Таблице 2.

Таблица 2

Характеристика загрязнения атмосферного воздуха

Примесь	Средняя концентрация		Максимальная разовая концентрация		НП %	Число случаев превышения ПДК _{м.р.}		
	мг/м ³	Кратность ПДК _{с.с.}	мг/м ³	Кратность ПДК _{м.р.}		>ПДК	>5 ПДК	>10 ПДК
г. Кульсары								
Взвешенные частицы РМ-10	0,0005	0,00	0,2975	0,60	0,0			
Диоксид серы	0,0134	0,27	0,0463	0,09	0,0			
Оксид углерода	0,2400	0,08	3,1961	0,64	0,0			
Диоксид азота	0,0071	0,18	0,0940	0,47	0,0			

Оксид азота	0,0253	0,42	0,0950	0,24	0,0			
Озон	0,0655	2,18	0,1755	1,10	0,0	1		

Выводы:

За последние пять лет уровень загрязнения атмосферного воздуха в октябре изменялся следующим образом:

Сравнение СИ и НП за октябрь 2017-2021гг. в г. Кульсары



Как видно из графика, в октябре месяце с 2017 года по 2021 года уровень загрязнения атмосферного воздуха города Кульсары оценивался как «низкий».

Количество превышений максимально-разовых ПДК было отмечено по озон (приземный) (1 случая).

2.3 Мониторинг качества атмосферного воздуха в районе Макат.

Наблюдения за состоянием атмосферного воздуха на территории Макатского района проводятся на 1 компактной станции наблюдения (Приложение 1).

В целом по району Макат определяется до 6 показателей: 1) взвешенные частицы РМ-2,5; 2) взвешенные частицы РМ-10; 3) диоксид серы; 4) диоксид азота; 5) сероводород; 6) оксид углерода.

В таблице 1 представлена информация о местах расположения постов наблюдений и перечне определяемых показателей на каждом посту.

Таблица 1

Место расположения постов наблюдений и определяемые примеси				
Номер поста	Сроки отбора	Проведение наблюдений	Адрес поста	Определяемые примеси
1	каждые 20 минут	в непрерывном режиме	Макатский район, п.Макат ул.Алаш 23, дом культуры.	взвешенные частицы РМ-2,5, взвешенные частицы РМ-10, диоксид серы, диоксид азота, сероводород, оксид углерода.

Результаты мониторинга качества атмосферного воздуха в районе Макат за октябрь 2021 года.

По данным сети наблюдений района Макат, уровень загрязнения атмосферного воздуха оценивался как **повышенный**, он определялся значением

СИ=2,4 (повышенный уровень) и НП=1,7% (повышенный уровень) по сероводороду.

Максимально-разовые концентрации составили: взвешенных частиц РМ-10 – 1,0 ПДК_{м.р.}, сероводорода – 2,4 ПДК_{м.р.}. По другим показателям превышений ПДК_{м.р.} не наблюдалось.

Превышения по среднесуточным нормативам наблюдались: по диоксиду азота составила 2,08 ПДК_{с.с.}. По другим показателям превышений ПДК_{с.с.} не наблюдалось.

Случаи экстремально высокого и высокого загрязнения (ВЗ и ЭВЗ): ВЗ (более 10 ПДК) и ЭВЗ (более 50 ПДК) не были отмечены.

Фактические значения, а также кратность превышений нормативов качества и количество случаев превышения указаны в Таблице 2.

Таблица 2

Характеристика загрязнения атмосферного воздуха

Примесь	Средняя концентрация		Максимальная разовая концентрация		НП %	Число случаев превышения ПДК _{м.р.}		
	мг/м ³	Кратность ПДК _{с.с.}	мг/м ³	Кратность ПДК _{м.р.}		>ПДК	>5 ПДК	>10 ПДК
район Макат								
Взвешенные частицы РМ-2,5	0,0045	0,13	0,1404	0,9	0,0	0		
Взвешенные частицы РМ-10	0,0218	0,36	0,3133	1,0	0,0	1		
Диоксид серы	0,0215	0,43	0,1382	0,3	0,0	0		
Оксид углерода	0,3911	0,13	4,4213	0,9	0,0	0		
Диоксид азота	0,0830	2,08	0,1809	0,9	0,0	0		
Сероводород	0,0007		0,0190	2,4	1,7	37		

2.4 Мониторинг качества атмосферного воздуха в Индерском районе.

Наблюдения за состоянием атмосферного воздуха на территории Индерского района проводятся на 1 компактной станции наблюдения (Приложение 1).

В целом по району Индер определяется до 6 показателей: 1) взвешенные частицы РМ-2,5; 2) взвешенные частицы РМ-10; 3) диоксид серы; 4) диоксид азота; 5) сероводород; 6) оксид углерода.

В таблице 1 представлена информация о местах расположения постов наблюдений и перечне определяемых показателей на каждом посту.

Таблица 1

Место расположения постов наблюдений и определяемые примеси

Номер поста	Сроки отбора	Проведение наблюдений	Адрес поста	Определяемые примеси
1	каждые 20 минут	в непрерывном режиме	пос. Индерборский, ул. Н.Мендигалиев а д. 47.	взвешенные частицы РМ-2,5, взвешенные частицы РМ-10, диоксид серы, диоксид азота, сероводород, оксид углерода.

Результаты мониторинга качества атмосферного воздуха в районе Индер за октябрь 2021 года.

По данным сети наблюдений района Индер, уровень загрязнения атмосферного воздуха оценивался как **повышенный**, он определялся значением СИ=3,3 (повышенный уровень) по оксиду углероду и НП=0,8% (низкий уровень).

Максимально-разовые концентрации составили: взвешенных частиц РМ-2,5 – 1,1 ПДК_{м.р.}, взвешенных частиц РМ-10 – 2,8 ПДК_{м.р.}, оксида углерода-3,3 ПДК_{м.р.}, сероводорода–1,8ПДК_{м.р.}. По другим показателям превышений ПДК_{м.р.} не наблюдалось.

Превышения по среднесуточным нормативам наблюдались: по диоксиду азота составила-1,75 ПДК_{с.с.}. По другим показателям превышений ПДК_{с.с.} не наблюдалось.

Случай экстремально высокого и высокого загрязнения (ВЗ и ЭВЗ): ВЗ (более 10 ПДК) и ЭВЗ (более 50 ПДК) не были отмечены.

Фактические значения, а также кратность превышений нормативов качества и количество случаев превышения указаны в Таблице 2.

Таблица 2

Характеристика загрязнения атмосферного воздуха

Примесь	Средняя концентрация		Максимальная разовая концентрация		НП %	Число случаев превышения ПДК _{м.р.}		
	мг/м ³	Кратность ПДК _{с.с.}	мг/м ³	Кратность ПДК _{м.р.}		>ПДК	>5 ПДК	>10 ПДК
район Индер								
Взвешенные частицы РМ-2,5	0,0063	0,18	0,1701	1,1	0,0	1		
Взвешенные частицы РМ-10	0,0241	0,40	0,8431	2,8	0,1	3		
Диоксид серы	0,0209	0,42	0,1237	0,2	0,0	0		
Оксид углерода	0,4475	0,15	16,349	3,3	0,1	3		
Диоксид азота	0,0699	1,75	0,1809	0,9	0,0	0		
Сероводород	0,0006		0,0141	1,8	0,8	17		

2.5 Мониторинг качества атмосферного воздуха в селе Жанбай.

Наблюдения за состоянием атмосферного воздуха на территории с.Жанбай проводятся на 1 компактной станции наблюдения (Приложение 1).

В целом в селе Жанбай определяется до 6 показателей: 1) взвешенные частицы РМ-2,5; 2) взвешенные частицы РМ-10; 3) диоксид серы; 4) диоксид азота; 5) сероводород; 6) оксид углерода.

В таблице 1 представлена информация о местах расположения постов наблюдений и перечне определяемых показателей на каждом посту.

Таблица 1

Место расположения постов наблюдений и определяемые примеси

Номер поста	Сроки отбора	Проведение наблюдений	Адрес поста	Определяемые примеси
-------------	--------------	-----------------------	-------------	----------------------

1	каждые 20 минут	в непрерывном режиме	с.Жанбай, ул.Т. Нысанов уч 96	взвешенные частицы РМ-2,5, взвешенные частицы РМ-10, диоксид серы, диоксид азота, сероводород, оксид углерода.
---	-----------------	----------------------	-------------------------------	--

Результаты мониторинга качества атмосферного воздуха в с. Жанбай за октябрь 2021 года.

По данным сети наблюдений село Жанбай, уровень загрязнения атмосферного воздуха оценивался как **повышенный**, он определялся значением СИ=3,2 (повышенный уровень) по взвешенным частицам РМ-10 и НП=2,5% (повышенный уровень).

Максимально-разовые концентрации составили: взвешенных частиц РМ-2,5 – 1,4 ПДК_{м.р.}, взвешенных частиц РМ-10 – 3,2 ПДК_{м.р.}, сероводорода – 2,0 ПДК_{м.р.} По другим показателям превышений ПДК_{м.р.} не наблюдалось.

Превышения по среднесуточным нормативам наблюдались: по диоксиду азота составила – 1,69 ПДК_{с.с.} По другим показателям превышений ПДК_{с.с.} не наблюдалось.

Случаи экстремально высокого и высокого загрязнения (ВЗ и ЭВЗ): ВЗ (более 10 ПДК) и ЭВЗ (более 50 ПДК) не были отмечены.

Фактические значения, а также кратность превышений нормативов качества и количество случаев превышения указаны в Таблице 2.

Таблица 2

Характеристика загрязнения атмосферного воздуха

Примесь	Средняя концентрация		Максимальная разовая концентрация		НП %	Число случаев превышения ПДК _{м.р.}		
	мг/м ³	Кратность ПДК _{с.с.}	мг/м ³	Кратность ПДК _{м.р.}		>ПДК	>5 ПДК	>10 ПДК
село Жанбай								
Взвешенные частицы РМ-2,5	0,0061	0,17	0,2247	1,4	0,3	6		
Взвешенные частицы РМ-10	0,0249	0,41	0,9653	3,2	0,6	12		
Диоксид серы	0,0117	0,23	0,1903	0,4	0,0	0		
Оксид углерода	0,4589	0,15	4,4213	0,9	0,0	0		
Диоксид азота	0,0675	1,69	0,1809	0,9	0,0	0		
Сероводород	0,0008		0,0161	2,0	2,5	54		

2.6 Мониторинг качества атмосферного воздуха в поселке Ганюшкино.

Наблюдения за состоянием атмосферного воздуха на территории п. Ганюшкино проводятся на 1 компактной станции наблюдения (Приложение 1).

В целом в поселке Ганюшкино определяется до 6 показателей: 1) взвешенные частицы РМ-2,5; 2) взвешенные частицы РМ-10; 3) диоксид серы; 4) диоксид азота; 5) сероводород; 6) оксид углерода.

В таблице 1 представлена информация о местах расположения постов наблюдений и перечне определяемых показателей на каждом посту.

Место расположения постов наблюдений и определяемые примеси

Номер поста	Сроки отбора	Проведение наблюдений	Адрес поста	Определяемые примеси
1	каждые 20 минут	в непрерывном режиме	с.Курмангазы, «ДК им.С.Кушекбаева».	взвешенные частицы РМ-2,5, взвешенные частицы РМ-10, диоксид серы, диоксид азота, сероводород, оксид углерода.

Результаты мониторинга качества атмосферного воздуха в пос. Ганюшкино за октябрь 2021 года.

По данным сети наблюдений пос. Ганюшкино, уровень загрязнения атмосферного воздуха оценивался как **повышенный**, он определялся значением СИ=3,2 (повышенный уровень) и НП=1,3% (повышенный уровень) по взвешенным частицам РМ-2,5.

Максимально-разовые концентрации составили: взвешенных частиц РМ-2,5 – 3,2 ПДК_{м.р.}, взвешенных частиц РМ-10 – 1,7 ПДК_{м.р.}, оксида углерода-1,5 ПДК_{м.р.}, сероводорода–1,2 ПДК_{м.р.}. По другим показателям превышений ПДК_{м.р.} не наблюдалось.

Превышения по среднесуточным нормативам наблюдались: по диоксиду азота составила-1,23ПДК_{с.с.}. По другим показателям превышений ПДК_{с.с.} не наблюдалось.

Случаи экстремально высокого и высокого загрязнения (ВЗ и ЭВЗ): ВЗ (более 10 ПДК) и ЭВЗ (более 50 ПДК) не были отмечены.

Фактические значения, а также кратность превышений нормативов качества и количество случаев превышения указаны в Таблице 2.

Таблица 2

Характеристика загрязнения атмосферного воздуха

Примесь	Средняя концентрация		Максимальная разовая концентрация		НП %	Число случаев превышения ПДК _{м.р.}		
	мг/м ³	Кратность ПДК _{с.с.}	мг/м ³	Кратность ПДК _{м.р.}		>ПДК	>5 ПДК	>10 ПДК
пос. Ганюшкино								
Взвешенные частицы РМ-2,5	0,0135	0,39	0,5156	3,2	1,3	28		
Взвешенные частицы РМ-10	0,0222	0,37	0,5156	1,7	0,0	1		
Диоксид серы	0,0150	0,30	0,1382	0,3	0,0	0		
Оксид углерода	0,7447	0,25	7,5941	1,5	0,2	5		
Диоксид азота	0,0492	1,23	0,1809	0,9	0,0	0		
Сероводород	0,0004		0,0092	1,2	0,5	10		

Состояние атмосферного воздуха по данным экспедиционных наблюдений

Помимо стационарных постов наблюдений в Атырауской области действует передвижная экологическая лаборатория, с помощью которой измерение качества

воздуха проводятся дополнительно в Северном Каспии- г.Кульсары (3 точки), поселок Жана Каратон (3 точки) и село Ганюшкино (3 точки) Жанбай, Забурунье, Доссор, Макат и Косшагыл по 11 показателям: 1) взвешенные частицы (PM-10); 2) диоксид серы; 3) оксид углерода; 4) диоксид азота; 5) оксид азота; 6) аммиак; 7) сероводород; 8) углеводороды (C₁₂-C₁₉); 9) формальдегид; 10) фенол; 11) метан.

Максимально-разовые концентрации взвешенных частиц PM-10 г. Кульсары находилось в пределах 1,33-3,0 ПДК_{м.р.} Концентрации остальных загрязняющих веществ, по данным наблюдений, находились в пределах допустимой нормы.

**Максимальные концентрации загрязняющих веществ по данным наблюдений
г.Кульсары**

Определяемые примеси	Точки отбора					
	№1		№2		№3	
	Q _м мг/м ³	q _м /ПДК	Q _м мг/м ³	q _м /ПДК	Q _м мг/м ³	q _м /ПДК
Взвешенные частицы (PM-10)	0,9	3,0	0,4	1,33	0,4	1,33
Диоксид серы	0,029	0,06	0,017	0,03	0,017	0,03
Оксид углерода	2,0	0,4	2,10	0,42	2,24	0,45
Диоксид азота	0,004	0,02	0,004	0,02	0,004	0,02
Оксид азота	0,005	0,01	0,004	0,01	0,004	0,01
Сероводород	0,004	0,50	0,003	0,38	0,003	0,38
Фенол	0,003	0,30	0,002	0,20	0,003	0,30
Углеводороды (C ₁₂ -C ₁₉)	3	-	3	-	3	-
Аммиак	0,011	0,06	0,011	0,06	0,017	0,03
Формальдегид	0,006	0,12	0,004	0,08	0,004	0,08
Метан	17	-	9	-	10	-

3. Мониторинг качества поверхностных вод на территории Атырауской области

Наблюдения за качеством поверхностных вод по Атырауской области проводились на 17 створах на 6 водных объектах (реки Жайык, Эмба, Кигаш, проток Шаронова, протоки Перетаска и Яик).

Мониторинг **качества морской воды** проводится на следующих **22** прибрежных точках **Северного Каспийского моря**: морской судоходный канал (2), взморье р. Жайык (5), взморье р. Волга (5), станции острова залива Шалыги (5), п.Жанбай (5).

При изучении поверхностных вод в отбираемых пробах воды определяются **43** гидрохимических показателей качества: *визуальные наблюдения, температура, взвешенные вещества, прозрачность, цветность, водородный показатель (pH), растворенный кислород, БПК₅, ХПК, сухой остаток, главные ионы солевого состава, биогенные элементы, органические вещества (нефтепродукты, фенолы), тяжелые металлы, пестициды.*

Мониторинг за состоянием качества поверхностных и морских вод **по гидробиологическим показателям** на территории Атырауской области за отчетный период проводился на **3** водных объектах (рек Жайык, Кигаш и в протоке

Шаронова) на 5 створах. Было проанализировано 5 проб на определение острой токсичности исследуемой воды на тестируемый объект.

3.1 Результаты мониторинга качества поверхностных по гидрохимическим показателям вод на территории Атырауской области

Основным нормативным документом для оценки качества воды водных объектов Республики Казахстан является «Единая система классификации качества воды в водных объектах» (далее – Единая Классификация).

По Единой классификации качество воды оценивается следующим образом:

Таблица 3

Наименование водного объекта	Класс качества воды		Параметры	ед. изм.	концентрация
	Октябрь 2020 г.	Октябрь 2021г.			
р. Жайык	не нормируется (>5 класс)	2 класс	ХПК	мг/дм ³	17,7
пр.Перетаска	4 класс	2 класс	ХПК	мг/дм ³	16,8
пр.Яик	3 класс	2 класс	ХПК	мг/дм ³	16,7
р.Кигаш	5 класс	3 класс	Кадмий	мг/дм ³	0,002
пр.Шаронова	не нормируется (>5 класс)	2 класс	ХПК	мг/дм ³	17,4
р. Эмба		не нормируется (>5 класс)	Взвешенные вещества	мг/дм ³	231

* - 1 класс вода «наилучшего качества»

Как видно из таблицы, в сравнении с октябрь месяцем 2020 года качество поверхностных вод рек Жайык, Шаронова с выше 5 класса перешло во 2 класс, реки Кигаш перешло с 5 класса в 3 класс, протоков Перетаска перешло с 4 класса во 2 класс, Яик с 3 класса перешло во 2 класс - улучшилось.

Основными загрязняющими веществами в водных объектах по Атырауской области являются ХПК, кадмий и взвешенные вещества.

За октябрь 2021 года на территории Атырауской области ВЗ и ЭВЗ не обнаружены.

Информация по качеству водных объектов по гидрохимическим показателям в разрезе створов указана в Приложении 2.

Информация по результатам качества поверхностных вод Северного Каспия указана в Приложении 3.

3.2 Результаты мониторинга качества поверхностных и морских вод по гидробиологическим (токсикологическим) показателям на территории Атырауской области

Река Жайык.

Биотестирование. По данным биотестирования тест-параметр по реке Жайык был предоставлен в последовательном расположения точек наблюдения: поселок Дамба - 0%, г. Атырау 0,5 км ниже сброса КГП «Атырау су арнасы» - 0%, п. Индер «в створе водопоста» - 0%. Полученные данные показывает отсутствие токсического влияния исследуемой воды на тест-объект.

Проток Шаронова.

Биотестирование. В процессе определения острой токсичности воды на тест-объект процент погибших дафний по отношению к контролю (тест- параметр) в протоке - 0%. Токсического влияния на тест-объект не обнаружено.

Река Кигаш.

Биотестирование. Данные полученные в ходе биотестирования по реке Кигаш показали отсутствие токсического влияние на тест-объект. Число выживших дафний в исследуемой воде составило 100%. Тест- параметр составил - 0%.

Информация по качеству водных объектов по токсикологическим показателям в разрезе створов указана в Приложении 4.

4. Состояние загрязнения почв тяжелыми металлами по Атырауской области за осенний период 2021г

За осенний период наблюдения за состоянием почв проводились по пяти контрольным точкам на 5 месторождениях г. **Атырау с.Жанбай, с.Забурунье, с. Жамансор**

В пробах почвы определялись содержание нефтепродуктов, кадмия, свинца, меди, хрома и цинка.

За осенний период на месторождениях **Доссор, Макат, Косшагыл, с.Жанбай, с.Забурунье** в пробах почвы, отобранных в различных точках, содержание свинца находилось в пределах 0,04 – 0,16 мг/кг, цинка - 1,83 - 2,75 мг/кг, меди - 0,01 - 0,58 мг/кг, хрома - 0,04 - 0,1 мг/кг, кадмия - 0,06 - 0,18 мг/кг. На месторождениях и их точках концентрация определяемых примесей не превышали допустимую норму.

5. Химический состав атмосферных осадков на территории Атырауской области

Наблюдения за химическим составом атмосферных осадков заключались в отборе проб дождевой воды на 3 метеостанции

(Атырау, Ганюшкино, Пешной) (рис. 4.3.).

Концентрации всех определяемых загрязняющих веществ в осадках не превышают предельно допустимые концентрации (ПДК).

В пробах осадков преобладало содержание сульфатов 24,77%, хлоридов 77,65%, ионов калия 3,09%, ионов кальция 1,90% ионов магния 4,20%, свинца 22,63%, меди 30,25%.

Наибольшая общая минерализация отмечена на МС Ганюшкино – 35,53 мг/л.

Удельная электропроводимость атмосферных осадков находилась в пределах 63,8 (МС Ганюшкино).


Кислотность выпавших осадков имеет характер слабощелочной среды, находится в пределах от 5,95 (МС Ганюшкино).

6. Радиационная обстановка


Наблюдения за уровнем гамма излучения на местности осуществлялись ежедневно на 3-х метеорологических станциях (Атырау, Пешной, Кульсары) и 1 автоматическом посту г. Кульсары (ПНЗ № 7).

Средние значения радиационного гамма - фона приземного слоя атмосферы в области находились в пределах 0,09 – 0,18 мкЗв/ч. В среднем по области радиационный гамма-фон составил 0,12 мкЗв/ч и находился в допустимых пределах.


Мониторинг за радиоактивным загрязнением приземного слоя атмосферы на территории Атырауской области осуществлялся на метеорологической станции Атырау, путем отбора проб воздуха горизонтальными планшетами (рис.1). На станции проводился пятисуточный отбор проб. Среднесуточная плотность радиоактивных выпадений в приземном слое атмосферы г. Атырау колебалась в пределах 1,5 – 2,2 Бк/м². Средняя величина плотности выпадений составила 1,9 Бк/м², что не превышает предельно-допустимый уровень.




Карта расположения стационарной сети наблюдений за загрязнением атмосферного воздуха города Атырау




Карта расположения стационарной сети наблюдений за загрязнением атмосферного воздуха города Кульсары




Карта расположения стационарной сети наблюдений за загрязнением атмосферного воздуха пос. Ганюшкино



Карта расположения стационарной сети наблюдений за загрязнением атмосферного воздуха село Жанбай



Карта мест расположения экспедиционных точек на территории Атырауской области



Расположения метеостанций за наблюдением атмосферных осадков и снежного покрова на территории Атырауской области



Расположения метеостанций за наблюдением уровня радиационного гамма-фона и плотности радиоактивных выпадений на территории Атырауской области

**Сведения о случаях высокого загрязнения и экстремально высокого загрязнения атмосферного воздуха
г. Атырау за октябрь 2021 года.**

Было зафиксировано в городе Атырау 2 случая ВЗ (по данным постов компаний NCOС)

Высокое загрязнение - г. Атырау										
При мель	День. Месяц, Год	Время	Номер поста	Концентрация		Ветер		Темпе ратура, °С	Атмо сферное давление	Причины от КЭРК
				мг/м³	Кратность превышен ия ПДК	Направ ление, град	Скорость, м/с			
Серо водород	29.10. 2021	21:40	№110 Привокзальный (улица Еркинова)	0,0857	10,71250	-	-	9,57	1020,75	
		22:00		0,08223	10,27875	-	-	9,51	1020,78	

Промышленный мониторинг
Состояние загрязнения атмосферного воздуха по данным станций
мониторинга качества воздуха «North Caspian Operating Company»
за октябрь 2021 года

Для наблюдения за состоянием атмосферного воздуха использовались станции мониторинга качества воздуха (далее - СМКВ), работающие в автоматическом непрерывном режиме.

Наблюдения за загрязнением атмосферного воздуха на территории города Атырау и Атырауской области проводились по данным 19 станций СМКВ «North Caspian Operating Company» (NCOC).

Станций, расположенные в городской зоне мониторинга: «Жилгородок», «Авангард», «Акимат», «Восток», «Загородная», «Привокзальная», «ТКА», «Шагала».

Станций, расположенные в пригородных зонах мониторинга: «Макат», «Доссор», «Самал», «Станция «Ескене», «Поселок «Ескене», «Карабатан», «Таскескен».

Станций расположенные в санитарных защитных зонах: «Болашак Восток», «Болашак Запад», «Болашак Север», «Болашак Юг».

В атмосферном воздухе определяется содержание оксида углерода, диоксида серы, сероводорода, оксида и диоксида азота.

Превышение наблюдалось по сероводороду в районе станции «Шагала» - 6,8250 ПДК_{м.р.}, станции «Восток» – 9,5213 ПДК_{м.р.}, станции «Загородная» - 2,0538 ПДК_{м.р.}, станции «Авангард» - 3,1688 ПДК_{м.р.}, станции «Привокзальный» - 10,71250 ПДК_{м.р.}, станции «Жилгородок» - 3,6488 ПДК_{м.р.}, станции «Акимат» – 6,9888 ПДК_{м.р.}, станции «ТКА» - 4,1013 ПДК_{м.р.}, станции «Болашак Запад» – 13,7063 ПДК_{м.р.}, станции «Болашак Юг» – 2,2425 ПДК_{м.р.}, станции «Болашак Север» – 2,3675 ПДК_{м.р.}, станции «Болашак Восток» – 3,3550 ПДК_{м.р.}, станции «Самал» – 9,7450 ПДК_{м.р.}, станции «Поселок Ескене» – 1,2575 ПДК_{м.р.}, станции «Ескене» – 5,9963 ПДК_{м.р.}, станции «Карабатан» – 5,5225 ПДК_{м.р.}, станции «Таскескен» – 1,1475 ПДК_{м.р.}.

Превышение наблюдалось по оксиду углерода в районе станции «Акимат» - 1,0298 ПДК_{м.р.}, станции «Восток» – 1,2363 ПДК_{м.р.}, станции «Привокзальный» – 1,0765 ПДК_{м.р.}.

Превышение наблюдалось по оксиду азота в районе станции «Восток» - 1,3011 ПДК_{м.р.}.

29 октября 2021 года по данным автоматического поста №110 «Привокзальный», расположенного в городе Атырау, по сероводороду было зафиксировано 2 случая высокого загрязнения (ВЗ) в пределах 10,27875-10,71250 ПДК_{м.р.}.

Концентрации остальных определяемых веществ находились в пределах нормы (таблица к приложению)

Состояние загрязнения атмосферного воздуха по данным станций мониторинга качества воздуха «North Caspian Operating Company»

Станции СМКВ НСОС	Оксид углерода (СО), мг/м ³				Диоксид серы (SO ₂), мг/м ³				Сероводород (H ₂ S), мг/м ³			
	Средняя конц.		Максимальная конц.		Средняя конц.		Максимальная конц.		Средняя конц.		Максимальная конц.	
	мг/м ³	кратность превышения ПДК	мг/м ³	кратность превышения ПДК	мг/м ³	кратность превышения ПДК	мг/м ³	кратность превышения ПДК	мг/м ³	кратность превышения ПДК	мг/м ³	кратность превышения ПДК
Станции расположенные в городской зоне												
Жилгородок	0,6394	0,2131	3,8723	0,7745	0,0032	0,063	0,1828	0,366	0,0016	-	0,0292	3,6488
Авангард	0,4889	0,1630	4,0410	0,8082	0,0039	0,079	0,1373	0,275	0,0018	-	0,0254	3,1688
Акимат	0,7373	0,2458	5,1491	1,0298	0,0027	0,053	0,0661	0,132	0,0033	-	0,0559	6,9888
Восток	0,6731	0,2244	6,1815	1,2363	0,0035	0,071	0,0658	0,132	0,0046	-	0,0762	9,5213
Загородная	0,5196	0,1732	2,1777	0,4355	0,0024	0,048	0,0310	0,062	0,0018	-	0,0164	2,0538
Привокзальный	0,5885	0,1962	5,3824	1,0765	0,0011	0,022	0,0182	0,036	0,0033	-	0,0857	10,71250
ТКА	0,2895	0,0965	0,9806	0,1961	0,0009	0,017	0,0118	0,024	0,0014	-	0,0328	4,1013
Шагала	0,4333	0,1444	3,1159	0,6232	0,0014	0,027	0,0197	0,039	0,0016	-	0,0546	6,8250
Станции расположенные в пригородной зоне												
Доссор	0,3698	0,1233	1,0938	0,2188	0,0004	0,008	0,0029	0,006	0,0024	-	0,0043	0,5325
Макад	0,2835	0,0945	1,6600	0,3320	0,0012	0,023	0,0069	0,014	0,0009	-	0,0060	0,7450
Поселок Ескене	0,1949	0,0650	0,9521	0,1904	0,0006	0,011	0,0095	0,019	0,0003	-	0,0101	1,2575
Самал	0,2351	0,0784	0,5303	0,1061	0,0014	0,029	0,0075	0,015	0,0008	-	0,0780	9,7450
Станция Ескене	0,0695	0,0232	0,3846	0,0769	0,0005	0,009	0,0451	0,090	0,0009	-	0,0480	5,9963
Карабатан	0,1329	0,0443	0,4867	0,0973	0,0009	0,019	0,0132	0,026	0,0008	-	0,0442	5,5225
Таскескен	0,2053	0,0684	0,6394	0,1279	0,0009	0,019	0,0678	0,136	0,0006	-	0,0092	1,1475
Станции расположенные в СЗЗ												
Болашак Восток	0,2321	0,0774	0,3039	0,0608	0,0028	0,057	0,3827	0,765	0,0009	-	0,0268	3,3550
Болашак Запад	0,4345	0,1448	0,7821	0,1564	0,0030	0,060	0,0801	0,160	0,0021	-	0,1097	13,7063
Болашак Север	0,3808	0,1269	2,2045	0,4409	0,0021	0,041	0,0630	0,126	0,0008	-	0,0189	2,3675
Болашак Юг	0,1845	0,0615	0,4991	0,0998	0,0015	0,031	0,1250	0,250	0,0009	-	0,0179	2,2425

продолжение таблицы приложения

Станции СМКВ НСОС	Диоксид азота (NO ₂), мг/м ³				Оксид азота (NO), мг/м ³			
	Средняя конц.		Максимальная конц.		Средняя конц.		Максимальная конц.	
	мг/м ³	кратность превышения ПДК	мг/м ³	кратность превыше ния ПДК	мг/м ³	кратность превышения ПДК	мг/м ³	кратность превышения ПДК
Станции расположенные в городской зоне								
Жилгородок	0,0081	0,2029	0,0458	0,2290	0,0113	0,1889	0,2057	0,5143
Авангард	0,0217	0,5422	0,1135	0,5677	0,0147	0,2451	0,3705	0,9262
Акимат	0,0181	0,4524	0,0836	0,4179	0,0332	0,5537	0,3701	0,9253
Восток	0,0288	0,7207	0,1276	0,6382	0,0237	0,3949	0,5204	1,3011
Загородная	0,0154	0,3852	0,0470	0,2350	0,0183	0,3049	0,1402	0,3506
Привокзальный	0,0073	0,1830	0,0334	0,1669	0,0042	0,0703	0,1266	0,3166
ТКА	0,0050	0,1259	0,0429	0,2146	0,0041	0,0687	0,1040	0,2601
Шагала	0,0129	0,3232	0,0548	0,2740	0,0083	0,1386	0,2474	0,6186
Станции расположенные в пригородной зоне								
Доссор	0,0097	0,2431	0,0836	0,4181	0,0024	0,0399	0,0523	0,1308
Макат	0,0057	0,1416	0,0369	0,1844	0,0032	0,0532	0,0623	0,1557
Поселок Ескене	0,0021	0,0536	0,0239	0,1195	0,0011	0,0178	0,0165	0,0412
Самал	0,0049	0,1232	0,0549	0,2744	0,0016	0,0270	0,0626	0,1565
Станция Ескене	0,0053	0,1337	0,0463	0,2314	0,0020	0,0329	0,0691	0,1728
Карабатан	0,0064	0,1588	0,0792	0,3959	0,0032	0,0542	0,1638	0,4096
Таскескен	0,0045	0,1113	0,0623	0,3113	0,0034	0,0572	0,2071	0,5179
Станции расположенные в СЗЗ								
Болашак Восток	0,0027	0,0681	0,0141	0,0705	0,0003	0,0046	0,0167	0,0416
Болашак Запад	0,0032	0,0801	0,0323	0,1617	0,0006	0,0096	0,0153	0,0382
Болашак Север	0,0023	0,0568	0,0256	0,1279	0,0004	0,0068	0,0631	0,1576
Болашак Юг	0,0017	0,0429	0,0123	0,0615	0,0006	0,0101	0,0278	0,0694

**Состояние загрязнения атмосферного воздуха по данным станций
мониторинга качества воздуха
«Атырауский нефтеперерабатывающий завод» за октябрь 2021 года**

Для наблюдений за состоянием атмосферного воздуха использовались станции мониторинга качества воздуха (далее - СМКВ), работающие в автоматическом непрерывном режиме.

Наблюдения за загрязнением атмосферного воздуха на территории города Атырау проводились на 4 экопостах (№4 «Мирный» – поселок Мирный, улица Гайдара; №1 «Перетаска» – улица Говорова; №3 «Химпоселок» - поселок Химпоселок, улица Менделеева; №2 «Пропарка» - район промывочной станции), расположенных в санитарной защитной зоне.

В атмосферном воздухе определялось содержание оксида углерода, оксида и диоксида азота, диоксида серы, сероводорода, суммарных углеводородов.

В районе экопоста №1 «Перетаска» концентрация оксида углерода составила 1,0904 ПДК_{м.р.},

В районе экопоста №1 «Перетаска» концентрация оксида азота составила 1,1525 ПДК_{м.р.},

В районе экопоста №3 «Химпоселок» концентрация диоксида азота составила 1,04 ПДК_{м.р.},

В районе экопоста №1 «Перетаска» концентрация сероводорода составила 6,875 ПДК_{м.р.}, экопоста №2 «Пропарка» 21,25 ПДК_{м.р.}, экопоста №3 «Химпоселок» 33 ПДК_{м.р.}, экопоста №4 «Мирный» 8 ПДК_{м.р.}

В районе экопоста №1 «Перетаска» концентрация суммарных углеводородов 1,1252 ПДК_{м.р.}, экопоста №3 «Химпоселок» 1,3858 ПДК_{м.р.}, №4 «Мирный» 1,0254 ПДК_{м.р.}

Концентрации остальных определяемых веществ находились в пределах нормы (таблица к приложению).

**Состояние загрязнения атмосферного воздуха по данным станций мониторинга качества воздуха
«Атырауский нефтеперерабатывающий завод»**

Станции АНПЗ	Оксид углерода (CO), мг/м ³				Оксид азота (NO), мг/м ³				Диоксид азота (NO ₂), мг/м ³			
	Концентрации											
	Средняя		Максимальная		Средняя		Максимальная		Средняя		Максимальная	
	мг/м ³	кратность превышения ПДК	мг/м ³	кратность превышения ПДК	мг/м ³	кратность превышения ПДК	мг/м ³	кратность превышения ПДК	мг/м ³	кратность превышения ПДК	мг/м ³	кратность превышения ПДК
Мирный	0,818	0,273	4,002	0,8004	0,010	0,172	0,323	0,8075	0,028	0,696	0,162	0,81
Перетаска	0,792	0,264	5,452	1,0904	0,041	0,691	0,461	1,1525	0,034	0,846	0,179	0,895
Пропарка	0,194	0,065	1,504	0,3008	0,011	0,183	0,155	0,3875	0,018	0,460	0,094	0,47
Химпоселок	0,814	0,271	4,296	0,8592	0,009	0,149	0,297	0,7425	0,027	0,680	0,208	1,04
Станции АНПЗ	Диоксид серы (SO ₂), мг/м ³				Сероводород (H ₂ S), мг/м ³				Суммарные углеводороды, мг/м ³			
	Концентрации											
	Средняя		Максимальная		Средняя		Максимальная		Средняя		Максимальная	
	мг/м ³	кратность превышения ПДК	мг/м ³	кратность превышения ПДК	мг/м ³	кратность превышения ПДК	мг/м ³	кратность превышения ПДК	мг/м ³	кратность превышения ПДК	мг/м ³	кратность превышения ПДК
Мирный	0,029	0,571	0,29	0,58	0,004	-	0,064	8	0,562	-	5,127	1,0254
Перетаска	0,036	0,717	0,472	0,944	0,005	-	0,055	6,875	0,746	-	5,626	1,1252
Пропарка	0,007	0,132	0,342	0,684	0,008	-	0,17	21,25	0,747	-	3,37	0,6748
Химпоселок	0,010	0,202	0,201	0,402	0,008	-	0,264	33	0,830	-	6,929	1,3858

**Информация о качестве поверхностных вод по Атырауской области
по створам**

Водный объект и створ	Характеристика физико-химических параметров	
река Жайык	температура воды отмечена в пределах 15,3-18°C, водородный показатель 6,83-7,2, концентрация растворенного в воде кислорода – 9,5-10,5 мг/дм ³ , БПК ₅ – 2,0-2,8 мг/дм ³ , прозрачность – 20,3-22,1 см	
створ п.Индер в створе водпоста	2 класс	ХПК – 23,0 мг/дм ³ . Фактическая концентрация ХПК превышает фоновый класс.
створ 1 км выше г.Атырау	1 класс	
створ г.Атырау, 0,5 км выше сброса КГП «Атырау су арнасы»	2 класс	ХПК – 18,0 мг/дм ³
створ г.Атырау, 0,5 км ниже сброса КГП «Атырау су арнасы»	1 класс	
створ 1 км ниже г.Атырау	2 класс	ХПК – 16,3 мг/дм ³
створ г.Атырау 0,5 км выше РГКП «Урало-Атырауский осетровый завод» район Курилкино	2 класс	ХПК – 19,6 мг/дм ³
створ г.Атырау 3 км ниже РГКП «Урало-Атырауский осетровый завод» район Курилкино	2 класс	ХПК – 16,5 мг/дм ³
створ п.Дамба	2 класс	ХПК – 21,8 мг/дм ³ Фактическая концентрация ХПК превышает фоновый класс.
проток Перетаска	температура воды отмечена в пределах 17,4-19,8°C, водородный показатель 6,9-7,2, концентрация растворенного в воде кислорода – 9,85-10,9 мг/дм ³ , БПК ₅ – 2,0-2,4 мг/дм ³ , прозрачность – 20,9-21,5 см	
створ г.Атырау 2 км выше сброса АО «Атырауский ТЭЦ»	1 класс	
створ г.Атырау 2 км ниже сброса АО «Атырауский ТЭЦ»	2 класс	ХПК – 21,5 мг/дм ³
створ г.Атырау 0,5 км ниже ответвления протока Перетаска	2 класс	ХПК – 15,1 мг/дм ³
проток Яик	температура воды отмечена в пределах 15,1-16,2°C, водородный показатель 6,75-7,1, концентрация растворенного в воде кислорода – 9-10,4 мг/дм ³ , БПК ₅ – 2,0-2,6 мг/дм ³ , прозрачность – 20,8-21,5 см	
створ г.Атырау, 0,5 км ниже ответвления протока Яик	1 класс	
створ г.Атырау п.Еркинкала, 0,5 км выше сброса РГКП «Атырауский осетровый рыбоводный завод»	2 класс	ХПК – 15,2 мг/дм ³
створ г.Атырау п.Еркинкала, 0,5 км ниже сброса РГКП «Атырауский осетровый рыбоводный завод»	2 класс	ХПК – 20,6 мг/дм ³
проток Шаронова	температура воды отмечена на уровне 17,9°C, водородный показатель 6,8, концентрация растворенного в воде кислорода – 9,5 мг/дм ³ , БПК ₅ – 2,2 мг/дм ³ , прозрачность – 20,2 см	
створ проток Шаронова – с.Ганюшкино, в створе водпоста	2 класс	ХПК – 17,4 мг/дм ³ . Фактическая концентрация ХПК превышает фоновый класс.

река Кигаш	температура воды отмечена в пределах 18,9°C, водородный показатель 6,8, концентрация растворенного в воде кислорода – 9,8мг/дм ³ , БПК ₅ –2,0мг/дм ³ , прозрачность – 21,1см, цветность – 20,9 градусов	
створ р.Кигаш – с.Котьяевка, в створе водпоста	3 класс	кадмий – 0,002 мг/дм ³ .
река Эмба	температура воды отмечена на уровне 17,6°C, водородный показатель 6,6, концентрация растворенного в воде кислорода – 9,1 мг/дм ³ , БПК ₅ –2,7мг/дм ³ , прозрачность – 19,8 см	
створ р.Эмба – с.Аккистогай, в створе водпоста	не нормируется (>5 класса)	взвешенные вещества - 231 мг/дм ³ . Фактическая концентрация взвешенных веществ превышает фоновый класс.
Каспийское море	температура воды отмечена в пределах -17,8-19,8°C, величина водородного показателя морской воды –6,7-7,2, содержание растворенного кислорода – 8,9-9,9мг/дм ³ , БПК ₅ –2,0-3,0мг/дм ³ , ХПК-15,0-21,9мг/дм ³ , взвешенные вещества- 46-263мг/дм ³ , минерализация- 1704-7118мг/дм ³ .	

* - 1 класс вода «наилучшего качества»

Приложение 3

Результаты качества морских вод Каспийского моря на территории Атырауской области

	Наименование ингредиентов	Единицы измерения	Октябрь 2021
			Северный Каспий
1	Визуальные наблюдения		
2	Температура	°С	18,4
3	Водородный показатель		7,0
4	Растворенный кислород	мг/дм ³	9,4
5	Прозрачность	см	21,2
6	Взвешенные вещества	мг/дм ³	149
7	БПК ₅	мг/дм ³	2,5
8	ХПК	мг/дм ³	17,6
9	Гидрокарбонаты	мг/дм ³	105,9
10	Жесткость	мг/дм ³	16,2
11	Минерализация	мг/дм ³	3387
12	Натрий	мг/дм ³	15
13	Калий	мг/дм ³	13
14	Сухой остаток	мг/дм ³	1,2
15	Кальций	мг/дм ³	87,2
16	Магний	мг/дм ³	144
17	Сульфаты	мг/дм ³	1446
18	Хлориды	мг/дм ³	1572
19	Фосфат	мг/дм ³	0,007
20	Фосфор общий	мг/дм ³	0,002
21	Азот нитритный	мг/дм ³	0,02
22	Азот нитратный	мг/дм ³	0,02
23	Железо общее	мг/дм ³	0,01
24	Аммоний солевой	мг/дм ³	0,3
25	Свинец	мг/дм ³	0,002
26	Медь	мг/дм ³	0,001
27	Цинк	мг/дм ³	0,002

28	Хром общий	мг/дм ³	0,002
29	Хром (6+)	мг/дм ³	0,003
30	АПАВ /СПАВ	мг/дм ³	0,035
31	Фенолы	мг/дм ³	0,0007
32	Нефтепродукты	мг/дм ³	0,034
33	Бор	мг/дм ³	0,03
34	Пестициды альфа -ГХЦГ	мкг/дм ³	
35	Пестициды гамма-ГХЦГ	мкг/дм ³	
36	Пестициды 4,4-ДДЕ	мкг/дм ³	
37	Пестициды 4,4-ДДТ	мкг/дм ³	

Приложение 4

Информация о качестве поверхностных и морских вод по гидробиологическим (токсикологическим) показателям

№	Водный объект	Пункт контроля	Пункт привязки	Индекс соприобности		Класс качества воды	Биотестирование		
				Перифитон	Бентос		Тест параметр, %	Оценка воды	
1	р.Жайык	пос.Дамба		-	-	3	0%	Не оказывает токсического действия	
2		г.Атырау	0,5 км ниже сброса КПП «Атырау Суарнасы»	-	-	3	0%		
3		п.Индер	в створе водпоста	-	-	3	0%		
4		проток Шаронова	с.Ганюшкино	в створе водпоста	-	-	3		0%
5		р.Кигаш	с.Котьяевка	в створе водпоста	-	-	3		0%

Приложение 5

Справочный раздел Предельно-допустимые концентрации (ПДК) загрязняющих веществ в воздухе населенных мест

Наименование примесей	Значения ПДК, мг/м ³		Класс опасности
	максимально разовая	средне-суточная	
Азота диоксид	0,2	0,04	2
Азота оксид	0,4	0,06	3
Аммиак	0,2	0,04	4
Бенз/а/пирен	-	0,1 мкг/100 м ³	1
Бензол	0,3	0,1	2
Бериллий	0,09	0,00001	1
Взвешенные вещества (частицы)	0,5	0,15	3
Взвешенные частицы РМ 10	0,3	0,06	

Взвешенные частицы РМ 2,5	0,16	0,035	
Хлористый водород	0,2	0,1	2
Кадмий	-	0,0003	1
Кобальт	-	0,001	2
Марганец	0,01	0,001	2
Медь	-	0,002	2
Мышьяк	-	0,0003	2
Озон	0,16	0,03	1
Свинец	0,001	0,0003	1
Диоксид серы	0,5	0,05	3
Серная кислота	0,3	0,1	2
Сероводород	0,008	-	2
Оксид углерода	5,0	3	4
Фенол	0,01	0,003	2
Формальдегид	0,05	0,01	2
Фтористый водород	0,02	0,005	2
Хлор	0,1	0,03	2
Хром (VI)	-	0,0015	1
Цинк	-	0,05	3

«Гигиенический норматив к атмосферному воздуху в городских и сельских населенных пунктах» (СанПин №168 от 28 февраля 2015 года)

Оценка степени индекса загрязнения атмосферы

Градации	Загрязнение атмосферного воздуха	Показатели	Оценка за месяц
I	Низкое	СИ НП, %	0-1 0
II	Повышенное	СИ НП, %	2-4 1-19
III	Высокое	СИ НП, %	5-10 20-49
IV	Очень высокое	СИ НП, %	>10 >50

РД 52.04.667–2005, Документы состояния загрязнения атмосферы в городах для информирования государственных органов, общественности и населения. Общие требования к разработке, постороению, изложению и содержанию

**ФИЛИАЛ РГП «КАЗГИДРОМЕТ»
ПО АТЫРАУСКОЙ ОБЛАСТИ**

АДРЕС:

**ГОРОД АТЫРАУ
УЛ. ТАЛГАТА БИГЕЛЬДИНОВА 10А
ТЕЛ. 8-(7122)-26-27-68**

E MAIL:INFO_ATR@METEO.KZ