

Информационный бюллетень о состоянии окружающей среды Жамбылской области

Выпуск № 01
Январь 2022 года



Министерство экологии и природных ресурсов
Республики Казахстан
Филиал РГП «Казгидромет»
по Жамбылской области

	СОДЕРЖАНИЕ	Стр.
1	Предисловие	3
2	Основные источники загрязнения атмосферного воздуха	4
3	Состояние качества атмосферного воздуха	4
4	Состояние качества поверхностных вод	13
5	Радиационная обстановка	14
6	Состояние качества атмосферных осадков	14
7	Приложение 1	15
8	Приложение 2	17

Предисловие

Информационный бюллетень подготовлен по результатам работ, выполняемых специализированными подразделениями РГП «Казгидромет» по ведению мониторинга за состоянием окружающей среды на наблюдательной сети национальной гидрометеорологической службы.

Бюллетень предназначен для информирования государственных органов, общественности и населения о состоянии окружающей среды на территории Жамбылской области и необходим для дальнейшей оценки эффективности мероприятий в области охраны окружающей среды РК с учетом тенденций происходящих изменений уровня загрязнения.

Оценка качества атмосферного воздуха Жамбылской области

1. Основные источники загрязнения атмосферного воздуха

Согласно данным департамента статистики Жамбылской области в городе Тараз действует 4 264 предприятий, осуществляющих эмисии в окружающую среду. Фактические суммарные выбросы загрязняющих веществ от стационарных источников составляют 28,3 тысяч тонн. В поселке Кордай действует 1116 предприятий, осуществляющих эмисии в окружающую среду. Фактические суммарные выбросы загрязняющих веществ от стационарных источников составляют 2,5 тысяч тонн.

Согласно данным департамента статистики Жамбылской области в городе Тараз насчитывается 36 474 индивидуальных домов; в городе Жанатас насчитывается 1439 индивидуальных домов; городе Карагатау насчитывается 3 185 индивидуальных домов; городе Шу насчитывается 6 650 индивидуальных домов.

2. Мониторинг качества атмосферного воздуха в г. Тараз

Наблюдения за состоянием атмосферного воздуха на территории г. Тараз проводятся на 5 постах наблюдения, в том числе на 4 постах ручного отбора проб и на 1 автоматической станции (Приложение 1).

В целом по городу определяется до 16 показателей: 1) взвешенные частицы (пыль); 2) взвешенные частицы РМ 2,5; 3) взвешенные частицы РМ 10; 4) диоксид серы; 5) оксид углерода; 6) диоксид азота; 7) оксид азота; 8) фтористый водород; 9) формальдегид; 10) озон (приземный); 11) сероводород; 12) бенз(а)пирен; 13) марганец; 14) свинец; 14) кобальт; 14) кадмий.

В таблице 1 представлена информация о местах расположения постов наблюдений и перечне определяемых показателей на каждом посту.

Таблица 1

Место расположения постов наблюдений и определяемые примеси

№	Отбор проб	Адрес поста	Определяемые примеси
1	ручной отбор проб	ул. Чимкентская, 22	взвешенные частицы (пыль),
2		ул. Рысбек батыра, 15, угол ул. Ниеткалиева	диоксид серы, оксид углерода,
3		угол ул. Абая и Толе би	диоксид азота, оксид азота,
4		ул. Байзак батыра, 162	фтористый водород, формальдегид, бенз(а)пирен, свинец, марганец, кадмий, кобальт
6	в непрерыв- ном режиме – каждые 20 минут	ул. Сатпаева и проспект Джамбула	взвешенные частицы РМ 2,5, взвешенные частицы РМ 10, диоксид серы, оксид углерода, диоксид азота, оксид азота, сероводород, озон (приземный)

Результаты мониторинга качества атмосферного воздуха в г. Тараз за январь 2022 года.

По данным сети наблюдений г. Тараз, уровень загрязнения атмосферного воздуха оценивался как **повышенный**, он определялся значением СИ=3 по оксиду

углероду и НП=1% по диоксиду в районе поста №6 (ул.Сатпаева и проспекта Джамбула).

Максимальные разовые концентрации оксида углерода составили 3,4 ПДК_{м.р.}, сероводорода – 1,2ПДК_{м.р.} концентрации других загрязняющих веществ в атмосферном воздухе не превышали ПДК.

Превышения по среднесуточным нормативам не наблюдались.

Случаи экстремально высокого и высокого загрязнения (ВЗ и ЭВЗ): ВЗ (более 10 ПДК) и ЭВЗ (более 50 ПДК) не были отмечены.

Фактические значения, а также кратность превышений нормативов качества и количество случаев превышения указаны в Таблице 2.


Таблица 2

Характеристика загрязнения атмосферного воздуха

Примесь	Средняя концентрация		Максимальная разовая концентрация		НП	Число случаев превышения ПДК _{м.р.}		
	мг/м ³	Крат-ность ПДК _{с.с.}	мг/м ³	Крат-ность ПДК _{м.р.}		> ПДК	>5 ПДК	>10 ПДК
г. Тараз								
Взвешенные частицы (пыль)	0,1	0,80	0,3	0,6	0,00			
Взвешенные частицы РМ 2,5	0,009	0,26	0,06	0,40	0,00			
Взвешенные частицы РМ 10	0,013	0,22	0,14	0,47	0,00			
Диоксид серы	0,013	0,26	0,147	0,29	0,00			
Оксид углерода	1,1	0,36	17,0	3,40	0,16	4		
Диоксид азота	0,039	0,98	0,11	0,55	0,00			
Оксид азота	0,02	0,41	0,19	0,48	0,00			
Озон	0,01	0,25	0,05	0,32	0,00			
Фтористый водород	0,002	0,34	0,004	0,20	0,00			
Формальдегид	0,006	0,60	0,013	0,26	0,00			
Сероводород	0,002	-	0,009	1,15	0,67	15		
Бенз(а)пирен	0,0001	0,1	0,0005					
Свинец	0,000023	0,078	0,000038					
Марганец	0,000013	0,013	0,000025					
Кадмий	0	0	0					
Кобальт	0	0	0					

Выходы:

За последние пять лет уровень загрязнения атмосферного воздуха в январе менялся следующим образом:



Как видно из графика, за последние пять лет уровень загрязнения атмосферного воздуха в январе месяце оценивается как повышенный.

Количество превышений максимально-разовых ПДК было отмечено по оксиду углероду (15), сероводороду (4).

Превышения по среднесуточным концентрациям не наблюдалось.

Основными источниками загрязнения оксидом углерода является автотранспорт и сжигание твердого топлива.

Многолетнее увеличение показателя «наибольшая повторяемость» отмечено в основном за счет диоксида азота, что свидетельствует о значительном вкладе в загрязнение воздуха автотранспорта на загруженных перекрестках города и о постоянном накоплении этого загрязняющего вещества в атмосфере города.

Метеорологические условия

В январе месяце наблюдалась неустойчивая, относительно теплая погода. Наблюдалась частая смена циклонов и антициклонов. Сильные осадки в виде дождя и снега наблюдались во 2-ой декаде. Понижение температуры воздуха ночью до 9-14 градусов мороза наблюдалось в 3-ей декаде на севере области и в горных районах. При прохождении фронтальных разделов наблюдалось усиление ветра до 20-25 м/с. В течении месяца туманы наблюдались часто, гололед в 1-ой и во 2-ой декадах.

В январе дней с НМУ (неблагоприятных метеоусловий) не зафиксировано.

2.1 Мониторинг качества атмосферного воздуха в г.Жанатас

Наблюдения за состоянием атмосферного воздуха на территории г. Жанатас проводятся на 1 автоматической станции (Приложение 1).

В целом по городу определяется до 3 показателей: 1) диоксид серы; 2) оксид углерода; 3) сероводород.

В таблице 3 представлена информация о месте расположения поста наблюдений и перечне определяемых показателей на посту.

Таблица 3

Место расположения постов наблюдений и определяемые примеси

№	Отбор проб	Адрес поста	Определяемые примеси
---	------------	-------------	----------------------

1	в непрерывном режиме – каждые 20 минут	ул. Токтарова, 27/1 и 27-а	диоксид серы, оксид углерода, сероводород
---	--	----------------------------	---

Результаты мониторинга качества атмосферного воздуха в г. Жанатас за январь 2022 года.

По данным сети наблюдений г.Жанатас, уровень загрязнения атмосферного воздуха города характеризовался как **повышенный**, он определялся значением СИ равным 1 (низкий) и НП = 2% (повышенный) по сероводороду.

*Согласно РД, если СИ и НП попадают в разные градации, то степень загрязнения атмосферы оценивается по наибольшему значению из этих показателей.

Максимальные разовые концентрации сероводорода составили 1,2 ПДК_{м.р.}, концентрации других загрязняющих веществ в атмосферном воздухе не превышали ПДК.

Средние концентрации концентрации загрязняющих веществ не превышали ПДК.

Случаи экстремально высокого и высокого загрязнения (ВЗ и ЭВЗ): ВЗ (более 10 ПДК) и ЭВЗ (более 50 ПДК) не были отмечены.

Фактические значения, а также кратность превышений нормативов качества и количество случаев превышения указаны в Таблице 4.


Таблица 4

Характеристика загрязнения атмосферного воздуха

Примесь	Средняя концентрация		Максимальная разовая концентрация		НП %	Число случаев превышения ПДК _{м.р.}		
	мг/м ³	Крат- ность ПДК _{с.с.}	мг/м ³	Крат- ность ПДК _{м.р.}		> ПДК	>5 ПДК	>10 ПДК
г. Жанатас								
Диоксид серы	0,006	0,13	0,054	0,11	0,00			
Оксид углерода	0,0	0,0	0,0	0,0	0,00			
Сероводород	0,004		0,010	1,19	1,67	28		

Выводы:

За последние пять лет уровень загрязнения атмосферного воздуха в январе изменялся следующим образом:



Как видно из графика, уровень загрязнения в течение последних пяти лет нестабилен. В 2018-2019, 2021 гг. уровень загрязнения атмосферного воздуха оценивался как низкий, в 2020, 2022 гг. как повышенный.

Количество превышений максимально-разовых ПДК было отмечено по сероводороду (28).

Средние концентрации концентрации загрязняющих веществ не превышали ПДК.

Загрязнение воздуха города сероводородом образуется при бактериальном разложении отходов жизнедеятельности человека и животных, и присутствует в выбросах очистных сооружений и свалок.

2.2 Мониторинг качества атмосферного воздуха в г. Карагату

Наблюдения за состоянием атмосферного воздуха на территории г. Карагату проводятся на 1 автоматической станции (Приложение 1).

В целом по городу определяется 2 показателя: 1) диоксид серы; 2) сероводород.

В таблице 5 представлена информация о месте расположения поста наблюдений и перечне определяемых показателей на посту.

Таблица 5
Место расположения постов наблюдений и определяемые примеси

№	Отбор проб	Адрес поста	Определяемые примеси
1	в непрерывном режиме каждые 20 минут	ул. Тамды аулие, №130	диоксид серы, сероводород

Результаты мониторинга качества атмосферного воздуха в г. Карагату в январе 2022 года.

По данным сети наблюдений, уровень загрязнения атмосферного воздуха города оценивался как **повышенный**, он определялся значением СИ равным 1 по сероводороду и НП = 1%.

Максимальные разовые концентрации сероводорода составили 1,3 ПДК_{м.р.}, концентрации других загрязняющих веществ в атмосферном воздухе не превышали ПДК.

Средние концентрации загрязняющих веществ не превышали ПДК.

Случаи экстремально высокого и высокого загрязнения (ВЗ и ЭВЗ): ВЗ (более 10 ПДК) и ЭВЗ (более 50 ПДК) не были отмечены.

Фактические значения, а также кратность превышений нормативов качества и количество случаев превышения указаны в Таблице 6.


Таблица 6

Характеристика загрязнения атмосферного воздуха

Примесь	Средняя концентрация		Максимальная разовая концентрация		НП %	Число случаев превышения ПДК _{м.р.}		
	мг/м ³	Крат- ность ПДК _{с.с.}	мг/м ³	Крат- ность ПДК _{м.р.}		> ПДК	>5 ПДК	>10 ПДК
г. Каратау								
Диоксид серы	0,009	0,18	0,037	0,07	0,00			
Сероводород	0,003	-	0,010	1,3	0,57	9		

Выводы:

За последние пять лет уровень загрязнения атмосферного воздуха в январе изменялся следующим образом:



Как видно из графика, уровень загрязнения в течении последних пяти лет имеет тенденции к снижению. По сравнению с 2018-2019 года качество воздуха города Каратау в 2022 году улучшилось.

Количество превышений максимально-разовых ПДК было отмечено по сероводороду (9).

Средние концентрации концентрации загрязняющих веществ не превышали ПДК.

Загрязнение воздуха города сероводородом образуется при бактериальном разложении отходов жизнедеятельности человека и животных, и присутствует в выбросах очистных сооружений и свалок.

2.3 Мониторинг качества атмосферного воздуха в г. Шу

Наблюдения за состоянием атмосферного воздуха на территории г. Шу проводятся на 1 автоматической станции (Приложение 1).

В целом по городу определяется 8 показателей: 1) взвешенные частицы РМ 2,5; 2) взвешенные частицы РМ 10; 3) диоксид серы; 4) оксид углерода; 5) диоксид азота; 6) оксид азота; 7) сероводород, 8)аммиак.

В таблице 7 представлена информация о месте расположения поста наблюдений и перечне определяемых показателей на посту.

Таблица 7
Место расположения постов наблюдений и определяемые примеси

№	Отбор проб	Адрес поста	Определяемые примеси
1	в непрерывном режиме каждые 20 минут	возле Шуйской городской больницы	взвешенные частицы РМ 2,5, взвешенные частицы РМ 10, диоксид серы, оксид углерода, диоксид и оксид азота, сероводород, аммиак

Результаты мониторинга качества атмосферного воздуха в г. Шу за январь 2022 года.

По данным сети наблюдений г.Шу, уровень загрязнения атмосферного воздуха оценивался как **повышенный**, он определялся значением СИ равным 1(низкий) по диоксиду азоту и НП = 2 % (повышенный) по сероводороду.

*Согласно РД, если СИ и НП попадают в разные градации, то степень загрязнения атмосферы оценивается по наибольшему значению из этих показателей.

Максимальные разовые концентрации диоксида азота составили 1,3 ПДК_{м.р.}, сероводорода – 1,2 ПДК_{м.р.}.

Превышения по среднесуточным нормативам наблюдались: по диоксиду азоту 2,0 ПДК_{с.с.}. По другим показателям превышений ПДК_{с.с.} не наблюдалось.

Случаи экстремально высокого и высокого загрязнения (ВЗ и ЭВЗ): ВЗ (более 10 ПДК) и ЭВЗ (более 50 ПДК) не были отмечены.

Фактические значения, а также кратность превышений нормативов качества и количество случаев превышения указаны в Таблице 8.

Таблица 8


Характеристика загрязнения атмосферного воздуха

Примесь	Средняя концентрация		Максимальная разовая концентрация		НП	Число случаев превышения ПДК_{м.р.}		
	мг/м³	Кратность ПДК_{с.с.}	мг/м³	Кратность ПДК_{м.р.}	%	> ПДК	>5 ПДК	>10 ПДК
г. Шу								
Взвешенные частицы РМ 2,5	0,002	0,04	0,002	0,01	0,00			
Взвешенные частицы РМ 10	0,001	0,02	0,001	0,004	0,00			
Диоксид серы	0,020	0,41	0,070	0,14	0,00			
Оксид углерода	0,26	0,09	2,54	0,51	0,00			
Диоксид азота	0,08	2,03	0,26	1,32	1,06	21		

Оксид азота	0,02	0,28	0,22	0,54	0,00			
Сероводород	0,005	-	0,010	1,20	1,63	31		
Аммиак	0,037	0,91	0,10	0,51	0,00			

Выводы:

За последние пять лет уровень загрязнения атмосферного воздуха в январе изменялся следующим образом:



Как видно из графика, уровень загрязнения за последние пять лет характеризуется как повышенный, исключение 2019 г – низкий уровень.

Количество превышений максимально-разовых ПДК было отмечено по сероводороду (31), диоксиду азоту (21).

Превышения по среднесуточным нормативам наблюдались по диоксиду азоту.

Загрязнение воздуха города сероводородом образуется при бактериальном разложении отходов жизнедеятельности человека и животных, и присутствует в выбросах очистных сооружений и свалок. Загрязнение диоксидом азота свидетельствует о значительном вкладе в загрязнение воздуха автотранспорта и о постоянном накоплении этого загрязняющего вещества в атмосфере города. А также оно характерно для осенне-зимнего сезона, сопровождающегося влиянием выбросов от отопления частного сектора.

2.4 Мониторинг качества атмосферного воздуха в п. Кордай

Наблюдения за состоянием атмосферного воздуха на территории поселка Кордай проводятся на 1 автоматической станции (Приложение 1).

В целом по поселку определяется 6 показателей: 1) диоксид серы; 2) оксид углерода; 3) диоксид азота; 4) оксид азота; 5) , озон (приземный); 6) аммиак.

В таблице 9 представлена информация о месте расположения поста наблюдений и перечне определяемых показателей на посту.

Таблица 9

Место расположения поста наблюдений и определяемые примеси

№	Отбор проб	Адрес поста	Определяемые примеси
1	в непрерывном режиме каждые 20 минут	ул. Жибек жолы, №49б «А»	диоксид серы, оксид углерода, диоксид и оксид азота, озон (приземный), аммиак.

Результаты мониторинга качества атмосферного воздуха в п.Кордай за январь 2022 года.

По данным сети наблюдений п.Кордай, уровень загрязнения атмосферного воздуха оценивался как **низкий**, он определялся значением СИ равным 1 по озону (приземному) и НП = 0%.

Максимальные разовые концентрации загрязняющих веществ не превышали ПДК.

Превышения по среднесуточным нормативам наблюдались: по озону (приземный) 1,1 ПДК_{с.с.}. По другим показателям превышений ПДК_{с.с.} не наблюдалось.

Случаи экстремально высокого и высокого загрязнения (ВЗ и ЭВЗ): ВЗ (более 10 ПДК) и ЭВЗ (более 50 ПДК) не были отмечены.

Фактические значения, а также кратность превышений нормативов качества и количество случаев превышения указаны в Таблице 10.


Таблица 10

Характеристика загрязнения атмосферного воздуха

Примесь	Средняя концентрация		Максимальная разовая концентрация		НП	Число случаев превышения ПДК _{м.р.}		
	мг/м ³	Кратность ПДК _{с.с.}	мг/м ³	Кратность ПДК _{м.р.}		%	> ПДК	>5 ПДК
п.Кордай								
Диоксид серы	0,000	0,00	0,000	0,00	0,00			
Оксид углерода	0,60	0,20	2,56	0,51	0,00			
Диоксид азота	0,015	0,37	0,016	0,08	0,00			
Оксид азота	0,007	0,11	0,008	0,02	0,00			
Озон (приземный)	0,034	1,13	0,154	0,96	0,00			
Аммиак	0,002	0,05	0,003	0,01	0,00			

Выводы:

За последние пять лет уровень загрязнения атмосферного воздуха в январе менялся следующим образом:



Как видно из графика, уровень загрязнения в основном на низком уровне, исключение 2019 год – повышенный уровень загрязнения.

Количество превышений максимально-разовых ПДК не отмечено.

Превышения по среднесуточным концентрациям наблюдалось по озону (приземный).

Приземный озон одна из основных составляющих фотохимического смога. Он образуется в результате действия солнечного света (фотохимической реакции) на воздух, загрязненный оксидами азота (NO_x), которые попадают в атмосферу с выхлопами двигателей внутреннего сгорания и промышленными выбросами. Самые высокие уровни загрязнения озоном наблюдаются в периоды ясной погоды.

3.Мониторинг качества поверхностных вод на территории Жамбылской области

Наблюдения за качеством поверхностных вод по Жамбылской области проводились на 12 створах 7 водных объектах (реки Шу, Талас, Асса, Аксу, Карабалта, Токташ, Сарыкау).

При изучении поверхностных вод в отбираемых пробах воды определяются 36 физико-химических показателей качества: *визуальные наблюдения, расход воды, температура воды, водородный показатель, прозрачность, растворенный кислород, взвешенные вещества, БПК₅, ХПК, главные ионы солевого состава, биогенные элементы, органические вещества (нефтепродукты, фенолы), тяжелые металлы, пестициды*.

3.1. Результаты мониторинга качества поверхностных вод на территории Жамбылской области

Основным нормативным документом для оценки качества воды водных объектов Республики Казахстан является «Единая система классификации качества воды в водных объектах» (далее – Единая Классификация).

По Единой классификации качество воды оценивается следующим образом:

Таблица 11

Наименование водного объекта	Класс качества воды		Параметры	ед. изм.	Концентрация
	Январь 2021 г.	Январь 2022 г.			
река Талас	3 класс	не нормируется (>5 класс)	Взвешенные вещества	мг/дм ³	58,3
река Асса	не нормируется (>5 класс)	не нормируется (>5 класс)	Взвешенные вещества	мг/дм ³	58,5
река Шу	4 класс	не нормируется (>3 класс)	Фенолы*	мг/дм ³	0,0015
река Аксу	3 класс	4 класс	Магний	мг/дм ³	42,6
река Карабалта	4 класс	4 класс	Магний	мг/дм ³	58,8
			Фенолы	мг/дм ³	0,002
река Токташ	4 класс	4 класс	Магний	мг/дм ³	60,8
река Сарыкау	не нормируется (>5 класс)	4 класс	Магний	мг/дм ³	41,2
			Фенолы	мг/дм ³	0,002

* - вещества для данного класса не нормируется

Из таблицы видно, что в сравнении с этим же периодом 2021 года класс качества поверхностных вод в реках Шу с 4 класса перешло к выше 3 классу, Сарыкау с выше 5 класса к 4 классу – улучшилось;

Качество поверхностных вод в реках Талас с 3 класса перешло к выше 5 классу, Аксу с 3 класса перешло к 4 классу, – ухудшилось;

В реках Асса, Карабалта и Токташ качество поверхностных вод существенно не изменилось.

Основными загрязняющими веществами в водных объектах на территории Жамбылской области являются магний, фенолы и взвешенные вещества.

За январь 2022 года на территории Жамбылской области случаи ВЗ не обнаружены.

Информация по качеству водных объектов в разрезе створов указана в Приложении 2.

4. Радиационная обстановка

Наблюдения за уровнем гамма излучения на местности осуществлялись ежедневно на 3-х метеорологических станциях (Тараз, Толе би, Чиганак) (рис.6.6).

Значения радиационного гамма-фона приземного слоя атмосферы по населенным пунктам области находились в пределах 0,08-0,25 мкЗв/ч. В среднем по области радиационный гамма-фон составил 0,16 мкЗв/ч.

Наблюдение за радиоактивным загрязнением приземного слоя атмосферы на территории Жамбылской области осуществлялся на 3-х метеорологических станциях (Тараз, Толе би, Чиганак) путем отбора проб воздуха горизонтальными планшетами. На всех станциях проводился пятисугубочный отбор проб.

Плотность радиоактивных выпадений в приземном слое атмосферы на территории области колебалась в пределах 1,8-2,9 Бк/м². Средняя величина плотности выпадений по области составила 2,1 Бк/м².

5. Состояние качества атмосферных осадков

Наблюдение за состоянием качества атмосферных осадков выполнялось на метеостанциях Тараз, Толе би, Карагатай.

В пробах преобладало содержание гидрокарбонатов 28,35%, сульфатов 26,29%, хлоридов 14,8%, ионов кальция 13,28%, ионов натрия 5,99%, ионов калия 2,47%.

Наибольшая общая минерализация отмечена на уровне 120,88 мг/л на МС Карагатай, наименьшая 57,98 мг/л на МС Толе би.

Удельная электропроводимость атмосферных осадков находилась в пределах от 102,0 мкСМ/см на МС Толе би до 197,00 мкСМ/см на МС Карагатай.

Кислотность выпавших осадков находится в пределах от 6,3 на МС Толе би до 6,94 на МС Карагатай.

Концентрации всех определяемых загрязняющих веществ в осадках не превышали предельно допустимые концентрации (ПДК).

Приложение 1




Рис.1 – карта мест расположения постов наблюдения и метеостанции г. Тараз




Рис.2 - карта мест расположения поста наблюдений и метеостанции г. Жанатас



Рис.3 - карта мест расположения поста наблюдений и метеостанции г. Каратай




Рис.4 - карта мест расположения поста наблюдений г. Шу




Рис.5 - карта мест расположения поста наблюдений п.Кордай

Приложение 2

Информация о качестве поверхностных вод Жамбылской области по створам

Водный объект и створ	Характеристика физико-химических параметров	
река Талас	температура воды находилась в пределах от 5,0 до 19,0 $^{\circ}\text{C}$, водородный показатель равен 7,80 - 8,10, концентрация растворенного в воде кислорода 10,2 -11,7 мг/дм 3 , БПК ₅ 1,08 – 2,08 мг/дм 3 , прозрачность 12-14 см во всех створах.	
створ с. Жасоркен, 0,7 км выше	не нормируется (>5 класса)	взвешенные вещества – 55,0 мг/дм 3 . Фактическая концентрация взвешенных веществ превышает фоновый класс.
створ п. Солнечный, 0,5 км ниже гидропоста	не нормируется (>5 класса)	взвешенные вещества – 57,0 мг/дм 3 . Фактическая концентрация взвешенных веществ превышает фоновый класс.
створ г. Тараз, 7,5 км выше г. Тараз, 0,7 км выше сброса сточных вод ГРЭС	не нормируется (>5 класса)	взвешенные вещества – 62,0 мг/дм 3 . Фактическая концентрация взвешенных веществ превышает фоновый класс.
створ г. Тараз, 10 км ниже г. Тараз, 0,7 км ниже выхода коллекторно-дренажных вод с полей фильтрации сахарного и спирт. комбинатов	не нормируется (>5 класса)	взвешенные вещества – 59,0 мг/дм 3 . Фактическая концентрация взвешенных веществ превышает фоновый класс.
река Асса	температура воды находилась в пределах от 2,0 до 7,5 $^{\circ}\text{C}$, водородный показатель равен 7,95–8,20, концентрация растворенного в воде кислорода 10,6–12,3 мг/дм 3 , БПК ₅ 1,26-2,0 мг/дм 3 , прозрачность 13-14 см во всех створах.	
створ ж/д ст. Маймак	не нормируется (>5 класса)	взвешенные вещества – 61,0 мг/дм 3 . Фактическая концентрация взвешенных веществ превышает фоновый класс.
створ р. Асса, 500м ниже с. Аса	4 класс	магний – 32,7 мг/дм 3 , фенолы – 0,002 мг/дм 3 .

река Шу	температура воды находилась в пределах от 3,6 до 8,4 ⁰ C, водородный показатель равен 7,60 – 7,90, концентрация растворенного в воде кислорода 9,20 – 14,0, БПК ₅ 2,16 – 2,86 мг/дм ³ , прозрачность 5-12 см во всех створах.		
створ с. Кайнар (с.Благовещенское)	не нормируется (>3 класса)	фенолы – 0,002 мг/дм ³ . Фактическая концентрация фенола не превышает фоновый класс.	
створ р. Шу, 0,5 км. ниже с. Д. Конаева	3 класс	аммоний ионы – 0,56 мг/дм ³ , магний – 24,3 мг/дм ³ .	
река Аксу	температура воды 2,6 ⁰ C, водородный показатель равен 8,20, концентрация растворенного в воде кислорода 12,7 мг/дм ³ , БПК ₅ – 2,86 мг/дм ³ , прозрачность 6 см.		
створ 0,5 км выше а. Аксу, 10 км от устья р. Аксу	4 класс	магний – 42,6 мг/дм ³ . Фактическая концентрация магния не превышает фоновый класс.	
река Карабалта	температура воды 5,0 ⁰ C, водородный показатель равен 8,15, концентрация растворенного в воде кислорода 14,0 мг/дм ³ , БПК ₅ – 2,88 мг/дм ³ , прозрачность 7 см.		
река Карабалта створ на границе с Кыргызстаном, с.Баласагун 29 км от устья реки	4 класс	магний – 58,8 мг/дм ³ , фенолы – 0,002 мг/дм ³ . Фактические концентрации магния и фенолов не превышают фоновый класс.	
река Токташ	температура воды 3,8 ⁰ C, водородный показатель равен 8,10, концентрация растворенного в воде кислорода – 11,0 мг/дм ³ , БПК ₅ – 2,80 мг/дм ³ , прозрачность 10 см.		
створ на границе с Кыргызстаном, с. Жаугаш Батыр, 78 км от устья реки окраины с. Жаугаш Батыра	4 класс	магний – 60,8 мг/дм ³ . Фактическая концентрация магния превышает фоновый класс.	
река Сарыкау	температура воды 2,8 ⁰ C, водородный показатель равен 8,20, концентрация растворенного в воде кислорода 12,6 мг/дм ³ , БПК ₅ – 1,90 мг/дм ³ , прозрачность 4 см.		
створ на границе с Кыргызстаном, 35км до впадения в р. Шу, 63 км от с.Мерке	4 класс	магний – 41,2 мг/дм ³ , фенолы – 0,002 мг/дм ³ . Фактические концентрации магния и фенолов не превышают фоновый класс.	

Справочный раздел

Предельно-допустимые концентрации (ПДК) загрязняющих веществ в воздухе населенных мест

Наименование примесей	Значения ПДК, мг/м³		Класс опасности
	максимально разовая	средне-суточная	
Азота диоксид	0,2	0,04	2
Азота оксид	0,4	0,06	3
Аммиак	0,2	0,04	4
Бенз/а/пирен	-	0,1 мкг/100 м ³	1
Бензол	0,3	0,1	2

Бериллий	0,09	0,00001	1
Взвешенные вещества (частицы)	0,5	0,15	3
Взвешенные частицы РМ 10	0,3	0,06	
Взвешенные частицы РМ 2,5	0,16	0,035	
Хлористый водород	0,2	0,1	2
Кадмий	-	0,0003	1
Кобальт	-	0,001	2
Марганец	0,01	0,001	2
Медь	-	0,002	2
Мышьяк	-	0,0003	2
Озон	0,16	0,03	1
Свинец	0,001	0,0003	1
Диоксид серы	0,5	0,05	3
Серная кислота	0,3	0,1	2
Сероводород	0,008	-	2
Оксид углерода	5,0	3	4
Фенол	0,01	0,003	2
Формальдегид	0,05	0,01	2
Фтористый водород	0,02	0,005	2
Хлор	0,1	0,03	2
Хром (VI)	-	0,0015	1
Цинк	-	0,05	3

«Гигиенический норматив к атмосферному воздуху в городских и сельских населенных пунктах» (СанПин №168 от 28 февраля 2015 года)

Оценка степени индекса загрязнения атмосферы

Градации	Загрязнение атмосферного воздуха	Показатели	Оценка за месяц
I	Низкое	СИ НП, %	0-1 0
II	Повышенное	СИ НП, %	2-4 1-19
III	Высокое	СИ НП, %	5-10 20-49
IV	Очень высокое	СИ НП, %	>10 >50

РД 52.04.667–2005, Документы состояния загрязнения атмосферы в городах для информирования государственных органов, общественности и населения. Общие требования к разработке, посторонению, изложению и содержанию

Дифференциация классов водопользования по категориям (видам) водопользования

Категория (вид) водопользования	Назначение/тип очистки	Классы водопользования				
		1 класс	2 класс	3 класс	4 класс	5 класс
Рыбохозяйственное водопользование	Лососевые	+	+	-	-	-
	Карповые	+	+	-	-	-
Хозяйственно-питьевое	Простая	+	+	-	-	-

водопользование	водоподготовка					
	Обычная водоподготовка	+	+	+	-	-
	Интенсивная водоподготовка	+	+	+	+	-
Рекреационное водопользование (культурно-бытовое)		+	+	+	-	-
Орошение	Без подготовки	+	+	+	+	-
	Отстаивание в картах	+	+	+	+	+
Промышленность:						
технологические цели, процессы охлаждения		+	+	+	+	-
гидроэнергетика		+	+	+	+	+
добыча полезных ископаемых		+	+	+	+	+
транспорт		+	+	+	+	+

Единая система классификации качества воды в водных объектах (Приказ КВР МСХ №151 от 09.11.2016)

Норматив радиационной безопасности

Нормируемые величины	Пределы доз	
	Население	1 м ³ в в год в среднем за любые последовательные 5 лет, но не более 5 м ³ в в год
Эффективная доза		

*«Санитарно-эпидемиологические требования к обеспечению радиационной безопасности»

Предельно-допустимые концентрации (далее - ПДК) химических веществ в почве

Наименование вещества	Предельно-допустимая концентрация (далее-ПДК) мг/кг в почве
Свинец (валовая форма)	32,0
Хром (подвижная форма)	6,0

* Гигиенические нормативы к безопасности среды обитания Утверждены приказом Министра здравоохранения Республики Казахстан от 21 апреля 2021 года № КР ДСМ -32

**ФИЛИАЛ РГП «КАЗГИДРОМЕТ»
ПО ЖАМБЫЛСКОЙ ОБЛАСТИ**

**АДРЕС:
ГОРОД ТАРАЗ
УЛ. ЧИМКЕНТСКАЯ 22
ТЕЛ. 8-(7262)-31-60-81
8-(7262)-56-80-51
E MAIL: info_zmb@meteo.kz**