

**Информационный бюллетень о состоянии  
окружающей среды по г.Шымкент и Туркестанской  
области за октябрь месяц 2022 год**



Министерство Экологии, геологии и природных ресурсов  
Республики Казахстан  
РГП "Казгидромет"  
Филиал по Туркестанской области  
г. Шымкент, ул. Жылкышева, 44  
[lmzps\\_uko@meteo.kz](mailto:lmzps_uko@meteo.kz)

	<b>СОДЕРЖАНИЕ</b>	<b>Стр.</b>
<b>1</b>	<b>Предисловие</b>	3
<b>2</b>	Основные источники загрязнения атмосферного воздуха	4
<b>3</b>	Состояние качества атмосферного воздуха	4
<b>4</b>	Мониторинг качества поверхностных вод на территории Туркестанской области	12
<b>5</b>	Результаты мониторинга качества поверхностных вод по гидрохимическим показателям на территории Туркестанской области	12
<b>6</b>	Результаты мониторинга донных отложений водных объектов на территории Туркестанской области	13
<b>7</b>	Состояние загрязнения почв тяжелыми металлами	13
<b>8</b>	Радиационная обстановка	15
<b>9</b>	<b>Приложение 1</b>	15
<b>10</b>	<b>Приложение 2</b>	19
<b>11</b>	<b>Приложение 3</b>	20
<b>12</b>	<b>Приложение 4</b>	21
<b>13</b>	<b>Приложение 5</b>	22

## **Предисловие**

Информационный бюллетень подготовлен по результатам работ, выполняемых специализированными подразделениями РГП «Казгидромет» по ведению мониторинга за состоянием окружающей среды на наблюдательной сети национальной гидрометеорологической службы.

Бюллетень предназначен для информирования государственных органов, общественности и населения о состоянии окружающей среды на территории Туркестанской области, и необходим для дальнейшей оценки эффективности мероприятий в области охраны окружающей среды РК с учетом тенденции происходящих изменений уровня загрязнения.

## **Оценка качества атмосферного воздуха Туркестанской области. Основные источники загрязнения атмосферного воздуха.**

Согласно статистическим данным по городу Шымкент количество стационарных источников выбросов загрязняющих веществ составляет - 5166 единиц, за 2019 год объем фактических выбросов составил 29793,5 тонн /год, при разрешенном объеме 59420,8 тонн/год.

В г. Шымкент насчитывается 14716 домов, не обеспеченных природным газом. В городе Туркестан насчитывается 72123 индивидуальных домов, в городе Кентау - 68669 индивидуальных домов.

По состоянию на ноябрь 2020 года в городе Шымкент имеются 251510 единиц автотранспортных средств. Из них: легковые автомобили 206292 единиц и составляют 90,4 % от общего количества АТС, автобусы 5623 единиц, составляют 2,5 %, грузовые автомобили 16087 единиц составляют 7,0 % и специальная техника 304 единиц, составляет 0,1 %.

Объем выбросов вредных загрязняющих веществ от автомобильного транспорта по городу Шымкент за 2019 год составил - 40409,1 тонн.

Расчетное валовое количество выбросов вредных загрязняющих веществ от автомобильного транспорта по городу Шымкент на 2020 год (годовое расчетное количество выбросов) составит 46778,9 тонн.

Основное количество вредных выбросов приходится на долю легковых автомобилей - 73,2 % от общего количества. Грузовыми автомобилями выделяются 17,5 % и автобусами 8,9% выбросов.

### **1. Мониторинг качества атмосферного воздуха г. Шымкент.**

Наблюдения за состоянием атмосферного воздуха г. Шымкент проводятся на 6 постах наблюдения, в том числе на 4 постах ручного отбора проб и на 2 автоматических станциях (Приложение 1).

В целом по городу определяется до 17 показателей 1) *взвешенные частицы(пыль);* 2) *взвешенные частицы PM 2,5;* 3)*взвешенные частицы PM 10;* 4) *диоксид серы;* 5) *оксид углерода;* 6)*диоксид азота;* 7) *аммиак;* 8) *сероводород;* 9) *формальдегид;* 10) *оксид азота;* 11) *оzone;* 12) *бенз(a)пирен,*13) *кадмий;* 14) *медь;* 15) *мышияк;* 16) *свинец;* 17)*хром.*

В таблице 1 представлена информация о местах расположения постов наблюдений и перечне определяемых показателей на каждом посту.

Наблюдения за состоянием атмосферного воздуха велись на 6 стационарных постах (таблица 1).

Таблица 1

Место расположения постов наблюдений и определяемые примеси

№ поста	Сроки отбора	Проведение наблюдений	Адреса постов	Определяемые примеси
1			пр. Абая, АО «Южполиметалл»	взвешенные частицы (пыль), диоксид серы, оксид углерода, диоксид азота, оксид азота, аммиак, сероводород, формальдегид, бенз(а)пирен Тяжелые металлы: кадмий, медь, мышьяк, свинец, хром
2	3 раза в сутки	ручной отбор проб (дискретные методы)	площадь Ордабасы, пересечение ул. Казыбек би и Толе би	взвешенные частицы (пыль), диоксид серы, оксид углерода, диоксид азота, оксид азота, аммиак, сероводород, формальдегид, бенз(а)пирен Тяжелые металлы: кадмий, медь, мышьяк, свинец, хром
3			ул. Алдиярова, б/н, АО «Шымкентцемент»	взвешенные частицы (пыль), диоксид серы, оксид углерода, диоксид азота, оксид азота, аммиак, сероводород, формальдегид, бенз(а)пирен Тяжелые металлы: кадмий, медь, мышьяк, свинец, хром
8			ул. Сайрамская, 198, ЗАО «Пивзавод»	взвешенные частицы (пыль), диоксид серы, оксид углерода, диоксид азота, оксид азота, аммиак, сероводород, формальдегид, бенз(а)пирен Тяжелые металлы: кадмий, медь, мышьяк, свинец, хром
5	каждые 20 минут	в непрерывном режиме	микрорайон Самал-3	взвешенные частицы PM 2,5 взвешенные частицы PM 10 аммиак, диоксид азота, оксид азота, оксид углерода, диоксид серы, сероводород, озон (приземный)
6			микрорайон Нурсат	взвешенные частицы PM 2,5 взвешенные частицы PM 10 аммиак, диоксид азота, оксид азота, оксид углерода, диоксид серы, сероводород, озон (приземный)

## Результаты мониторинга качества атмосферного воздуха г. Шымкент за октябрь 2022 года.

Уровень загрязнения атмосферного воздуха города Шымкент оценивался как **повышенный**, он определялся значением **СИ=1,6** (низкий уровень) и **НП=1,3%** (повышенный уровень) по оксиду углерода в районе поста №1 пр. Абая, АО «Южполиметалл».

Средние концентрации формальдегида –2,45 ПДКс.с., диоксида азота – 1,32 ПДКс.с., взвешенных веществ -1,46 ПДКс.с., содержание других загрязняющих веществ не превышали ПДК.

Максимально-разовые концентрации сероводорода –1,32 ПДКм.р., оксид углерода- 1,60 ПДКм.р., содержание других загрязняющих веществ не превышали ПДК (таблица 2).

**Случаи экстремально высокого и высокого загрязнения (ВЗ и ЭВЗ):** ВЗ (более 10 ПДК) и ЭВЗ (более 50 ПДК) не были отмечены.

Концентрации загрязняющих веществ, а также кратность превышений нормативов качества и количество случаев превышения указаны в Таблице 2.


Таблица 2

### Характеристика загрязнения атмосферного воздуха

Примесь	Средняя концентрация		Максимальная разовая концентрация		НП	Число случаев превышения ПДК <sub>м.р.</sub>		
	мг/м <sup>3</sup>	Кратность ПДК <sub>с.с.</sub>	мг/м <sup>3</sup>	Кратность ПДК <sub>м.р.</sub>		%	>ПДК	>5 ПДК
<b>г. Шымкент</b>								
взвешенные частицы (пыль)	0,22	1,46	0,30	0,60				
взвешенные частицы PM-2,5	0,012	0,35	0,053	0,33				
взвешенные частицы PM-10	0,016	0,27	0,11	0,36				
диоксид серы	0,009	0,17	0,06	0,12				
диоксид азота	0,053	1,325	0,10	0,50				
оксид азота	0,02	0,33	0,05	0,12				
оксид углерода	1,717	0,57	8,0	1,60	1,3	2		
аммиак	0,013	0,32	0,04	0,20				
формальдегид	0,024	2,446	0,030	0,60				
сероводород	0,015		0,011	1,32	0,4	9		
озон (приземный)	0,0	0	0	0				
Бенз(а)пирен	0,0002	0,1						
кадмий	0,000017	0,056	0,000020					
медь	0,000022	0,011	0,000028					
мышьяк	0,000008	0,003	0,000012					
свинец	0,000022	0,074	0,000025					
хром	0,000001	0,001	0,000002					

## **Выводы:**

За последние пять лет уровень загрязнения атмосферного воздуха в октябре изменялся следующим образом:



Как видно из графика, в октябре месяце за период с 2018 по 2022 годы уровень загрязнения атмосферного воздуха г. Шымкент оценивался как повышенный.

Увеличение показателя наибольшей повторяемости отмечено в основном за счет оксида углерода.

## **Метеорологические условия**

Влияние погодных условий на формирование загрязнения воздуха в августе не отмечено, дней с НМУ (неблагоприятных условий) не зафиксировано.

## **Результаты мониторинга качества атмосферного воздуха жилого массива Кызылсай за октябрь 2022 года.**

В целом определяется 7 показателей: 1) взвешенные частицы PM 2,5; 2) взвешенные частицы PM 10; 3) диоксид серы; 4) оксид углерода; 5) диоксид азота; 6) озон; 7) оксид азота.

В таблице 3 представлена информация о месте расположения поста наблюдений и перечне определяемых показателей на посту.

*Таблица 3*

Место расположения постов наблюдений и определяемые примеси

Номер поста	Сроки отбора	Проведение наблюдений	Адрес поста	Определяемые примеси
1	каждые 20 минут	в непрерывном режиме	п.Кызылсай, ул Омарташы, 1	взвешенные частицы РМ 2,5, взвешенные частицы РМ 10 диоксид серы, оксид углерода, диоксид азота, оксид азота, озон.

Уровень загрязнения атмосферного воздуха жилого массива Кызылсай оценивался как **низкий**, он определялся значением **СИ=1,3** (низкий уровень) и **НП =0,5%** (низкий уровень).

Средние концентрации диоксида азота – 1,62 ПДКс.с., озону -1,47 ПДКс.с, содержание других загрязняющих веществ -не превышали ПДК.

Максимально-разовые концентрации диоксида азота – 1,2 ПДКм.р., взвешенных частицы PM-2,5-1,1 ПДКм.р., взвешенных частицы PM-10 -1,3 ПДКм.р., содержание других загрязняющих веществ не превышали ПДК (таблица 4).

**Случаи экстремально высокого и высокого загрязнения (ВЗ и ЭВЗ):** ВЗ (более 10 ПДК) и ЭВЗ (более 50 ПДК) не были отмечены.

Фактические значения, а также кратность превышений нормативов качества и количество случаев превышения указаны в Таблице 4.

*Таблица 4*

#### **Характеристика загрязнения атмосферного воздуха**

Примесь	Средняя концентрация		Максимальная разовая концентрация		НП	Число случаев превышения ПДКм.р.		
	мг/м <sup>3</sup>	Кратность ПДКс.с.	мг/м <sup>3</sup>	Кратность ПДКм.р.		%	>ПДК	>5 ПДК
<b>Кызылсай</b>								
взвешен. частицы PM-2,5	0,009	0,26	0,178	1,11	0,05	1	0	0
взвешенные частицы PM-10	0,027	0,45	0,384	1,28	024	5	0	0
диоксид серы	0,004	0,09	0,013	0,03	0	0	0	0
диоксид азота	0,065	1,62	0,238	1,19	0,48	10	0	0
оксид азота	0	0	0	0	0	0	0	0
оксид углерода	0,347	0,12	1,674	0,33	0	0	0	0
оzone	0,044	1,47	0,062	0,39	0	0	0	0

### **1.1 Мониторинг качества атмосферного воздуха в г. Туркестан**

Наблюдения за состоянием атмосферного воздуха на территории г. Туркестан проводятся на 3 автоматических станциях (Приложение 1).

В целом по городу определяется до 9 показателей: 1) взвешенные частицы (пыль); 2) взвешенные частицы PM-2,5; 3) взвешенные частицы PM-10; 4) диоксид серы; 5) оксид углерода; 6) диоксид азота; 7) оксид азота, 8) озон; 9) сероводород.

В таблице 5 представлена информация о месте расположения поста наблюдений и перечне определяемых показателей на посту.

Таблица 5

Место расположения постов наблюдений и определяемые примеси

Номер поста	Сроки отбора	Проведение наблюдений	Адрес поста	Определяемые примеси
1	каждые 20 минут	в непрерывном режиме	ул. Алаша Байтак жырау, район Оралман	взвешенные частицы, диоксид серы, оксид углерода, диоксид и оксид азота, озон, сероводород
2			в центре города	взвешенные частицы РМ-2,5, взвешенные частицы РМ-10, диоксид азота, диоксид серы, оксид азота, оксид углерода, озон
3			ул. А. Сандыбая, 58В	взвешенные частицы РМ-2,5, взвешенные частицы РМ-10, диоксид азота, диоксид серы, оксид азота, оксид углерода, озон

### Результаты мониторинга качества атмосферного воздуха в г. Туркестан за октябрь 2022 год

По данным стационарной сети наблюдений г. Туркестан, уровень загрязнения атмосферного воздуха оценивался **повышенным**, он определялся значением **СИ= 2,7** (повышенный уровень) и **НП = 1,3 %** (повышенный уровень) по взвешенным частицам РМ 10 в районе поста №3 (в центре города ул. Н.Назарбаева 1) (рис. 1, 2).

Средние концентрации озона- 1,34 ПДКс.с, диоксида азота – 1,17 ПДКс.с содержание других загрязняющих веществ не превышали ПДК.

Максимальная разовая концентрация сероводорода – 1,87 ПДКм.р., взвешенных частиц РМ 2,5 – 1,48 ПДКм.р., взвешенных частиц РМ 10 - 2,73 ПДКм.р., диоксида азота- 1,41 ПДКм.р., оксид углерода - 1,33 ПДКм.р. содержание других загрязняющих веществ не превышали ПДК (таблица 6).

**Случаи экстремально высокого и высокого загрязнения (ВЗ и ЭВЗ):** ВЗ (более 10 ПДК) и ЭВЗ (более 50 ПДК) не были отмечены.

Фактические значения, а также кратность превышений нормативов качества и количество случаев превышения указаны в Таблице 6.

Таблица 6


### Характеристика загрязнения атмосферного воздуха

Примесь	Средняя концентрация		Максимальная разовая концентрация		НП	Число случаев превышения ПДКм.р.		
	мг/м <sup>3</sup>	Кратность ПДКс.с.	мг/м <sup>3</sup>	Кратность ПДКм.р.		%	>ПДК	>5 ПДК
<b>г.Туркестан</b>								
взвешенные частицы (пыль)	0	0	0	0	0	0		
взвешен. частицы РМ-2,5	0,0073	0,12	0,238	1,484	0,09	4		
взвешенные частицы РМ-10	0,0202	0,58	0,819	2,731	0,6	29		

диоксид серы	0,0052	0,10	0,116	0,231	0	0		
оксид углерода	0,5347	0,18	6,660	1,332	0,12	8		
диоксид азота	0,0469	1,17	0,282	1,408	0,43	23		
оксид азота	0,0008	0,01	0,005	0,0113	0	0		
оzone	0,0401	1,34	0,117	0,728	0	0		
сероводород	0,0008		0,015	1,875	0,10	2		

### Выводы:

За последние пять лет уровень загрязнения атмосферного воздуха в октябре изменялся следующим образом:



Как видно из графика, в октябре месяце за период с 2018 по 2022 годы уровень загрязнения атмосферного воздуха г. Туркестан оценивался как повышенный.

Увеличение показателя наибольшей повторяемости отмечено в основном за счет взвешенных частиц.

## 2.2 Мониторинг качества атмосферного воздуха в г. Кентау

Наблюдения за состоянием атмосферного воздуха на территории г. Кентау проводятся на 1 автоматической станции (Приложение 1).

В целом по городу определяется до 6 показателей: 1) *взвешенные частицы PM-10*; 2) *диоксид серы*; 3) *оксид углерода*; 4) *диоксид азота*; 5) *оксид азота*, 6) *сероводород*.

В таблице 5 представлена информация о месте расположения поста наблюдений и перечне определяемых показателей на посту.

Таблица 5

Номер поста	Сроки отбора	Проведение наблюдений	Адрес поста	Определяемые примеси
7	каждые 20 минут	в непрерывном режиме	ул. Валиханова, уч. 3 «А»	Взвешенные частицы РМ10, сероводород, оксид углерода, диоксид и оксид азота, диоксид серы

## **Результаты мониторинга качества атмосферного воздуха в г. Кентау за октябрь 2022 года.**

По данным сети наблюдений города Кентау, уровень загрязнения атмосферного воздуха оценивался **низким**, он определялся значениями СИ=0,9 (низкий уровень) и НП = 0% (низкий уровень).

Средние и максимальные разовые концентрации загрязняющих веществ не превышали ПДК (табл.6).

**Случаи экстремально высокого и высокого загрязнения (ВЗ и ЭВЗ):** ВЗ (более 10 ПДК) и ЭВЗ (более 50 ПДК) не были отмечены.


Концентрации загрязняющих веществ, а также кратность превышений нормативов качества и количество случаев превышения указаны в Таблице 6

*Таблица 6*

Примесь	Средняя концентрация		Максимальная разовая концентрация		НП %	Число случаев превышения ПДК <sub>м.р.</sub>		
	мг/м <sup>3</sup>	Кратность ПДК <sub>с.с.</sub>	мг/м <sup>3</sup>	Кратность ПДК <sub>м.р.</sub>		>ПДК	>5 ПДК	>10 ПДК
<b>г. Кентау</b>								
взвешенные частицы РМ 10	0	0	0	0				
диоксид серы	0,003	0,06	0,009	0,02				
оксид углерода	0,344	0,11	4,40	0,88				
диоксид азота	0,020	0,50	0,04	0,20				
оксид азота	0,004	0,07	0,008	0,02				
сероводород	0,002		0,007	0,82				

### **Выводы:**

За последние пять лет уровень загрязнения атмосферного воздуха в октябре изменялся следующим образом:



Как видно из графика, в октябре месяце за период с 2018 по 2022 годы уровень загрязнения атмосферного воздуха г. Кентау оценивался как низким, за исключением 2018 г., где уровень - повышенный.

Увеличение показателя наибольшей повторяемости отмечено в основном за счет оксида углерода.

### **3. Мониторинг качества поверхностных вод на территории Туркестанской области**

Мониторинг за состоянием качества поверхностных вод проводились на 7 водных объектах, реки: Сырдария, Келес, Бадам, Арыс, Аксу, Катта-Бугунь, водохранилище Шардара, на 12 створах.

При изучении поверхностных вод в отбираемых пробах воды определяются 40 физико-химических показателей качества (*температура воды, растворенный кислород, водородный показатель, взвешенные вещества, прозрачность, БПК<sub>5</sub> и ХПК, главные ионы, биогенные (аммоний-, нитрит-, нитрат-ионы, фосфаты и общий фосфор) и органические вещества (нефтепродукты, СПАВ, фенолы), тяжелые металлы (медь, цинк, свинец, кадмий, хром, никель, ртуть), пестициды (ДДТ, ДДЕ, альфа и гамма ГХЦГ)*).

Мониторинг **качества донных отложений** проводились по 3-м контрольным точкам реки Сырдария и водохранилище Шардара.

В пробе донных отложений проведен анализ тяжелых металлов (свинец, кадмий, марганец, медь, цинк, никель, хром) и органических веществ (нефтепродукты).

### **4. Результаты мониторинга качества поверхностных вод по гидрохимическим показателям на территории Туркестанской области**

Основным нормативным документом для оценки качества воды водных объектов Республики Казахстан является «Единая система классификации качества воды в водных объектах» (далее – Единая Классификация).

По Единой классификации качество воды оценивается следующим образом:

Таблица 3

Наименование водного объекта	Класс качества воды		Параметры	Ед. изм.	Концентрация
	Октябрь 2021 г.	Октябрь 2022 г.			
Река Сырдария	Не нормируется (>5 класс)	4 класс	Магний	мг/дм <sup>3</sup>	35,6
			Сульфаты	мг/дм <sup>3</sup>	566,7
			Фенолы*	мг/дм <sup>3</sup>	0,0026
Река Келес	4 класс	Не нормируется (>5 класс)	Взвешенные вещества	мг/дм <sup>3</sup>	617,2
Река Бадам	3 класс	3 класс	Сульфаты	мг/дм <sup>3</sup>	292,95
Река Арыс	4 класс	3 класс	Сульфаты	мг/дм <sup>3</sup>	297,8
Река Аксу	1 класс*	1 класс*			

Река Катта-бугунь	Не нормируется (>5 класс)	1 класс*			
Водохранилище Шардара	Не нормируется (>5 класс)	Не нормируется (>5 класс)	Взвешенные вещества	мг/дм <sup>3</sup>	33,06

Примечание: \* - вода «наилучшего класса»

\*\*\* - Вещества по данному классу не нормируются

Как видно из таблицы 3, сравнение с октябрем 2021 года, качество поверхностных вод рек Сырдарии перешло с выше 5 класса в 4 класс, Арыс перешло с 4 класса в 3 класс, Катта-бугунь перешло с выше 5 класса в 1 класс – улучшилось.

Качество поверхностных вод реки Келес перешло с 4 класса в выше 5 класс - ухудшилось.

Качество поверхностных вод рек Бадам, Аксу и водохранилище Шардара существенно не изменилось.

Основными загрязняющими веществами в водных объектах Туркестанской области являются фенолы, магний, сульфаты и взвешенные вещества. Превышения нормативов качества по данным показателям в основном характерны для бытовых, индустриальных и сельскохозяйственных сбросов.

За октябрь 2022 года случаи высокого и экстремально-высокого загрязнения поверхностных вод на территории Туркестанской области не выявлены.

Информация по качеству водных объектов в разрезе створов указана в Приложении 2.

## **5. Результаты мониторинга донных отложений водных объектов на территории Туркестанской области**

По результатам исследования донных отложений в бассейне реки Сырдария содержание тяжелых металлов изменилось в следующих пределах: медь – 0,72-0,86 мг/кг, цинк – 1,99-2,20 мг/кг, никель – 0,81-0,84 мг/кг, марганец – 1,22-1,32 мг/кг, хром – 0,03-0,04 мг/кг, концентрации свинца и кадмий не обнаружено. Содержание нефтепродуктов составило – 1,8-2,3 %.

Результаты исследования донных отложений воды бассейна реки Сырдария представлена в Приложении 3.

## **6.Состояние загрязнения почв тяжёлыми металлами Туркестанской области**

*За осенний период* в пробах почвы, отобранных в различных районах города Шымкент, концентрации свинца находились в пределах 20,0 –186,4

мг/кг, меди 0,66 – 7,8 мг/кг, цинка 0,48 – 29,4 мг/кг, хрома 0,39 – 0,44 мг/кг, кадмия 0,21 – 12,8 мг/кг.

По содержанию тяжелых металлов район ЗАО «Южполиметалл» (расстояние от источника загрязнения 0,5 и 0,9 км) наиболее загрязненный, где концентрация свинца – 5,14 – 5,82 ПДК, меди – 1,97 – 2,6 ПДК, цинка – 1,09– 1,28 ПДК.

В районе центрального парка, школы № 9 и площади Ордабасы концентрации тяжелых металлов находились в пределах нормы.

**За осенний период** в пробах почвы, отобранных в различных районах **города Туркестан**, концентрации свинца находились в пределах 10,1 – 35,7 мг/кг, меди 0,45 – 0,67 мг/кг, цинка 0,46 – 13,6 мг/кг, хрома 0,15 – 0,42 мг/кг, кадмия 0,19 – 0,42 мг/кг.

В районе Казметалпродакшн концентрации свинца составляла 1,12 ПДК. Остальные концентрации тяжелых металлов находились в пределах нормы.

**За осенний период** в пробах почвы, отобранных в различных районах **города Кентау**, концентрации свинца находились в пределах 20,6 – 110,5 мг/кг, меди 0,87 – 2,92 мг/кг, цинка 7,62 – 24,1 мг/кг, хрома 0,38 – 0,94 мг/кг, кадмия 0,44 – 6,02 мг/кг.

В районе ЗАО «Южполиметалл» (500м) в пробах почвы было обнаружено превышение по свинцу 1,82 ПДК, по цинку – 1,05 ПДК.

В районе обогатительной фабрики "Южполиметалл" 1,5 км – концентрации свинца - 3,45 ПДК, по цинку – 1,04 ПДК.

Остальные концентрации тяжелых металлов находились в пределах нормы.

**За осенний период** в пробах почвы, отобранных в различных точках **Сарыагашского района** Туркестанской области, концентрации свинца находились в пределах 0,34– 9,36 мг/кг, меди 0,57 – 1,37 мг/кг, цинка 1,46 – 5,28 мг/кг, хрома 0,21 -0,32 мг/кг, кадмия 0,17 – 0,31 мг/кг.

Содержание тяжелых металлов находились в пределах нормы.

**В Мактааральском районе** Туркестанской области, концентрации свинца находились в пределах 7,21– 16,6 мг/кг, меди 0,50 – 1,45 мг/кг, цинка 0,67 – 1,92 мг/кг, хрома 0,16-0,42 мг/кг, кадмия 0,16 – 1,08 мг/кг.

Содержание тяжелых металлов находились в пределах нормы.

**В Ордабасинском районе** Туркестанской области, концентрации свинца находились в пределах 10,8– 25,2 мг/кг, меди 0,84 – 1,26 мг/кг, цинка 1,69 – 14,3 мг/кг, хрома 0,27 – 0,36 мг/кг, кадмия 0,36-4,36 мг/кг.

Содержание тяжелых металлов находились в пределах нормы.

**В Байдибекском районе** Туркестанской области, концентрации свинца находились в пределах 8,63– 13,4 мг/кг, меди 0,34 – 0,98 мг/кг, цинка 1,01 – 1,99 мг/кг, хрома 0,26-0,36 мг/кг, кадмия 0,23-0,29 мг/кг.

Содержание тяжелых металлов находились в пределах нормы.

## 7. Радиационная обстановка

Наблюдения за уровнем гамма излучения на местности осуществлялись ежедневно на 2-х метеорологических станциях (Шымкент, Туркестан) и на 1-ом автоматическом посту наблюдений за загрязнением атмосферного воздуха г.Туркестан (ПНЗ №1) (рис. 14.4).

Средние значения радиационного гамма-фона приземного слоя атмосферы по населенным пунктам области находились в пределах 0,02-0,28 мкЗв/ч. В среднем по области радиационный гамма-фон составил 0,13 мкЗв/ч и находился в допустимых пределах.

Наблюдения за радиоактивным загрязнением приземного слоя атмосферы на территории Туркестанской области осуществлялся на 2-х метеорологических станциях (Шымкент, Туркестан) путем отбора проб воздуха горизонтальными планшетами (рис. 14.4). На станции проводился пятисуточный отбор проб.

Среднесуточная плотность радиоактивных выпадений в приземном слое атмосферы на территории области составила 1,5-2,0 Бк/м<sup>2</sup>.

Средняя величина плотности выпадений по области составила 1,7 Бк/м<sup>2</sup>, что не превышает предельно-допустимый уровень.

## Приложение 1



Рис 1 Схема расположения стационарной сети наблюдения за загрязнением атмосферного воздуха г.Шымкент




Рис 2 Схема расположения экспедиционных наблюдений за загрязнением атмосферного воздуха г. Шымкент.




Рис 3 Схема расположения стационарной сети наблюдения за загрязнением атмосферного воздуха поселка Кызылсай




Рис 4. Схема расположения стационарной сети наблюдения за загрязнением атмосферного воздуха города Туркестан.




Рис 5. Схема расположения стационарной сети наблюдения за загрязнением атмосферного воздуха города Кентай.



Рис 6. Схема расположения стационарной сети наблюдения за загрязнением атмосферного воздуха поселка Састобе.




Рис.4 – Схема расположения створов Туркестанской области

## Приложение 2

### Информация о качестве поверхностных вод Туркестанской области по створам

<b>Водный объект и створ</b>	<b>Характеристика физико-химических параметров</b>	
<b>река Сырдария</b>		температура воды отмечена в пределах 14,3-20,0°C, водородный показатель 7,5-8,1, концентрация растворенного в воде кислорода – 7,5-9,07 мг/дм <sup>3</sup> , БПК <sub>5</sub> – 0,9-2,6 мг/дм <sup>3</sup> , прозрачность – 20,0-25,0 см.
створ – с. Кокбулак (10,5 км к ССЗ от поста)	4 класс	магний - 37,2 мг/дм <sup>3</sup> , сульфаты-595,5 мг/дм <sup>3</sup> , фенолы* - 0,0038 мг/дм <sup>3</sup> . Фактическая концентрация сульфатов превышает фоновый класс. Фактическая концентрация магния не превышает фоновый класс. Фактическая концентрация фенолов превышает фоновый класс.
створ - с.Азаттык (мост через реку Сырдария- 5 км от села)	4 класс	магний – 36,0 мг/дм <sup>3</sup> , сульфаты-585,9 мг/дм <sup>3</sup> , фенолы* - 0,0031 мг/дм <sup>3</sup> .
створ – г. Шардара (2,7 км к З от города, 2 км ниже плотины вдхр. Шардара)	5 класс	взвешенные вещества – 21,2 мг/дм <sup>3</sup> . Фактическая концентрация взвешенных веществ превышает фоновый класс.
<b>река Келес</b>		температура воды отмечена в пределах 7,2-16,4°C, водородный показатель 7,7-7,9, концентрация растворенного в воде кислорода – 7,1-8,1 мг/дм <sup>3</sup> , БПК <sub>5</sub> – 1,0-2,5 мг/дм <sup>3</sup> , прозрачность – 18,0-20,0 см.
створ – с. Казыгурт, 0,2 км выше села, 0,8 км выше водопоста	не нормируется (>5 класс)	взвешенные вещества – 591,2 мг/дм <sup>3</sup> . Фактическая концентрация взвешенных веществ превышает фоновый класс.
створ - устье (1,2 км выше устья р. Келес	не нормируется (>5 класс)	взвешенные вещества – 643,2 мг/дм <sup>3</sup> . Фактическая концентрация взвешенных веществ превышает фоновый класс.
<b>река Бадам</b>		температура воды отмечена в пределах 12,2-13,6°C, водородный показатель 7,4-7,5, концентрация растворенного в воде кислорода – 6,5-8,4 мг/дм <sup>3</sup> , БПК <sub>5</sub> – 1,9-2,2 мг/дм <sup>3</sup> , прозрачность –24,0 см.
створ – г/п Шымкент (2 км ниже города)	3 класс	сульфаты – 307,4 мг/дм <sup>3</sup> . Фактическая концентрация сульфатов превышает фоновой класс
створ - с. Караспан, (0,5 км ниже села, 0,99 км выше устья р. Бадам, 0,1 км ниже моста)	3 класс	сульфаты – 278,5 мг/дм <sup>3</sup> . Фактическая концентрация сульфатов превышает фоновый класс.
<b>река Арыс</b>		температура воды отмечена 13,2°C, водородный показатель 7,3, концентрация растворенного в воде кислорода – 6,8 мг/дм <sup>3</sup> , БПК <sub>5</sub> – 0,6 мг/дм <sup>3</sup> , прозрачность – 25,0 см.

створ г. Арыс (ж.д. ст.Арыс)	3 класс	сульфаты – 297,8 мг/дм <sup>3</sup> . Фактическая концентрация сульфатов превышает фоновый класс.
река Аксу	температура воды отмечена в пределах 8,7-15,5°C, водородный показатель 7,4-7,9, концентрация растворенного в воде кислорода – 4,5-5,8 мг/дм <sup>3</sup> , БПК <sub>5</sub> – 1,9-2,6 мг/дм <sup>3</sup> , прозрачность – 25,0 см.	
створ - с. Саркырама (к юго-западу от населения, раст. от устья 52 км)	1 класс*	-
створ - с. Колкент (1,5-2 км к северу от села, ниже от 10 м водопоста)	1 класс*	-
река Катта-буғунь	температура воды отмечена 18,0°C, водородный показатель 7,2, концентрация растворенного в воде кислорода – 5,2 мг/дм <sup>3</sup> , БПК <sub>5</sub> – 1,3 мг/дм <sup>3</sup> , прозрачность – 25,0 см.	
створ - с. Жарыкбас (1,5 км выше села)	1 класс*	-
Водохранилище Шардара	температура воды отмечена 17,4°C, водородный показатель 7,7, концентрация растворенного в воде кислорода – 6,8 мг/дм <sup>3</sup> , БПК <sub>5</sub> – 0,9 мг/дм <sup>3</sup> , прозрачность – 25,0 см.	
вдхр. Шардара – г. Шардара (1 км к ЮВ от г. Шардара, 2 км выше плотины)	Не нормируется (>5 класс)	взвешенные вещества – 33,06 мг/дм <sup>3</sup> . Фактическая концентрация взвешенных веществ превышает фоновый класс.

Примечание: \* - вода «наилучшего класса»

\*\*\* - Вещества по данному классу не нормируются

### Приложение 3

#### Результаты исследования донных отложений воды реки Сырдария Туркестанской области за октябрь 2022 года

№ п/п	Место отбора проб	Донные отложения, мг/кг							
		Нефте продук ты %	Медь	Хром	Кад мий	Ни кель	Марга нец	Свинец	Цинк
1	створ – с. Кокбулак (10,5 км к ССЗ от поста)	2,2	0,72	0,03	0,0	0,81	1,22	0,0	1,99
2	вдхр. Шардара – г. Шардара (1 км к ЮВ от г. Шардара, 2 км выше плотины)	2,30	0,86	0,04	0,0	0,77	1,32	0,0	2,15
3	р. Сырдария, створ г. Шардара (2,7 км к З от города, 2 км ниже плотины вдхр. Шардара)	1,80	0,75	0,03	0,0	0,84	1,25	0,0	2,20

## Приложение 4

Справочный раздел  
Предельно-допустимые концентрации (ПДК) загрязняющих веществ в воздухе  
населенных мест

Наименование примесей	Значения ПДК, мг/м <sup>3</sup>		Класс опасности
	максимально разовая	средне-суточная	
Азота диоксид	0,2	0,04	2
Азота оксид	0,4	0,06	3
Аммиак	0,2	0,04	4
Бенз/а/пирен	-	0,1 мкг/100 м <sup>3</sup>	1
Взвешенные вещества (частицы)	0,5	0,15	3
Взвешенные частицы РМ 10	0,3	0,06	
Взвешенные частицы РМ 2,5	0,16	0,035	
Кадмий	-	0,0003	1
Кобальт	-	0,001	2
Марганец	0,01	0,001	2
Медь	-	0,002	2
Мышьяк	-	0,0003	2
Озон	0,16	0,03	1
Свинец	0,001	0,0003	1
Диоксид серы	0,5	0,05	3
Серная кислота	0,3	0,1	2
Сероводород	0,008	-	2
Оксид углерода	5,0	3	4
Фенол	0,01	0,003	2
Формальдегид	0,05	0,01	2
Хлор	0,1	0,03	2
Хром (VI)	-	0,0015	1
Цинк	-	0,05	3

«Гигиенический норматив к атмосферному воздуху в городских и сельских населенных пунктах» (СанПин №КР ДСМ-70 от 2 августа 2022 года)

### Оценка степени индекса загрязнения атмосферы

Градации	Загрязнение атмосферного воздуха	Показатели	Оценка за месяц
I	Низкое	СИ НП, %	0-1 0
II	Повышенное	СИ НП, %	2-4 1-19
III	Высокое	СИ НП, %	5-10 20-49
IV	Очень высокое	СИ НП, %	>10 >50

РД 52.04.667–2005, Документы состояния загрязнения атмосферы в городах для информирования государственных органов, общественности и населения. Общие требования к разработке, посторонению, изложению и содержанию

### Норматив радиационной безопасности\*

Нормируемые величины	Пределы доз
	Население
Эффективная доза	1 мЗв в год в среднем за любые последовательные 5 лет, но не более 5 мЗв в год

\*«Санитарно-эпидемиологические требования к обеспечению радиационной безопасности»

## Дифференциация классов водопользования по категориям (видам) водопользования

Категория (вид) водопользования	Назначение/тип очистки	Классы водопользования				
		1 класс	2 класс	3 класс	4 класс	5 класс
Рыбохозяйственное водопользование	Лососевые	+	+	-	-	-
	Карповые	+	+	-	-	-
Хозяйственно-питьевое водопользование	Простая водоподготовка	+	+	-	-	-
	Обычная водоподготовка	+	+	+	-	-
Рекреационное водопользование (культурно-бытовое)	Интенсивная водоподготовка	+	+	+	+	-
		+	+	+	-	-
Орошение	Без подготовки	+	+	+	+	-
	Отстаивание в картах	+	+	+	+	+
Промышленность:						
технологические цели, процессы охлаждения		+	+	+	+	-
гидроэнергетика		+	+	+	+	+
добыча полезных ископаемых		+	+	+	+	+
транспорт		+	+	+	+	+

Единая система классификации качества воды в водных объектах (Приказ КВР МСХ №151 от 09.11.2016)

## Приложение 5

### Нормативы предельно допустимых концентраций вредных веществ, вредных микроорганизмов и других биологических веществ, загрязняющих почву

№ п/п	Наименование вещества	Предельно-допустимая концентрация (далее - ПДК), миллиграмм на килограмм в почве	Лимитирующий показатель	Примечание
Химические вещества				
1	Марганец	1500	общесанитарный	
2	Медь	3,0 (подвижная форма)	общесанитарный	Подвижная форма меди извлекается ацетатно-аммонийным

				буферным раствором РН 4,8.
3	Мышьяк	2,0 (валовое содержание)	транслокационный	ПДК дана с учетом фона.
4	Никель	4,0 (подвижная форма)	общесанитарный	Подвижная форма никеля извлекается ацетатно-аммонийным буферным раствором РН 4,6.
5	Ртуть	2,1 (валовое содержание)	транслокационный	ПДК дана с учетом фона.
6	Свинец	32,0 (валовое содержание)	общесанитарный	ПДК дана с учетом фона.
7	Свинец + ртуть	20,0 + 1,0 (валовое содержание)	транслокационный	
8	Хром	6,0 (подвижная форма)	общесанитарный	ПДК дана с учетом фона. Подвижная форма хрома извлекается ацетатно-аммонийным буферным раствором РН 4,8.
9	Хром <sup>+6</sup>	0,05	общесанитарный	
10	Цинк	23,0 (подвижная форма)	транслокационный	Подвижная форма цинка извлекается ацетатно-аммонийным буферным раствором РН 4,8

**ЛАБОРАТОРИЯ МОНИТОРИНГА ЗАГРЯЗНЕНИЯ ПРИРОДНОЙ СРЕДЫ  
ФИЛИАЛА РГП «КАЗГИДРОМЕТ» ПО ТУРКЕСТАНСКОЙ ОБЛАСТИ**  
**АДРЕС:**  
**ГОРОД ШЫМКЕНТ**  
**УЛ. ЖЫЛКЫШИЕВА, 44**  
**ТЕЛ. 8-(7252)-54-05-33**

E MAIL: [LMZPS\\_UKO@METEO.KZ](mailto:LMZPS_UKO@METEO.KZ)

