

Информационный бюллетень о состоянии окружающей среды г. Атырау

Выпуск №33
ноябрь 2022 год



Министерство экологии, геологии и природных ресурсов
Республики Казахстан
Филиал РГП "Казгидромет" по Атырауской области

	СОДЕРЖАНИЕ	Стр.
	Предисловие	3
1	Основные источники загрязнения атмосферного воздуха	4
2	Состояние качества атмосферного воздуха	4
3	Состояние качества поверхностных вод	13
4	Химический состав атмосферных осадков	14
5	Радиационная обстановка	14
	Приложение 1	15
	Приложение 2	27
	Приложение 3	28
	Приложение 4	29

Предисловие

Информационный бюллетень подготовлен по результатам работ, выполняемых специализированными подразделениями РГП «Казгидромет» по ведению мониторинга за состоянием окружающей среды на наблюдательной сети национальной гидрометеорологической службы.

Бюллетень предназначен для информирования государственных органов, общественности и населения о состоянии окружающей среды на территории Атырауской области и необходим для дальнейшей оценки эффективности мероприятий в области охраны окружающей среды РК с учетом тенденции происходящих изменений уровня загрязнения.

Оценка качества атмосферного воздуха в Атырауской области

1. Основные источники загрязнения атмосферного воздуха

По сообщениям Департамента экологии Атырауской области основными источниками загрязнения в г. Атырау являются объекты нефтепереработки, транспортировки:

«Атырауский нефтеперерабатывающий завод», «Тенгизшевройл», «Атыраунефтемаш», «Эмбамунайгаз», «Интергаз-Центральная Азия». Кроме того, в городе имеется два пруда-накопителя производственных сбросов, расположенных с обеих подветриваемых сторон города (северо-западная сторона - пруд-накопитель «Квадрат» и восточная сторона – «Тухлая балка»). Все городские сбросы в накопитель осуществляются практически без очистки, в итоге формируется основной источник сероводорода – накопитель в 1000 гектаров, в котором идут процессы гниения органических веществ – канализационных стоков, в том числе нефтепродуктов.

В Атырауской области имеется 142 предприятий первой категории. Фактический суммарной выброс от предприятий за 2020 год составил 150,07 тыс. тонн.

Город Атырау, город Кульсары и Макатский район полностью снабжены природным газом.

Согласно данным АПФ АО «КазТрансгазАймак» автономных котельных по городу Атырау – 80 030 ед., по Макатскому району – 1783 ед.

2. Мониторинг качества атмосферного воздуха

Наблюдения за состоянием атмосферного воздуха на территории г. Атырау проводятся на 6 постах наблюдения, в том числе на 2 постах ручного отбора проб и на 4 автоматических станциях (Приложение 1).

В целом по городу определяется по 16 показателям: 1) *взвешенные частицы (пыль); 2) взвешенные частицы PM-2,5; 3) взвешенные частицы PM-10; 4) диоксид серы; 5) оксид углерода; 6) диоксид азота; 7) оксид азота; 8) аммиак; 9) сероводород; 10) озон; 11) фенол; 12) формальдегид; 13) бензол; 14) толуол; 15) этилбензол; 16) ортоксиол (C₂H₆).*

В таблице 1 представлена информация о местах расположения постов наблюдений и перечне определяемых показателей на каждом посту.

Таблица 1

Место расположения постов наблюдений и определяемые примеси

№	Сроки отбора	Проведение наблюдений	Адрес поста	Определяемые примеси
1	3 раза в сутки	ручной отбор проб (дискретные методы)	мкр Самал, ул. А. Кекильбаева 15	взвешенные частицы (пыль), диоксид серы, оксид углерода, диоксид и оксид азота, сероводород, фенол, аммиак, формальдегид, бензол, толуол, этилбензол, ортоксиол (C ₂ H ₆)

5		в непрерывном режиме	мкр Курсай, ул. Карабау строение 12	взвешенные частицы (пыль), диоксид серы, оксид углерода, диоксид и оксид азота сероводород, фенол, аммиак, формальдегид
6			мкр Жулдыз, 6-я улица, 29	взвешенные частицы РМ-2,5, взвешенные частицы РМ-10, диоксид серы, оксид углерода, диоксид и оксид азота озон, сероводород, аммиак
8			район Сырдарья 3	взвешенные частицы РМ-2,5, взвешенные частицы РМ-10, диоксид серы, оксид углерода, диоксид и оксид азота озон, сероводород, аммиак
9	в непрерывном режиме – каждые 20 минут		мкр. Береке, район промзоны Береке	взвешенные частицы РМ-2,5, взвешенные частицы РМ-10, диоксид серы, оксид углерода, диоксид и оксид азота озон, сероводород, аммиак
10			мкр Нурсая, пр. Елорда д. 24, территория ТОО «высший колледж АПЕС»	взвешенные частицы РМ-2,5, взвешенные частицы РМ-10, диоксид серы, оксид углерода, диоксид азота, сероводород.

Результаты мониторинга качества атмосферного воздуха в г. Атырау за ноябрь 2022 года.

По данным сети наблюдений в г. Атырау, уровень загрязнения атмосферного воздуха оценивался как **низкий**, он определялся значением СИ=1 (низкий уровень) по сероводороду в районе поста №10 (мкр Нурсая, пр. Елорда д. 24, территория ТОО «высший колледж АПЕС») и НП= 0% (низкий уровень).

Максимально-разовые концентрации составили: сероводорода – 1,0 ПДК_{м.р.}. По другим показателям превышений ПДК_{м.р.} не наблюдалось.

Случаи экстремально высокого и высокого загрязнения (ВЗ и ЭВЗ): ВЗ (более 10 ПДК) и ЭВЗ (более 50 ПДК) не были отмечены.

Фактические значения, а также кратность превышений нормативов качества и количество случаев превышения указаны в Таблице 2.

Таблица 2

Характеристика загрязнения атмосферного воздуха

Примесь	Средняя концентрация		Максимальная разовая концентрация		НП	Число случаев превышения ПДК _{м.р.}		
	мг/м ³	Кратность ПДК _{с.с.}	мг/м ³	Кратность ПДК _{м.р.}		%	>ПДК	>5 ПДК
г. Атырау								
Взвешенные вещества	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0	0	0	0
Взвешенные частицы РМ-2,5	0,0050	0,14	0,1583	1,0	0,0	0	0	0
Взвешенные частицы РМ-10	0,0047	0,08	0,1891	0,6	0,0	0	0	0
Диоксид серы	0,001	0,03	0,0190	0,0	0,0	0	0	0
Оксид углерода	0,03	0,01	1,98	0,4	0,0	0	0	0

Диоксид азота	0,00	0,03	0,03	0,2	0,0	0	0	0
Оксид азота	0,0061	0,10	0,02	0,1	0,0	0	0	0
Озон	0,0113	0,38	0,1242	0,8	0,0	0	0	0
Сероводород	0,0006		0,0080	1,0	0,0	1	0	0
Фенол	0,001	0,32	0,003	0,3	0,0	0	0	0
Аммиак	0,005	0,14	0,0479	0,2	0,0	0	0	0
Формальдегид	0,002	0,20	0,004	0,1	0,0	0	0	0
Бензол	0,000	0,00	0,000	0,0	0,0	0	0	0
Толуол	0,000		0,000	0,0	0,0	0	0	0
Этилбензол	0,000		0,000	0,0	0,0	0	0	0
Ортоксиол (C ₂ H ₆)	0,000		0,000	0,0	0,0	0	0	0

Выводы:

За последние пять лет уровень загрязнения атмосферного воздуха изменился следующим образом:

Сравнение СИ и НП за ноябрь 2018-2022 гг.в
г.Атырау



Как видно из графика, уровень загрязнения воздуха в ноябре за последние пять лет, по городу Атырау с 2018 года по 2021 года оценивался как «повышенным». В 2022 году уровень загрязнения в ноябре оценивается как «низкий».

Количество превышений максимально-разовых ПДК было отмечено по сероводороду (1 случаи).

Увеличению концентрации сероводорода способствуют объекты нефтепереработки, транспортировки и пруд-накопителя производственных сбросов «Тухлая балка», расположенных на восточной подветриваемой стороне города, которые являются основными источниками загрязнения воздуха сероводородом.

2.1 Метеорологические условия

В начале, середине месяца область находилась в ложбине циклона, с прохождением фронтальных разделов наблюдалась неустойчивая погода, шли

осадки (дождь, снег), с усилением ветра порывы 15-22 м/с. В начале второй и третьи декады месяца наблюдалась туман.

2.2 Мониторинг качества атмосферного воздуха в г. Кульсары.

Наблюдения за состоянием атмосферного воздуха на территории г. Кульсары проводятся на стационарном посту наблюдения (Приложение 1).

В целом по городу определяется до 7 показателей: 1) *взвешенные частицы РМ-10*; 2) *диоксид серы*; 3) *оксид углерода*; 4) *диоксид азота*; 5) *оксид азота*; 6) *оzone*; 7) *аммиак*.

В таблице 3 представлена информация о местах расположения постов наблюдений и перечне определяемых показателей на каждом посту.

Таблица 3

Место расположения постов наблюдений и определяемые примеси

Номер поста	Сроки отбора	Проведение наблюдений	Адрес поста	Определяемые примеси
7	каждые 20 минут	в непрерывном режиме	ул.Махамбет Утемисова,37 А	взвешенные частицы РМ-10, диоксид серы, оксид углерода, диоксид и оксид азота, озон (приземный), аммиак

Результаты мониторинга качества атмосферного воздуха в г. Кульсары за ноябрь 2022 года.

По данным сети наблюдений г. Кульсары, уровень загрязнения атмосферного воздуха оценивался как **низкий**, он определялся значением СИ=1 (низкий уровень) и НП=0% (низкий уровень) по оксиду углерода.

Средние концентрации озона (приземный) составил – 2,05 ПДК_{с.с.}, концентрации остальных загрязняющих веществ не превышали ПДК.

Случаи экстремально высокого и высокого загрязнения (ВЗ и ЭВЗ): ВЗ (более 10 ПДК) и ЭВЗ (более 50 ПДК) не были отмечены.

Фактические значения, а также кратность превышений нормативов качества и количество случаев превышения указаны в Таблице 4.

Таблица 4


Характеристика загрязнения атмосферного воздуха

Примесь	Средняя концентрация		Максимальная разовая концентрация		НП %	Число случаев превышения ПДК _{м.р.}		
	мг/м ³	Кратно стъ ПДК _{с.с.}	мг/м ³	Кратно стъ ПДК _{м.р.}		>ПД К	>5 ПДК	>10 ПДК
г. Кульсары								
Взвешенные частицы РМ-10	0,0003	0,00	0,1286	0,26	0,0	0	0	0
Диоксид серы	0,0104	0,21	0,0228	0,05	0,0	0	0	0
Оксид углерода	0,1918	0,06	1,1175	0,22	0,0	0	0	0
Диоксид азота	0,0000	0,00	0,0098	0,05	0,0	0	0	0
Оксид азота	0,0000	0,00	0,0098	0,02	0,0	0	0	0
Озон	0,0615	2,05	0,1521	0,95	0,0	0	0	0

Аммиак	0,0000	0,00	0,0098	0,05	0,0	0	0	0
--------	--------	------	--------	------	-----	---	---	---

Выводы:

За последние пять лет уровень загрязнения атмосферного воздуха изменился следующим образом:



Как видно из графика, уровень загрязнения атмосферного воздуха в ноябре г. Кульсары за последние пять лет оценивался как «низкий».

Состояние атмосферного воздуха по данным экспедиционных наблюдений

Помимо стационарных постов наблюдений в городе Атырау действует передвижная экологическая лаборатория, с помощью которой измерение качества воздуха проводятся 3 раза в сутки по неполной программе (07,13,19 час. местного времени) на 3 точках. Точка №1-п.Жумыскер, улица Жастар; точка №2-вокзал Атырау; точка №3- Черная речка, городской пруд-испаритель по 11 показателям: 1) взвешенные частицы (PM_{-10}); 2) диоксид серы; 3) оксид углерода; 4) диоксид азота; 5) взвешенные частицы ($PM_{-2,5}$); 6) Летучие органические соединения (ЛОС); 7) сероводород; 8) углеводороды ($C_{12}-C_{19}$); 9) формальдегид; 10) фенол; 11) метан.

Максимально-разовая концентрация сероводорода точки №1-п.Жумыскер, улица Жастар находилось в пределах 1,25 ПДК_{м.р.}, точки №2-вокзал-3,75 ПДК_{м.р.}, №3-Черная речка, городской пруд-испаритель-1,125ПДК_{м.р.}. Концентрации остальных загрязняющих веществ, по данным наблюдений, находились в пределах допустимой нормы.

Фактические значения, а также кратность превышений нормативов качества и количество случаев превышения указаны в Таблице 13.

Таблица 13
Максимальные концентрации загрязняющих веществ по данным наблюдений г.Атырау

Определяемые примеси	Точки отбора
----------------------	--------------

	№1		№2		№3	
	q_m мг/м ³	$q_m/\text{ПДК}$	q_m мг/м ³	$q_m/\text{ПДК}$	q_m мг/м ³	$q_m/\text{ПДК}$
Взвешенные частицы (PM-2,5)	0,006	0,038	0,016	0,100	0,005	0,031
Взвешенные частицы (PM-10)	0,010	0,033	0,011	0,037	0,010	0,033
Оксид углерода	3,57	0,714	2,5	0,5	2,3	0,460
Диоксид азота	0,091	0,455	0,093	0,465	0,040	0,200
Метан	25	0,5	23,0	0,460	6,00	0,120
Сероводород	0,010	1,25	0,03	3,750	0,009	1,125
Фенол	0,003	0,300	0,006	0,600	0,003	0,300
Углеводороды (C ₁₂ -C ₁₉)	0,3	0,3	0,600	0,600	0,2	0,2
Диоксид серы	0,180	0,360	0,100	0,200	0,110	0,220
Формальдегид	0,004	0,114	0,009	0,257	0,005	0,143
Летучие органические соединения (ЛОС)	0,500	-	0,600	-	0,300	-

2.3 Мониторинг качества атмосферного воздуха в районе Макат.

Наблюдения за состоянием атмосферного воздуха на территории Макатского района проводится на 1 компактной станции наблюдения (Приложение 1).

В целом по району Макат определяется до 6 показателей: 1) *взвешенные частицы PM-2,5;* 2) *взвешенные частицы PM-10;* 3) *диоксид серы;* 4) *диоксид азота;* 5) *сероводород;* 6) *оксид углерода.*

В таблице 5 представлена информация о местах расположения постов наблюдений и перечне определяемых показателей на каждом посту.

Таблица 5

Место расположения постов наблюдений и определяемые примеси

Номер поста	Сроки отбора	Проведение наблюдений	Адрес поста	Определяемые примеси
1	каждые 20 минут	в непрерывном режиме	Макатский район, п.Макат ул.Алаш 23, дом культуры.	взвешенные частицы РМ-2,5, взвешенные частицы РМ-10, диоксид серы, диоксид азота, сероводород, оксид углерода.

Результаты мониторинга качества атмосферного воздуха в районе Макат за ноябрь 2022 года.

По данным сети наблюдений района Макат, уровень загрязнения атмосферного воздуха оценивался как **низкий**, он определялся значением СИ=0,6 (низкий уровень) и НП=0% (низкий уровень).

Средние концентрации диоксида азота составили – 2,43 ПДК_{с.с.}, концентрации остальных загрязняющих веществ не превышали ПДК.

Случаи экстремально высокого и высокого загрязнения (ВЗ и ЭВЗ): ВЗ (более 10 ПДК) и ЭВЗ (более 50 ПДК) не были отмечены.

Фактические значения, а также кратность превышений нормативов качества и количество случаев превышения указаны в Таблице 6.

Таблица 6

Характеристика загрязнения атмосферного воздуха

Примесь	Средняя концентрация		Максимальная разовая концентрация		НП	Число случаев превышения ПДК _{м.р.}		
	мг/м ³	Кратность ПДК _{с.с.}	мг/м ³	Кратность ПДК _{м.р.}		%	>ПДК	>5 ПДК
район Макат								
Взвешенные частицы PM-2,5	0,0030	0,09	0,0030	0,0	0,0	0	0	0
Взвешенные частицы PM-10	0,0200	0,33	0,0200	0,1	0,0	0	0	0
Диоксид серы	0,0000	0,00	0,0010	0,0	0,0	0	0	0
Оксид углерода	0,1980	0,07	0,1980	0,0	0,0	0	0	0
Диоксид азота	0,0970	2,43	0,0970	0,5	0,0	0	0	0
Сероводород	0,0000		0,0047	0,6	0,0	0	0	0

2.4 Мониторинг качества атмосферного воздуха в Индерском районе.

Наблюдения за состоянием атмосферного воздуха на территории Индерского района проводится на 1 компактной станции наблюдения (Приложение 1).

В целом по району Индер определяется до 6 показателей: 1) *взвешенные частицы PM-2,5*; 2) *взвешенные частицы PM-10*; 3) *диоксид серы*; 4) *диоксид азота*; 5) *сероводород*; 6) *оксид углерода*.

В таблице 7 представлена информация о местах расположения постов наблюдений и перечне определяемых показателей на каждом посту.

Таблица 7

Место расположения постов наблюдений и определяемые примеси

Номер поста	Сроки отбора	Проведение наблюдений	Адрес поста	Определяемые примеси
1	каждые 20 минут	в непрерывном режиме	пос. Индерборский, ул. Н.Мендигалиев а д. 47.	взвешенные частицы PM-2,5, взвешенные частицы PM-10, диоксид серы, диоксид азота, сероводород, оксид углерода.

Результаты мониторинга качества атмосферного воздуха в районе Индер за ноябрь 2022 года.

По данным сети наблюдений района Индер, уровень загрязнения атмосферного воздуха оценивался как **низкий**, он определялся значением СИ=0,1 (низкий уровень) и НП=0% (низкий уровень).

По всем показателям превышений ПДК_{м.р.} не наблюдалось.

Фактические значения, а также кратность превышений нормативов качества и количество случаев превышения указаны в Таблице 8.

Таблица 8

Характеристика загрязнения атмосферного воздуха

Примесь	Средняя концентрация	Максимальная разовая концентрация	НП	Число случаев превышения ПДК _{м.р.}
---------	----------------------	-----------------------------------	----	--

	мг/м ³	Кратно стъ ПДК _{с.с.}	мг/м ³	Кратно стъ ПДК _{м.р.}	%	>П ДК	>5 ПДК	>10 ПДК
район Индер								
Взвешенные частицы PM-2,5	0,0010	0,03	0,0010	0,0	0,0	0	0	0
Взвешенные частицы PM-10	0,0100	0,17	0,0100	0,0	0,0	0	0	0
Диоксид серы	0,0040	0,08	0,0040	0,0	0,0	0	0	0
Оксид углерода	0,2870	0,10	0,2870	0,1	0,0	0	0	0
Диоксид азота	0,0000	0,00	0,0000	0,0	0,0	0	0	0
Сероводород	0,0000		0,0000	0,0	0,0	0	0	0

2.5 Мониторинг качества атмосферного воздуха в селе Жанбай.

Наблюдения за состоянием атмосферного воздуха на территории с.Жанбай проводится на 1 компактной станции наблюдения (Приложение 1).

В целом в селе Жанбай определяется до 6 показателей: 1) *взвешенные частицы PM-2,5*; 2) *взвешенные частицы PM-10*; 3) *диоксид серы*; 4) *диоксид азота*; 5) *сероводород*; 6) *оксид углерода*.

В таблице 9 представлена информация о местах расположения постов наблюдений и перечне определяемых показателей на каждом посту.

Таблица 9

Место расположения постов наблюдений и определяемые примеси

Номер поста	Сроки отбора	Проведение наблюдений	Адрес поста	Определяемые примеси
1	каждые 20 минут	в непрерывном режиме	с.Жанбай, ул.Т. Нысанов уч 96	взвешенные частицы PM-2,5, взвешенные частицы PM-10, диоксид серы, диоксид азота, сероводород, оксид углерода.

Результаты мониторинга качества атмосферного воздуха в с. Жанбай за ноябрь 2022 года.

По данным сети наблюдений село Жанбай, уровень загрязнения атмосферного воздуха оценивался как **низкий**, он определялся значением СИ=1 (низкий уровень) и НП=0% (низкий уровень).

По всем показателям превышений ПДК_{м.р.} не наблюдалось.

Случаи экстремально высокого и высокого загрязнения (ВЗ и ЭВЗ): ВЗ (более 10 ПДК) и ЭВЗ (более 50 ПДК) не были отмечены.

Фактические значения, а также кратность превышений нормативов качества и количество случаев превышения указаны в Таблице 10.

Таблица 10

Характеристика загрязнения атмосферного воздуха

Примесь	Средняя концентрация		Максимальная разовая концентрация		НП	Число случаев превышения ПДК _{м.р.}		
	мг/м ³	Кратно стъ ПДК _{с.с.}	мг/м ³	Кратно стъ ПДК _{м.р.}		%	>П ДК	>5 ПДК
село Жанбай								

Взвешенные частицы PM-2,5	0,0020	0,06	0,0162	0,1	0,0	0	0	0
Взвешенные частицы PM-10	0,0030	0,05	0,0277	0,1	0,0	0	0	0
Диоксид серы	0,0056	0,11	0,2014	0,4	0,0	0	0	0
Оксид углерода	0,7997	0,27	1,5204	0,3	0,0	0	0	0
Диоксид азота	0,0037	0,09	0,0692	0,3	0,0	0	0	0
Сероводород	0,0014		0,0076	1,0	0,0	0	0	0

2.6 Мониторинг качества атмосферного воздуха в поселке Ганюшкино.

Наблюдения за состоянием атмосферного воздуха на территории п. Ганюшкино проводится на 1 компактной станции наблюдения (Приложение 1).

В целом в поселке Ганюшкино определяется до 6 показателей: 1) *взвешенные частицы PM-2,5*; 2) *взвешенные частицы PM-10*; 3) *диоксид серы*; 4) *диоксид азота*; 5) *сероводород*; 6) *оксид углерода*.

В таблице 11 представлена информация о местах расположения постов наблюдений и перечне определяемых показателей на каждом посту.

Таблица 11

Место расположения постов наблюдений и определяемые примеси

Номер поста	Сроки отбора	Проведение наблюдений	Адрес поста	Определяемые примеси
1	каждые 20 минут	в непрерывном режиме	с.Курмангазы, «ДК им.С.Күшекбаева».	взвешенные частицы PM-2,5, взвешенные частицы PM-10, диоксид серы, диоксид азота, сероводород, оксид углерода.

Результаты мониторинга качества атмосферного воздуха в пос. Ганюшкино за ноябрь 2022 года.

По данным сети наблюдений пос. Ганюшкино, уровень загрязнения атмосферного воздуха оценивался как **низкий**, он определялся значением СИ=0,3 (низкий уровень) и НП=0% (низкий уровень).

По всем показателям превышений ПДК_{м.р.} не наблюдалось.

Случаи экстремально высокого и высокого загрязнения (ВЗ и ЭВЗ): ВЗ (более 10 ПДК) и ЭВЗ (более 50 ПДК) не были отмечены.

Фактические значения, а также кратность превышений нормативов качества и количество случаев превышения указаны в Таблице 12.

Таблица 12

Характеристика загрязнения атмосферного воздуха

Примесь	Средняя концентрация		Максимальная разовая концентрация		НП	Число случаев превышения ПДК _{м.р.}		
	мг/м ³	Кратность ПДК _{с.с.}	мг/м ³	Кратность ПДК _{м.р.}		%	>ПДК	>5 ПДК
пос. Ганюшкино								
Взвешенные частицы PM-2,5	0,0008	0,02	0,0260	0,2	0,0	0	0	0
Взвешенные частицы PM-10	0,0016	0,03	0,0520	0,2	0,0	0	0	0
Диоксид серы	0,0030	0,06	0,0049	0,0	0,0	0	0	0

Оксид углерода	0,1831	0,06	1,4948	0,3	0,0	0	0	0
Диоксид азота	0,0001	0,00	0,0157	0,1	0,0	0	0	0
Сероводород	0,0000		0,0009	0,1	0,0	0	0	0

3 Мониторинг качества поверхностных вод на территории Атырауской области

Наблюдения за качеством поверхностных вод по Атырауской области проводились на 20 створах на 5 водных объектах (реки Жайык, Кигаш, проток Шаронова, протоки Перетаска и Яик).

При изучении поверхностных вод в отбираемых пробах воды определяются 43 гидрохимических показателей качества: *визуальные наблюдения, температура, взвешенные вещества, прозрачность, цветность, водородный показатель (рН), растворенный кислород, БПК₅, ХПК, сухой остаток, главные ионы солевого состава, биогенные элементы, органические вещества (нефтепродукты, фенолы), тяжелые металлы, пестициды.*

Мониторинг за состоянием качества поверхностных и морских вод **по гидробиологическим показателям** на территории Атырауской области за отчетный период проводился на 3 водных объектах (рек Жайык, Кигаш и в протоке Шаронова) на 5 створах. Было проанализировано 5 проб на определение острой токсичности исследуемой воды на тестируемый объект.

3.1 Результаты мониторинга качества поверхностных вод на территории Атырауской области

Основным нормативным документом для оценки качества воды водных объектов Республики Казахстан является «Единая система классификации качества воды в водных объектах» (далее – Единая Классификация).

По Единой классификации качество воды оценивается следующим образом:

Таблица 3

Наименование водного объекта	Класс качества воды		Параметры	ед. изм.	концентрация
	Ноябрь 2021 г.	Ноябрь 2022г.			
р. Жайык	4 класс	3 класс	Магний	мг/дм ³	24,6
пр.Перетаска	4 класс	2 класс	ХПК	мг/дм ³	15,7
пр.Яик	4 класс	3 класс	Магний	мг/дм ³	23,5
р.Кигаш	4 класс	2 класс	ХПК	мг/дм ³	19,0
пр.Шаронова	не нормируется (>5 класс)	2 класс	ХПК	мг/дм ³	19,2

Как видно из таблицы, в сравнении с ноябрь месяцем 2021 года качество поверхностной воды реки Жайык и пр.Яик с 4 класса перешло в 3 класс, р.Кигаш и пр.Перетаска с 4 класса перешло в 2 класс, пр.Шаронова с выше 5 класса перешло в 2 класс - улучшилось.

Основными загрязняющими веществами в водных объектах по Атырауской области являются магний и ХПК.

За ноябрь 2022 года на территории Атырауской области ВЗ и ЭВЗ не обнаружены.

Информация по качеству водных объектов по гидрохимическим показателям в разрезе створов указана в Приложении 2.

3.2 Результаты мониторинга качества поверхностных вод по гидробиологическим (токсикологическим) показателям на территории Атырауской области

Река Жайык.

Биотестирование. По данным биотестирования тест-параметр по реке Жайык был предоставлен в последовательном расположения точек наблюдения: поселок Дамба - 0%, г. Атырау 0,5 км ниже сброса КГП «Атырау су арнасы» - 0%, п. Индер «в створе водопоста» - 0%. Полученные данные показывает отсутствие токсического влияния исследуемой воды на тест-объект.

Проток Шаронова.

Биотестирование. В процессе определения острой токсичности воды на тест-объект процент погибших дафний по отношению к контролю (тест- параметр) в протоке - 0%. Токсического влияния на тест-объект не обнаружено.

Река Кигаш.

Биотестирование. Данные полученные в ходе биотестирования по реке Кигаш показали отсутствие токсического влияние на тест-объект. Число выживших дафний в исследуемой воде составило 100%. Тест- параметр составил - 0%.

Информация по качеству водных объектов по токсикологическим показателям в разрезе створов указана в Приложении 3.

5. Химический состав атмосферных осадков на территории Атырауской области

Наблюдения за химическим составом атмосферных осадков заключались в отборе проб дождевой воды на 3 метеостанции (Атырау, Ганюшкино, Пешной) (рис. 4.3.).

Концентрации всех определяемых загрязняющих веществ в осадках не превышают предельно допустимые концентрации (ПДК).

В пробах осадков преобладало содержание сульфатов 33,09%, хлоридов 100%, гидрокарбонатов 22,84%, ионов аммония 14,13%, ионов натрия 3,71%, ионов калия 3,04 %, ионов магния 37,4%, ионов кальция 7,42%.

Наибольшая общая минерализация отмечена на МС Ганюшкино – 70,03 мг/л, наименьшая на МС Пешной – 49,63 мг/л.

Удельная электропроводимость атмосферных осадков находилась в пределах от 92,9 (МС Пешной) до 120,1 мкСм/см (МС Атырау).

Кислотность выпавших осадков имеет характер слабощелочной среды, находится в пределах от 6,4 (МС Пешной) до 7,0 (МС Атырау).


6. Радиационная обстановка

Наблюдения за уровнем гамма излучения на местности осуществлялись ежедневно на 3-х метеорологических станциях (Атырау, Пешной, Кульсары) и 1 автоматическом посту г. Кульсары (ПНЗ № 7).


Средние значения радиационного гамма - фона приземного слоя атмосферы в области находились в пределах 0,09 – 0,14 мкЗв/ч. В среднем по области радиационный гамма-фон составил 0,11 мкЗв/ч и находился в допустимых пределах.

Мониторинг за радиоактивным загрязнением приземного слоя атмосферы на территории Атырауской области осуществлялся на метеорологической станции Атырау, путем отбора проб воздуха горизонтальными планшетами. На станции проводился пятисуточный отбор проб. Среднесуточная плотность радиоактивных выпадений в приземном слое атмосферы г. Атырау колебалась в пределах 1,7-2,1 Бк/м². Средняя величина плотности выпадений составила 1,8 Бк/м², что не превышает предельно-допустимый уровень.


Приложение 1




Карта расположения стационарной и передвижной сети наблюдений за загрязнением атмосферного воздуха города Атырау



Карта расположения стационарной сети наблюдений за загрязнением атмосферного воздуха города Кульсары




Карта расположения стационарной сети наблюдений за загрязнением атмосферного воздуха Макатского района




Карта расположения стационарной сети наблюдений за загрязнением атмосферного воздуха Индерского района



Карта расположения стационарной сети наблюдений за загрязнением атмосферного воздуха пос. Ганюшкино



Карта расположения стационарной сети наблюдений за загрязнением атмосферного воздуха село Жанбай



Расположения метеостанций за наблюдением атмосферных осадков и снежного покрова на территории Атырауской области



Расположения метеостанций за наблюдением уровня радиационного гамма-фона и плотности радиоактивных выпадений на территории Атырауской области

Промышленный мониторинг
Состояние загрязнения атмосферного воздуха по данным станций мониторинга
качества воздуха «North Caspian Operating Company»
за ноябрь 2022 года.

Для наблюдения за состоянием атмосферного воздуха использовались станции мониторинга качества воздуха (далее - СМКВ), работающие в автоматическом непрерывном режиме.

Наблюдения за загрязнением атмосферного воздуха на территории города Атырау и Атырауской области проводились по данным 19 станций СМКВ «North Caspian Operating Company» (NCOC).

Станций, расположенные в городской зоне мониторинга: «Жилгородок», «Авангард», «Акимат», «Восток», «Загородная», «Привокзальная», «ТКА», «Шагала».

Станций, расположенные в пригородных зонах мониторинга: «Макат», «Доссор», «Самал», «Станция «Ескене», «Поселок «Ескене»», «Карабатан», «Таскескен».

Станций расположенные в санитарных защитных зонах: «Болашак Восток», «Болашак Запад», «Болашак Север», «Болашак Юг».

В атмосферном воздухе определяется содержание оксида углерода, диоксида серы, сероводорода, оксида и диоксида азота.

Превышение наблюдалось по **сероводороду** в районе станции «Жилгородок» - 4,3325 ПДК_{м.р.}, станции «Авангард» - 1,6125 ПДК_{м.р.}, станции «Акимат» – 1,9350 ПДК_{м.р.}, станции «Восток» – 4,7075 ПДК_{м.р.}, станции «Загородная» - 2,1713 ПДК_{м.р.}, станции «Привокзальный» - 3,459 ПДК_{м.р.}, станции «ТКА» – 1,3150 ПДК_{м.р.}, станции «Шагала» - 3,4938 ПДК_{м.р.}, станции «Самал» – 2,6100 ПДК_{м.р.} станции «Карабатан» – 2,2038 ПДК_{м.р.}, станции «Таскекскен» – 1,0263 ПДК_{м.р.}, станции «Болашак Запад» – 11,2113 ПДК_{м.р.}, станции «Болашак Юг» – 2,1288 ПДК_{м.р.}.

Превышение наблюдалось по **оксиду углерода** в районе станции «Жилгородок» - 1,1721 ПДК_{м.р.}, станции «Акимат» – 2,1248 ПДК_{м.р.}, станции «Привокзальный» - 3,5543 ПДК_{м.р.}.

Превышение наблюдалось по **оксиду азота** в районе станции «Акимат» - 1,4051 ПДК_{м.р.}, станции «Загородная» – 1,4334 ПДК_{м.р.}.

Концентрации остальных определяемых веществ находились в пределах нормы

таблица к приложению

Состояние загрязнения атмосферного воздуха по данным станций мониторинга качества воздуха «North Caspian Operating Company»

Станции СМКВ NCOC	Оксид углерода (CO), мг/м3				Диоксид серы (SO2), мг/м3				Сероводород (H2S), мг/м3			
	Средняя конц.		Максимальная конц.		Средняя конц.		Максимальная конц.		Средняя конц.		Максимальная конц.	
	мг/м3	кратность превышения ПДК	мг/м3	кратность превышения ПДК	мг/м3	кратность превышения ПДК	мг/м3	кратность превышения ПДК	мг/м3	кратность превышения ПДК	мг/м3	кратность превышения ПДК
Станции расположенные в городской зоне												
Жилгородок	0,3935	0,1312	5,8607	1,1721	0,0009	0,018	0,0162	0,032	0,0009	-	0,0347	4,3325
Авангард	0,3748	0,1249	4,084	0,8169	0,0015	0,030	0,0171	0,034	0,0012	-	0,0129	1,6125
Акимат	0,4548	0,1516	0,4548	2,1248	0,0027	0,054	0,0303	0,061	0,0010	-	0,0154	1,9350
Восток	0,2391	0,0797	3,8863	0,7773	0,0019	0,037	0,0326	0,065	0,0014	-	0,0377	4,7075
Загородная	0,4496	0,1499	4,9861	0,9972	0,0021	0,042	0,0328	0,066	0,0020	-	0,0173	2,1713
Привокзальный	0,5555	0,1852	17,771	3,5543	0,0010	0,020	0,0084	0,017	0,0019	-	0,0277	3,459
ТКА	0,1100	0,0367	0,4789	0,0958	0,0013	0,026	0,0427	0,085	0,0014	-	0,0105	1,3150
Шагала	0,4090	0,1363	4,9024	0,9805	0,0017	0,034	0,0156	0,031	0,0010	-	0,0280	3,4938
Станции расположенные в пригородной зоне												
Доссор	0,2042	0,0681	0,9944	0,1989	0,0006	0,011	0,0030	0,006	0,0006	-	0,0021	0,2625
Макат	0,2132	0,0711	0,8817	0,1763	0,0012	0,024	0,0074	0,015	0,0012	-	0,0059	0,7363
Поселок Ескене	0,1657	0,0552	0,2752	0,0550	0,0009	0,018	0,0369	0,074	0,0011	-	0,0062	0,7688
Самал	0,2752	0,0917	0,5625	0,1125	0,0005	0,009	0,0135	0,027	0,0012	-	0,0209	2,6100
Станция Ескене	0,1287	0,0429	0,3915	0,0783	0,0009	0,018	0,0105	0,021	0,0005	-	0,0053	0,6613
Карабатан	0,2465	0,0822	0,8933	0,1787	0,0013	0,026	0,0510	0,102	0,0006	-	0,0176	2,2038
Таскескен	0,1628	0,0543	0,370	0,0739	0,0009	0,018	0,0311	0,062	0,0005	-	0,0082	1,0263
Станции расположенные в С33												
Болашак Восток	0,1628	0,0543	0,2719	0,0544	0,0014	0,028	0,0479	0,096	0,0010	-	0,0077	0,9575
Болашак Запад	0,1814	0,0605	1,1117	0,2223	0,0010	0,021	0,1096	0,219	0,0023	-	0,0897	11,2113
Болашак Север	0,2109	0,0703	0,4379	0,0876	0,0008	0,015	0,0206	0,041	0,0012	-	0,0047	0,5825
Болашак Юг	0,1690	0,0563	0,4442	0,0888	0,0011	0,021	0,0532	0,106	0,0019	-	0,0170	2,1288

продолжение таблицы приложения

Станции СМКВ NCOC	Диоксид азота (NO ₂), мг/м ³				Оксид азота (NO), мг/м ³			
	Средняя конц.		Максимальная конц.		Средняя конц.		Максимальная конц.	
	мг/м ³	кратность превышения ПДК	мг/м ³	кратность превышения ПДК	мг/м ³	кратность превышения ПДК	мг/м ³	кратность превышения ПДК
Станции расположенные в городской зоне								
Жилгородок	0,0162	0,4042	0,0552	0,2760	0,0060	0,0995	0,2955	0,7387
Авангард	0,0178	0,4439	0,0697	0,3487	0,0105	0,1757	0,3264	0,8159
Акимат	0,0238	0,5953	0,0853	0,4264	0,0316	0,5259	0,5620	1,4051
Восток	0,0216	0,5393	0,0792	0,3959	0,0192	0,3201	0,3185	0,7961
Загородная	0,0161	0,4018	0,0751	0,3755	0,0244	0,4067	0,5734	1,4334
Привокзальный	0,0205	0,5119	0,0734	0,3672	0,0099	0,1650	0,1823	0,4556
ТКА	0,0106	0,2656	0,0509	0,2546	0,0109	0,1811	0,0856	0,2140
Шагала	0,0177	0,4436	0,0603	0,3017	0,0088	0,1462	0,3370	0,8424
Станции расположенные в пригородной зоне								
Доссор	0,0059	0,1472	0,0463	0,2316	0,0017	0,0283	0,0541	0,1352
Макат	0,0092	0,2303	0,0506	0,2532	0,0047	0,0789	0,1181	0,2954
Поселок Ескене	0,0021	0,0514	0,0129	0,0645	0,0004	0,0061	0,0029	0,0072
Самал	0,0042	0,1041	0,0429	0,2145	0,0012	0,0200	0,0459	0,1147
Станция Ескене	0,0026	0,0645	0,0264	0,1320	0,0018	0,0301	0,0527	0,1318
Карабатан	0,0062	0,1538	0,1185	0,5930	0,0031	0,0516	0,2839	0,7098
Таскескен	0,0040	0,1008	0,0611	0,3054	0,0024	0,0394	0,0834	0,2086
Станции расположенные в СЗЗ								
Болашак Восток	0,0023	0,0572	0,0130	0,0651	0,0007	0,0122	0,0036	0,0091
Болашак Запад	0,0034	0,0850	0,0222	0,1108	0,0008	0,0132	0,0140	0,0351
Болашак Север	0,0024	0,0590	0,0188	0,0940	0,0006	0,0098	0,0098	0,0245
Болашак Юг	0,0023	0,0584	0,0132	0,0662	0,0008	0,0129	0,0034	0,0085

**Состояние загрязнения атмосферного воздуха по данным станций
мониторинга качества воздуха ТОО
«Атырауский нефтеперерабатывающий завод» за ноябрь 2022 года**

Для наблюдений за состоянием атмосферного воздуха использовались станции мониторинга качества воздуха (далее - СМКВ), работающие в автоматическом непрерывном режиме.

Наблюдения за загрязнением атмосферного воздуха на территории города Атырау проводились на 4 экопостах (№4 «Мирный» – поселок Мирный, улица Гайдара; №1 «Перетаска» – улица Говорова; №3 «Химпоселок» - поселок Химпоселок, улица Менделеева; №2 «Пропарка» - район промывочной станции), расположенных в санитарной защитной зоне.

В атмосферном воздухе определялось содержание оксида углерода, оксида и диоксида азота, диоксида серы, сероводорода, суммарных углеводородов.

В районе экопоста №1 «Перетаска» концентрация **сероводорода** составила 1,875 ПДК_{м.р.}, экопоста №4 «Мирный» 1,125 ПДК_{м.р.}.

Концентрации остальных определяемых веществ находились в пределах нормы (таблица к приложению).

**Состояние загрязнения атмосферного воздуха по данным станций мониторинга качества воздуха
ТОО «Атырауский нефтеперерабатывающий завод»**

Станции АНПЗ	Оксид углерода (CO), мг/м ³				Оксид азота (NO), мг/м ³				Диоксид азота (NO ₂), мг/м ³			
	Концентрации											
	Средняя		Максимальная		Средняя		Максимальная		Средняя		Максимальная	
	мг/м ³	кратность превышения ПДК	мг/м ³	кратность превышения ПДК	мг/м ³	кратность превышения ПДК	мг/м ³	кратность превышения ПДК	мг/м ³	кратность превышения ПДК	мг/м ³	кратность превышения ПДК
Мирный	0,200	0,067	1,83	0,3664	0,007	0,110	0,13	0,33	0,011	0,276	0,04	0,205
Перетаска	-	-	-	-	0,025	0,410	0,34	0,8425	0,027	0,675	0,10	0,495
Пропарка	0,041	0,014	1,20	0,2394	0,005	0,090	0,06	0,14	0,037	0,920	0,07	0,335
Химпоселок	-	-	-	-	0,006	0,093	0,11	0,2675	0,020	0,491	0,07	0,335
Станции АНПЗ	Диоксид серы (SO ₂), мг/м ³				Сероводород (H ₂ S), мг/м ³				Суммарные углеводороды, мг/м ³			
	Концентрации											
	Средняя		Максимальная		Средняя		Максимальная		Средняя		Максимальная	
	мг/м ³	кратность превышения ПДК	мг/м ³	кратность превышения ПДК	мг/м ³	кратность превышения ПДК	мг/м ³	кратность превышения ПДК	мг/м ³	кратность превышения ПДК	мг/м ³	кратность превышения ПДК
Мирный	0,017	0,342	0,34	0,676	0,003	-	0,01	1,125	0,296	-	1,86	0,372
Перетаска	0,018	0,369	0,25	0,492	0,003	-	0,02	1,875	0,556	-	1,91	0,382
Пропарка	0,005	0,107	0,07	0,142	0,001	-	0,01	0,875	0,500	-	3,58	0,716
Химпоселок	0,002	0,050	0,02	0,04	0,001	-	0,01	0,625	0,645	-	3,24	0,6474

Состояние загрязнения атмосферного воздуха по данным станций
мониторинга качества воздуха компании
«ТенгизШеврОйл» за ноябрь 2022 года

Для наблюдений за состоянием атмосферного воздуха использовались станции мониторинга качества воздуха (далее - СМКВ), работающие в автоматическом непрерывном режиме.

Наблюдения за загрязнением атмосферного воздуха на территории города Атырау проводились на 4 постах (ТШО ЕМС 1, ТШО ЕМС 3, ТШО ЕМС 4, ТШО ЕМС 5) расположенных в санитарной защитной зоне месторождения «Тенгиз».

В атмосферном воздухе определялось содержание оксида углерода, диоксида азота, диоксида серы, сероводорода.

В районе поста ТШО ЕМС 1 концентрация **сероводорода** составила 1,1375 ПДК_{м.р.}, в районе поста ТШО ЕМС 3 составила 1,275 ПДК_{м.р.}.

Концентрации остальных определяемых веществ находились в пределах нормы (таблица к приложению).

**Состояние загрязнения атмосферного воздуха по данным станций мониторинга
качества воздуха компании «ТенгизШеврОйл»**

Станции ТШО	Оксид углерода (CO), мг/м ³				Диоксид азота (NO2), мг/м ³			
	Средняя		Максимальная		Средняя		Максимальная	
	мг/м ³	кратность превышения ПДК	мг/м ³	кратность превышения ПДК	мг/м ³	кратность превышения ПДК	мг/м ³	кратность превышения ПДК
ТШО ЕМС 1	1,154	0,385	1,392	0,27842	0,009	0,236	0,035	0,175
ТШО ЕМС 3	1,286	0,429	1,402	0,28044	0,014	0,361	0,023	0,1155
ТШО ЕМС 4	1,826	0,609	2,001	0,40018	0,003	0,069	0,009	0,047
ТШО ЕМС 5	1,391	0,464	1,545	0,309	0,004	0,104	0,013	0,0625
Станции ТШО	Диоксид серы (SO2), мг/м ³				Сероводород (H2S), мг/м ³			
	Средняя		Максимальная		Средняя		Максимальная	
	мг/м ³	кратность превышения ПДК	мг/м ³	кратность превышения ПДК	мг/м ³	кратность превышения ПДК	мг/м ³	кратность превышения ПДК
ТШО ЕМС 1	0,006	0,120	0,028	0,055	0,003	-	0,009	1,1375
ТШО ЕМС 3	0,007	0,145	0,010	0,0198	0,002	-	0,010	1,275
ТШО ЕМС 4	0,014	0,279	0,021	0,0414	0,001	-	0,007	0,875
ТШО ЕМС 5	0,007	0,139	0,010	0,0192	0,003	-	0,006	0,6875

**Информация о качестве поверхностных вод по Атырауской области
по створам**

Водный объект и створ	Характеристика физико-химических параметров	
река Жайык		температура воды отмечена в пределах 9,4-10,1°C, водородный показатель 7,5-7,8, концентрация растворенного в воде кислорода – 7,8-8,4 мг/дм3, БПК5 –2,1-2,8 мг/дм3, прозрачность –20,1-21 см
створ п.Индер в створе водпоста	3 класс	магний – 27,2 мг/дм3. Фактическая концентрация магния превышает фоновый класс.
АО «Казтрансойл» НПС Индер 0,5 км выше реки Жайык	3 класс	магний –27,2 мг/дм3
АО «Казтрансойл» НПС Индер 0,5 км ниже реки Жайык	3 класс	магний –26,7 мг/дм3
с.Береке 0,5 км выше р.Жайык	3 класс	магний –22,8 мг/дм3
с.Береке 0,5 км ниже р.Жайык	3 класс	магний –21,3 мг/дм3
створ 1 км выше г.Атырау	3 класс	магний –20,1 мг/дм3
створ г.Атырау, 0,5 км выше сброса КГП «Атырау су арнасы»	3 класс	магний –22,3 мг/дм3
створ г.Атырау, 0,5 км ниже сброса КГП «Атырау су арнасы»	3 класс	магний –23,0 мг/дм3
створ 1 км ниже г.Атырау	3 класс	магний –25,2 мг/дм3
створ г.Атырау 3 км ниже сброса РГКП «Урало-Атырауский осетровый завод» район Курилкино	3 класс	магний –26,7 мг/дм3
створ г.Атырау 0,5 км выше сброса РГКП «Урало-Атырауский осетровый завод» район Курилкино	3 класс	магний –27,2 мг/дм3
створ п.Дамба	3 класс	магний – 25,2 мг/дм3. Фактическая концентрация магния превышает фоновый класс.
проток Перетаска		температура воды отмечена в пределах 9,9-19,1°C, водородный показатель 7,69-7,75, концентрация растворенного в воде кислорода – 7,9-8,2 мг/дм3, БПК5 –2,1-2,4 мг/дм3, прозрачность – 20,2-20,7 см
створ г.Атырау 2 км выше сброса АО «Атырауский ТЭЦ»	2 класс	OXT – 15,3 мг/дм3.
створ г.Атырау 2 км ниже сброса АО «Атырауский ТЭЦ»	2 класс	OXT – 15,7 мг/дм3.
створ г.Атырау 0,5 км ниже ответвления протока Перетаска	2 класс	OXT – 16,2 мг/дм3.
проток Яик		температура воды отмечена в пределах 9,7-10,0°C, водородный показатель 7,78-7,9, концентрация растворенного в воде кислорода – 8,2-8,5 мг/дм3, БПК5 –2,4-2,8 мг/дм3, прозрачность –20,5-20,7 см
створ г.Атырау, 0,5 км ниже ответвления протока Яик	3 класс	магний –24,3 мг/дм3
створ г.Атырау п.Еркинкала, 0,5 км выше сброса РГКП «Атырауский осетровый рыбоводный завод»	3 класс	магний –21,8 мг/дм3

створ г.Атырау п.Еркинкала, 0,5 км ниже сброса РГКП «Атырауский осетровый рыбоводный завод»	3 класс	магний –24,3 мг/дм ³
проток Шаронова	температура воды отмечена на уровне 9,5°C, водородный показатель 7,6, концентрация растворенного в воде кислорода – 8,5мг/дм ³ , БПК5 –2,2мг/дм ³ , прозрачность – 17,6см	
створ проток Шаронова – с.Ганюшкино, в створе водпоста	2 класс	ХПК –19,2 мг/дм ³ . Фактическая концентрация ХПК превышает фоновый класс.
река Кигаш	температура воды отмечена на уровне 9,6°C, водородный показатель 7,72, концентрация растворенного в воде кислорода – 8,7 мг/дм ³ , БПК5 –2,0 мг/дм ³ , прозрачность – 17,8см, цветность – 18,5 градусов	
створ р.Кигаш – с.Котяевка, в створе водпоста	2 класс	ХПК – 19,0 мг/дм ³ . Фактическая концентрация ХПК превышает фоновый класс.

Приложение 3

Результаты качества морских вод Каспийского моря на территории Атырауской области

№	Водный объект	Пункт контроля	Пункт привязки	Индекс сопробыности		Класс качества воды	Биотестирование	
				Перифитон	Бентос		Тест пара метр, %	Оценка воды
1	р.Жайык	пос.Дамба		-	-	3	0%	Не оказывает токсического действия
2		г.Атырау	0,5 км ниже сброса КГП «Атырау Су арнасы»	-	-	3	0%	
3		п.Индер	в створе водпоста	-	-	3	0%.	
4	пр. Шаронова	с.Ганюшкино	в створе водпоста	-	-	3	0%	
5	р.Кигаш	с.Котяевка	в створе водпоста	-	-	3	0%.	

Приложение 4

Справочный раздел Предельно-допустимые концентрации (ПДК) загрязняющих веществ в воздухе населенных мест

Наименование примесей	Значения ПДК, мг/м ³		Класс опасности
	максимально разовая	средне-суточная	
Азота диоксид	0,2	0,04	2
Азота оксид	0,4	0,06	3
Аммиак	0,2	0,04	4
Бенз/a/пирен	-	0,1 мкг/100 м ³	1
Бензол	0,3	0,1	2
Бериллий	0,09	0,00001	1
Взвешенные вещества (частицы)	0,5	0,15	3
Взвешенные частицы PM 10	0,3	0,06	
Взвешенные частицы PM 2,5	0,16	0,035	
Хлористый водород	0,2	0,1	2
Кадмий	-	0,0003	1
Кобальт	-	0,001	2
Марганец	0,01	0,001	2
Медь	-	0,002	2
Мышьяк	-	0,0003	2
Озон	0,16	0,03	1
Свинец	0,001	0,0003	1
Диоксид серы	0,5	0,05	3
Серная кислота	0,3	0,1	2
Сероводород	0,008	-	2
Оксид углерода	5,0	3	4
Фенол	0,01	0,003	2
Формальдегид	0,05	0,01	2
Фтористый водород	0,02	0,005	2
Хлор	0,1	0,03	2
Хром (VI)	-	0,0015	1
Цинк	-	0,05	3

«Гигиенический норматив к атмосферному воздуху в городских и сельских населенных пунктах»
(СанПин №КР ДСМ-70 от 2 августа 2022 года)

Оценка степени индекса загрязнения атмосферы

Градации	Загрязнение атмосферного воздуха	Показатели	Оценка за месяц
I	Низкое	СИ НП, %	0-1 0
II	Повышенное	СИ НП, %	2-4 1-19
III	Высокое	СИ НП, %	5-10 20-49
IV	Очень высокое	СИ НП, %	>10 >50

РД 52.04.667–2005, Документы состояния загрязнения атмосферы в городах для информирования государственных органов, общественности и населения. Общие требования к разработке построению, изложению и содержанию

**ФИЛИАЛ РГП «КАЗГИДРОМЕТ»
ПО АТЫРАУСКОЙ ОБЛАСТИ
АДРЕС:
ГОРОД АТЫРАУ
УЛ. ТАЛГАТА БИГЕЛЬДИНОВА 10А
ТЕЛ. 8-(7122)-52-20-96**

E MAIL:INFO_ATR@METEO.KZ