

Информационный бюллетень о состоянии окружающей среды Актюбинской области

Апрель 2023 год



Филиал РГП «Казгидромет» по Актюбинской области

ресурсов

	СОДЕРЖАНИЕ	Стр.
1	Предисловие	3
2	Основные источники загрязнения атмосферного воздуха	4
3	Состояние качества атмосферного воздуха	4
4	Состояние качества поверхностных вод	11
5	Радиационная обстановка	12
6	Химический состав атмосферных осадков	12
7	Состояние загрязнения почв тяжелыми металлами	13
8	Приложение 1	13
9	Приложение 2	17
10	Приложение 3	20
11	Приложение 4	21

Предисловие

Информационный бюллетень подготовлен по результатам работ, выполняемых Филиалом РГП «Казгидромет» по Актыбинской области.

Бюллетень предназначен для информирования государственных органов, общественности и населения о состоянии окружающей среды на территории Актыбинской области и необходим для дальнейшей оценки эффективности мероприятий в области охраны окружающей среды РК с учетом тенденции происходящих изменений уровня загрязнения.

Оценка качества атмосферного воздуха

1. Основные источники загрязнения атмосферного воздуха

Загрязнение воздушного бассейна области обусловлено в основном крупными предприятиями: АО «СНПС-Актобемунайгаз», ТОО «КазахойлАктобе», Актюбинский завод ферросплавов и ДГОК филиалы АО «ТНК «Казхром», АО «Интергаз Центральная Азия», УМГ «Актобе», АО «Актобе ТЭЦ». Из общего объема выбросов от стационарных источников доля выбросов от сжигания попутного газа на факелах составляет 11,67 тыс. тонн 97% всех выбросов от факельных установок приходится на 3 нефтегазодобывающие и перерабатывающие предприятия: АО «СНПС-Актобемунайгаз», ТОО «КазахойлАктобе» и ТОО «Аман Мунай».

Кроме этого, одними из основных загрязнителей атмосферного воздуха Актюбинской области являются выхлопные газы от передвижных источников.

2. Мониторинг качества атмосферного воздуха в г. Актобе.

Наблюдения за состоянием атмосферного воздуха на территории г. Актобе проводятся на 6 постах наблюдения, в том числе на 3 постах ручного отбора проб и на 3 автоматических станциях (Приложение 1).

В целом по городу определяется до 10 показателей: 1) взвешенные частицы (пыль); 2) взвешенные частицы РМ-2,5; 3) взвешенные частицы РМ-10; 4) диоксид серы; 5) оксид углерода; 6) диоксид азота; 7) оксид азота; 8) сероводород; 9) формальдегид; 10) хром.

В таблице 1 представлена информация о местах расположения постов наблюдений и перечне определяемых показателей на каждом посту.

Таблица 1

Место расположения постов наблюдений и определяемые примеси

№	Отбор проб	Адрес поста	Определяемые примеси
1	ручной отбор проб	Авиагородок 14, район аэропорта	взвешенные частицы (пыль), диоксид серы, оксид углерода, оксид азота, диоксид азота, формальдегид, хром, сероводород.
2		ул. Белинский 5, район Жилгородка	
3		ул. Ломоносова 7, район ЖД вокзала	
4	в непрерывном режиме – каждые 20 минут	ул. Рыскулова 4, район Шанхай	взвешенные частицы РМ-2,5, взвешенные частицы РМ-10, диоксид серы, оксид углерода, диоксид азота, оксид азота, сероводород
5		ул. Есет батыра 109	
6		ул. Жанкожа батыра 89, район Курмыш	

Помимо стационарных постов наблюдений в городе Актобе действует передвижная лаборатория, с помощью которой измерение качества воздуха проводится дополнительно по 3 точкам области по 8 показателям: 1) взвешенные

частицы РМ-10; 2) диоксид серы; 3) оксид углерода; 4) диоксид азота; 5) оксид азота; 6) сероводород; 7) аммиак; 8) формальдегид.

Результаты мониторинга качества атмосферного воздуха в г. Актобе за апрель 2023 года.

Уровень загрязнения атмосферного воздуха оценивался как **высокий**, он определялся значением СИ=6,9 (высокий уровень) и НП=2% (повышенный уровень) по сероводороду в районе поста №3.

**Согласно РД 52.04.667-2005, если СИ и НП попадают в разные градации, то степень загрязнения атмосферы оценивается по наибольшему значению из этих показателей.*

В загрязнение атмосферного воздуха основной вклад вносит сероводород (количество превышений ПДК за месяц: 70 случаев), оксид углерода (количество превышений ПДК за месяц: 2 случая).

Максимально-разовая концентрация сероводорода составила 6,9 ПДК_{м.р.}, оксид углерода – 1,1 ПДК_{м.р.}, концентрации остальных загрязняющих веществ не превышали ПДК.

Случаи высокого загрязнения (ВЗ) и экстремально высокого загрязнения (ЭВЗ) не обнаружены.

Фактические значения, а также кратность превышений нормативов качества и количество случаев превышения указаны в Таблице 2.

Таблица 2

Характеристика загрязнения атмосферного воздуха

Примесь	Средняя концентрация		Максимальная разовая концентрация		НП %	Число случаев превышения ПДК _{м.р.}		
	мг/м ³	Кратность ПДК _{с.с.}	мг/м ³	Кратность ПДК _{м.р.}		>ПДК	>5	>10
					ПДК		ПДК	
г. Актобе								
Взвешенные частицы (пыль)	0,01	0,08	0,10	0,20	0			
Взвешенные частицы РМ-2,5	0,001	0,04	0,002	0,01	0			
Взвешенные частицы РМ-10	0,002	0,03	0,002	0,01	0			
Диоксид серы	0,01	0,20	0,21	0,43	0			
Оксид углерода	0,49	0,16	5,57	1,1	0	2		
Диоксид азота	0,02	0,61	0,15	0,75	0			
Оксид азота	0,02	0,38	0,26	0,65	0			
Сероводород	0,001		0,06	6,9	2	70	1	
Формальдегид	0,004	0,38	0,01	0,14	0			
Хром	0,0004	0,28	0,001		0			

Мониторинг качества атмосферного воздуха в г. Хромтау.

Наблюдения за состоянием атмосферного воздуха на территории г. Хромтау проводятся на 1 посту наблюдения.

В целом по городу определяется до 6 показателей: 1) взвешенные частицы РМ-2,5; 2) взвешенные частицы РМ-10; 3) диоксид серы; 4) оксид углерода; 5) диоксид азота; 6) сероводород.

В таблице 3 представлена информация о месте расположения поста наблюдения.

Таблица 3

Место расположения постов наблюдений и определяемые примеси

№	Отбор проб	Адрес поста	Определяемые примеси
	в непрерывном режиме – каждые 20 минут	Ул. Горького 9	взвешенные частицы РМ-2,5, взвешенные частицы РМ-10, диоксид серы, оксид углерода, диоксид азота, сероводород

Результаты мониторинга качества атмосферного воздуха в г.Хромтау за апрель 2023 года.

Уровень загрязнения атмосферного воздуха оценивался как **повышенный**, он определялся значением СИ=1,9 (низкий уровень) и НП=1% (повышенный уровень) по диоксиду серы.

**Согласно РД 52.04.667-2005, если СИ и НП попадают в разные градации, то степень загрязнения атмосферы оценивается по наибольшему значению из этих показателей.*

В загрязнение атмосферного воздуха основной вклад вносит диоксид серы (количество превышений ПДК за месяц: 13 случаев).

Максимально-разовая концентрация диоксида серы – 1,9 ПДК_{м.р.}, концентрации остальных загрязняющих веществ не превышали ПДК.

Случаи высокого загрязнения (ВЗ) и экстремально высокого загрязнения (ЭВЗ) не обнаружены.

Фактические значения, а также кратность превышений нормативов качества и количество случаев превышения указаны в Таблице 4.

Таблица 4

Характеристика загрязнения атмосферного воздуха

Примесь	Средняя концентрация		Максимальная разовая концентрация		НП	Число случаев превышения ПДК _{м.р.}		
	мг/м ³	Кратность ПДК _{с.с.}	мг/м ³	Кратность ПДК _{м.р.}		%	>ПДК	>5
					ПДК			ПДК
г. Хромтау								
Диоксид серы	0,03	0,61	0,94	1,9	1	13		
Оксид углерода	0,001	0,0005	0,67	0,13	0			
Диоксид азота	0,01	0,15	0,07	0,33	0			
Сероводород	0,001		0,001	0,13	0			

Мониторинг качества атмосферного воздуха в г. Кандыагаш.

Наблюдения за состоянием атмосферного воздуха на территории г. Кандыагаш проводятся на 1 посту наблюдения.

По городу определяется 6 показателей: 1) взвешенные частицы РМ-2,5; 2) взвешенные частицы РМ-10; 3) диоксид серы; 4) оксид углерода; 5) диоксид азота; 6) сероводород.

В таблице 5 представлена информация о месте расположения поста наблюдения.

Таблица 5

Место расположения постов наблюдений и определяемые примеси

№	Отбор проб	Адрес поста	Определяемые примеси
	в непрерывном режиме – каждые 20 минут	Ул. Жабаяева 64А	взвешенные частицы РМ-2,5, взвешенные частицы РМ-10, диоксид серы, оксид углерода, диоксид азота, сероводород

Результаты мониторинга качества атмосферного воздуха в г.Кандыагаш за апрель 2023 года.

Уровень загрязнения атмосферного воздуха оценивался как **повышенный**, он определялся значением СИ=3,5 (повышенный уровень) и НП=3% (повышенный уровень) по сероводороду.

Максимально-разовая концентрация диоксида серы – 3,0 ПДК_{м.р.}, диоксид азота – 1,3 ПДК_{м.р.}, сероводорода – 3,5 ПДК_{м.р.}, концентрации остальных загрязняющих веществ не превышали ПДК.

Среднесуточная концентрация диоксида азота – 3,5 ПДК_{с.с.}.

Случаи высокого загрязнения (ВЗ) и экстремально высокого загрязнения (ЭВЗ) не обнаружены.

Фактические значения, а также кратность превышений нормативов качества и количество случаев превышения указаны в Таблице 6.

Таблица 6

Характеристика загрязнения атмосферного воздуха

Примесь	Средняя концентрация		Максимальная разовая концентрация		НП %	Число случаев превышения ПДК _{м.р.}		
	мг/м ³	Кратность ПДК _{с.с.}	мг/м ³	Кратность ПДК _{м.р.}		>ПДК	>5	>10
					ПДК		ПДК	
г. Кандыагаш								
Диоксид серы	0,02	0,34	1,49	3,0	1	18		
Оксид углерода	0,04	0,01	2,44	0,49	0			
Диоксид азота	0,14	3,5	0,26	1,3	3	56		
Сероводород	0,002		0,03	3,5	3	72		

Мониторинг качества атмосферного воздуха в п.Шубарши

Наблюдения за состоянием атмосферного воздуха на территории п.Шубарши проводятся на 1 посту наблюдения.

На точке наблюдения определяется 6 показателей: 1) взвешенные частицы РМ-2,5; 2) взвешенные частицы РМ-10; 3) диоксид серы; 4) оксид углерода; 5) диоксид азота; 6) сероводород.

В таблице 7 представлена информация о месте расположения поста наблюдения.

Таблица 7

Место расположения постов наблюдений и определяемые примеси

№	Отбор проб	Адрес поста	Определяемые примеси
	в непрерывном режиме – каждые 20 минут	ул.Геолог 25Д	взвешенные частицы РМ-2,5, взвешенные частицы РМ-10, диоксид серы, оксид углерода, диоксид азота, сероводород

Результаты мониторинга качества атмосферного воздуха в п.Шубарши за апрель 2023 года.

Уровень загрязнения атмосферного воздуха оценивался как **повышенный**, он определялся значением СИ=4,0 (повышенный уровень) оксиду углерода и НП=1% (повышенный уровень) по диоксиду азота.

Максимально-разовая концентрация диоксида азота – 1,2 ПДК_{м.р.}, оксида углерода – 4,0 ПДК_{м.р.}, сероводорода – 1,1 ПДК_{м.р.}, концентрации остальных загрязняющих веществ не превышали ПДК.

Среднесуточная концентрация диоксида азота – 2,8 ПДК_{с.с.}

Случаи высокого загрязнения (ВЗ) и экстремально высокого загрязнения (ЭВЗ) не обнаружены.

Фактические значения, а также кратность превышений нормативов качества и количество случаев превышения указаны в Таблице 8.

Таблица 8

Характеристика загрязнения атмосферного воздуха

Примесь	Средняя концентрация		Максимальная разовая концентрация		НП %	Число случаев превышения ПДК _{м.р.}		
	мг/м ³	Кратность ПДК _{с.с.}	мг/м ³	Кратность ПДК _{м.р.}		>ПДК	>5	>10
					ПДК		ПДК	
п.Шубарши								
Диоксид серы	0,002	0,04	0,16	0,32	0			
Оксид углерода	0,52	0,17	19,78	4,0	0	3		
Диоксид азота	0,11	2,8	0,23	1,2	1	11		
Сероводород	0,002		0,01	1,1	0	1		

Мониторинг качества атмосферного воздуха в п.Кенкияк

Наблюдения за состоянием атмосферного воздуха на территории п.Кенкияк проводятся на 1 посту наблюдения.

Наточке наблюдения определяется 6 показателей: 1) взвешенные частицы РМ-2,5; 2) взвешенные частицы РМ-10; 3) диоксид серы; 4) оксид углерода; 5) диоксид азота; 6) сероводород.

В таблице 9 представлена информация о месте расположения поста наблюдения.

Таблица 9

Место расположения постов наблюдений и определяемые примеси

№	Отбор проб	Адрес поста	Определяемые примеси
	в непрерывном режиме – каждые 20 минут	ул. Алтынсарина 11 Б	взвешенные частицы РМ-2,5, взвешенные частицы РМ-10, диоксид серы, оксид углерода, диоксид азота, сероводород

Результаты мониторинга качества атмосферного воздуха в п.Кенкияк за апрель 2023 года.

Уровень загрязнения атмосферного воздуха оценивался как **высокий**, он определялся значением СИ=1,7 (низкий уровень) и НП=24% (высокий уровень) по диоксиду азота.

**Согласно РД 52.04.667-2005, если СИ и НП попадают в разные градации, то степень загрязнения атмосферы оценивается по наибольшему значению из этих показателей.*

Максимально-разовая концентрация диоксида азота составила 1,6 ПДК_{м.р.}, сероводорода – 1,7 ПДК_{м.р.}, концентрации остальных загрязняющих веществ не превышали ПДК.

Среднесуточная концентрация диоксид азота – 4,5 ПДК_{с.с.}

Случаи высокого загрязнения (ВЗ) и экстремально высокого загрязнения (ЭВЗ) не обнаружены.

Фактические значения, а также кратность превышений нормативов качества и количество случаев превышения указаны в Таблице 10.

Таблица 10

Характеристика загрязнения атмосферного воздуха


Примесь	Средняя концентрация		Максимальная разовая концентрация		НП	Число случаев превышения ПДК _{м.р.}		
	мг/м ³	Кратность ПДК _{с.с.}	мг/м ³	Кратность ПДК _{м.р.}		%	>ПДК	>5
					ПДК			ПДК
п. Кенкияк								
Диоксид серы	0,01	0,19	0,06	0,11	0			
Оксид углерода	0,02	0,01	1,73	0,35	0			
Диоксид азота	0,18	4,5	0,32	1,6	24	501		
Сероводород	0,004		0,01	1,7	3	59		

Результаты экспедиционных измерений качества атмосферного воздуха

Определяемые примеси	п.Кирпичный	
	Точка №1	
	мг/м ³	ПДК
Взвешенные частицы (PM-10)	0,0016	0,0053
Сероводород	0,0027	0,3375
Формальдегид	0,0095	0,1900
Оксид азота	0,0041	0,0103
Диоксид серы	0,0035	0,0070
Диоксид азота	0,0055	0,0275
Оксид углерода	2,0514	0,4103

Выводы:

За последние пять лет уровень загрязнения атмосферного воздуха за апрель



Как видно из графика, за март 2019-2020 гг. и в 2023 году уровень загрязнения оценивался как высокий уровень, в 2021 году повышенный уровень, а в 2022 годы очень высокий уровень загрязнения. Основной вклад в загрязнение атмосферного воздуха вносит сероводород.

Метеоусловия

Большую часть месяца город находился под влиянием антициклонов, наблюдалась погода без осадков. С прохождением атмосферных фронтов в середине второй декады выпадали осадки, в начале третьей декады небольшой дождь. В отдельные дни наблюдалось усиление ветра 15-18 м/с.

3. Мониторинг качества поверхностных вод на территории Актюбинской области

Наблюдения за качеством поверхностных вод по Актюбинской области проводились на 18 створах 11 водных объектов (реки Елек, Каргалы, Эмба, Темир, Орь, Актасты, Косестек, Ойыл, Улькен Кобда, Кара Кобда, Ыргыз).

При изучении поверхностных вод в отбираемых пробах воды определяются 42 физико-химических показателей качества: *температура, взвешенные вещества, прозрачность, водородный показатель (рН), растворенный кислород, БПК₅, ХПК, главные ионы солевого состава, биогенные элементы, органические вещества (нефтепродукты, фенолы), тяжелые металлы.*

Результаты мониторинга качества поверхностных вод на территории Актюбинской области

Основным нормативным документом для оценки качества воды водных объектов Республики Казахстан является «Единая система классификации качества воды в водных объектах» (далее – Единая Классификация).

По Единой классификации качество воды оценивается следующим образом:

Таблица 3

	Класс качества воды		Параметры	ед. изм.	концентрация
	Апрель 2022 г.	Апрель 2023 г.			
р. Елек	5-класс	4 класс	Аммоний-ион	мг/дм ³	1,231
			Фенолы*	мг/дм ³	0,0017
			Хром (6+)*	мг/дм ³	0,085
р. Каргалы	4-класс	4 класс	Аммоний-ион	мг/дм ³	1,055
			Фенолы*	мг/дм ³	0,0018
р. Эмба	4-класс	4 класс	Аммоний-ион	мг/дм ³	1,518
			Фенолы*	мг/дм ³	0,002
р. Темир	5-класс	4 класс	Аммоний-ион	мг/дм ³	1,327
			Фенолы*	мг/дм ³	0,002
р. Орь	4-класс	4 класс	Аммоний-ион	мг/дм ³	1,49
			Магний	мг/дм ³	32
			Фенолы*	мг/дм ³	0,0019
р. Актасты	4-класс	4 класс	Аммоний-ион	мг/дм ³	1,48
			Фенолы*	мг/дм ³	0,002
р. Косестек	5-класс	4 класс	Аммоний-ион	мг/дм ³	1,245
			Магний	мг/дм ³	31
			Фенолы*	мг/дм ³	0,0017
р. Ойыл	4-класс	4 класс	Аммоний-ион	мг/дм ³	1,19
			Фенолы*	мг/дм ³	0,0019
р. Улькен Кобда	4-класс	4 класс	Аммоний-ион	мг/дм ³	1,535
			Фенолы*	мг/дм ³	0,0018
р. Кара Кобда	5-класс	4 класс	Аммоний-ион	мг/дм ³	1,44
			Фенолы*	мг/дм ³	0,0017
			Взвешенные вещества	мг/дм ³	10,83
р. Ыргыз	4 класс	4 класс	Аммоний-ион	мг/дм ³	1,21

			Фенолы*	мг/дм ³	0,0016
--	--	--	---------	--------------------	--------

* - вещества для данного класса не нормируются

Как видно из таблицы, в сравнении с апрелем 2022 года качество поверхностных вод в реках Елек, Косестек, Кара Кобда, Темир перешло с 5 класса в 4 класс – улучшилось.

Качество поверхностных вод в реках Орь, Эмба, Актасты, Улькен Кобда, Ойыл, Ыргыз, Каргалы существенно не изменилось.

Основными загрязняющими веществами в водных объектах Актыбинской области являются магний, аммоний-ион, взвешанные вещества, фенолы.

За апрель 2023 года на территории Актыбинской области в реке Елек обнаружено 2 случая ВЗ .

Информация по качеству водных объектов в разрезе створов указана в Приложении 2.

4. Радиационная обстановка

Наблюдения за уровнем гамма-излучения на местности осуществлялись ежедневно на 7 метеорологических станциях (Актобе, Караул-Кельды, Новоалексеевка, Родниковка, Уил, Шалкар, Жагабулак).

Средние значения радиационного гамма-фона приземного слоя атмосферы в Актыбинской области находились в пределах 0,05–0,20 мкЗв/ч (норматив–до 5 мкЗв/ч). В среднем по области радиационный гамма-фон составил 0,11 мкЗв/ч.

Наблюдение за радиоактивным загрязнением приземного слоя атмосферы на территории Актыбинской области проводилась на метеостанциях Актобе, Караул-Кельды, Шалкар путем пятисуточного отбора проб воздуха горизонтальными планшетами.

Среднесуточная плотность радиоактивных выпадений в приземном слое атмосферы Актыбинской области колебалась в пределах 1,5–2,2 Бк/м². Средняя величина плотности выпадений составила 1,8 Бк/м², что не превышает предельно-допустимый уровень.

5. Химический состав атмосферных осадков на территории Актыбинской области

Наблюдения за химическим составом атмосферных осадков заключались в отборе проб дождевой воды на 6 метеостанциях (Актобе, Аяккум, Жагабулак, Мугоджарская, Новороссийское, Шалкар). Концентрации всех определяемых загрязняющих веществ, в осадках не превышают предельно допустимые концентрации (ПДК).

В пробах осадков преобладало содержание сульфатов 19,48%, гидрокарбонатов 30,9%, хлоридов 18,5%, ионов кальция 9,9 %, ионов натрия 10,9%, ионов магния 2,5% и ионов калия 5,0 %.

Наибольшая общая минерализация отмечена на МС Аяккум – 257,3 мг/л, наименьшая – 24,01 мг/л на МС Жагабулак.

Удельная электропроводимость атмосферных осадков находилась в пределах от 43 мкСм/см (МС Новороссийское) до 440 мкСм/см (МС Аяккум).

Кислотность выпавших осадков имеет характер слабокислой и нейтральной и находится в пределах от 5,43 (МС Жагабулак) до 6,99 (МС Шалкар).


6. Состояние загрязнения почв тяжелыми металлами по Актыбинской области за весенний период 2023г

За весенний период в городе Актобе в пробах почв содержание цинка находилось в пределах - 1,8 - 2,2 мг/кг, меди - 0,22 - 0,34 мг/кг, хрома - 0,06 - 0,1 мг/кг, свинца - 0,07 - 0,12 мг/кг, кадмия - 0,09 - 0,12 мг/кг.

В пробах почв отобранных в Актыбинской области на территории школы № 16, ул. Тургенева, район авиагородка, район Железнодорожного вокзала, район завода АЗФ содержание цинка находилось в пределах 0,078 - 0,096 ПДК, содержание меди - 0,073 - 0,113 ПДК, хрома - 0,010 - 0,017 ПДК, свинца - 0,002 - 0,004 ПДК, кадмия - 0,174 - 0,240 ПДК.

Все определяемые тяжелые металлы находились в пределах нормы.

Приложение 1



Карта мест расположения постов наблюдения и метеостанции г. Актобе




Карта места расположения точки отбора п. Кирпичный, район СШ №18




Карта места расположения точки отбора п. Ясный, район школы-гимназии №41



Карта места расположения точки отбора на Батыс-2, район СШ №64



Карта места расположения поста наблюдения г. Хромтау



Карта места расположения поста наблюдения п. Кенкияк

Приложение 2

Информация о качества поверхностных вод Актюбинской области по створам

Водный объект и створ	Характеристика физико-химических параметров	
река Елек	Температура воды отмечена в пределах 1 – 7°С, водородный показатель 7,63 – 8,5, концентрация растворенного в воде кислорода 6,19 – 14,68 мг/дм ³ , БПК ₅ 0,87 – 4,77 мг/дм ³ , прозрачность 17 – 20 см, запах 0 баллов.	
0,3 км выше города Алга, 1 км выше шламовых прудов Актюбинского хим. завода	4 класс	Аммоний-ион – 1,055 мг/дм ³ . Фенолы* – 0,0018 мг/дм ³ . Фактическая концентрация фенолов превышает фоновый класс. Фактическая концентрация аммоний-иона не превышает фоновый класс.
15 км ниже города Алга, 0,5 км ниже выхода подземных вод	4 класс	Аммоний-ион – 1,205 мг/дм ³ . Фенолы* – 0,00155 мг/дм ³ . Фактические концентрация аммоний-иона превышают фоновый класс. Фактическая концентрация фенолов не превышает фоновый класс.
0,5 км выше города Актобе, 8,0 км выше Новороссийского моста, 11,2 км выше впадения р.Карагалы	4 класс	Аммоний-ион – 1,33 мг/дм ³ . Магний – 32 мг/дм ³ Фенолы* – 0,00135 мг/дм ³ . Фактическая концентрация аммоний-иона, магния и фенолов превышают фоновый класс.

4,5 км ниже города Актобе, 1,5 км ниже впадше р. Дженишке 0,5 км выше выхода подземных вод	4 класс	Аммоний-ион – 1,3 мг/дм ³ . Фенолы* – 0,00175 мг/дм ³ . Фактическая концентрация аммоний-иона и фенолов превышают фоновый класс.
20 км ниже города Актобе, 2,0 км ниже с. Георгиевка, 0,5 км ниже выхода подземных вод.	4 класс	Аммоний-ион – 1,205 мг/дм ³ . Фенолы* – 0,002 мг/дм ³ . Хром (6+)* – 0,0995 мг/дм ³ . Фактическая концентрация аммоний-иона, фенолов и хром(6+) превышают фоновый класс.
1,0 км на юго-восток п.Целинный, на левом берегу р. Елек.	4 класс	Аммоний-ион – 1,29 мг/дм ³ . Фенолы* – 0,0018 мг/дм ³ . Хром (6+)* – 0,070 мг/дм ³ . Фактическая концентрация аммоний-иона, фенолов и хром(6+) превышают фоновый класс.
река Каргалы	Температура воды отмечена 5 - 6 °С, водородный показатель 7,58 – 8 концентрация растворенного в воде кислорода 6,56 – 7,45 мг/дм ³ , БПК ₅ 1,58 – 4,47 мг/дм ³ , запах – 0 балл.	
п. Каргалинский, в западной части поселка в 1 км ниже впадения правого притока р. Бутак:	4 класс	Аммоний-ион – 1,055 мг/дм ³ . Фенолы* – 0,0018 мг/дм ³ . Фактическая концентрация аммоний-иона не превышает фоновый класс. Фактические концентрации фенолов превышают фоновый класс.
река Эмба	Температура воды отмечена в пределах 1 – 9°С, водородный показатель 7,89 – 8,16, концентрация растворенного в воде кислорода 8,56 – 10,07 мг/дм ³ , БПК ₅ 1,1 – 2,48 мг/дм ³ , запах – 0 балл.	
п. Жагабулак, 1,0 км на северо-запад отп. Жагабулак	4 класс	Аммоний-ион – 1,405 мг/дм ³ . Взвешенные вещества – 14,765 мг/дм ³ . Фенолы* – 0,002 мг/дм ³ . Фактическая концентрация аммоний-иона, взвешенных веществ и фенолов превышает фоновый класс.
створ п. Сага, 1,0 км к юго-западу от поселка	4 класс	Аммоний-ион – 1,63 мг/дм ³ . Фенолы* – 0,002 мг/дм ³ . Фактические концентрации аммоний-иона и фенолов превышают фоновый класс.
река Темир	Температура воды отмечена в пределах 1 – 8°С, водородный показатель 7,8 – 8,16, концентрация растворенного в воде кислорода 6,7 – 8,43 мг/дм ³ , БПК ₅ 1,19 – 1,7 мг/дм ³ , запах – 0 баллов во всех створах.	
створ с. Покровское, вс. Покровское, в 400 м ниже впадения левого притока р. Чилисай	4 класс	Аммоний-ион – 1,55 мг/дм ³ . Магний – 31 мг/дм ³ Фенолы* – 0,002 мг/дм ³ . Фактическая концентрация аммоний-иона, магния и фенолов превышают фоновый класс.

створ с. Ленинское, в 9 км ниже селения, в 2 км ниже устья левобережного притока р. Кульден-Темир	4 класс	Аммоний-ион – 1,105 мг/дм ³ . Фенолы* – 0,002 мг/дм ³ . Фактическая концентрация аммоний-иона превышает фоновый класс. Фактические концентрации фенолов не превышают фоновый класс.
река Орь	Температура воды 4 – 7°С, водородный показатель 8 – 8,1, концентрация растворенного в воде кислорода 7,97 – 11,58 мг/дм ³ , БПК ₅ 0,85 – 2,09 мг/дм ³ , прозрачность 18-19 см, запах 0 балл.	
створ с. Бугетсай, 0,3 км ниже села, 0,2 км ниже впадения р. Богетсай	4 класс	Аммоний-ион – 1,49 мг/дм ³ . Магний – 32 мг/дм ³ . Фенолы* – 0,0019 мг/дм ³ . Фактические концентрации аммоний-иона, магний превышают фоновый класс. Фактические концентрации фенолов не превышают фоновый класс.
река Косестек	Температура воды отмечена в пределах 5 – 6°С, водородный показатель 8 - 8,05, концентрация растворенного в воде кислорода 6,47 – 8,1 мг/дм ³ , БПК ₅ 1,22 – 4,39 мг/дм ³ , запах – 0 балл	
п. Кос-Естек, в юго-западной части села примерно в 1 км выше устья левого притока без названия, в 2 км ниже слияния рек Тарангул и Айтпайка	4 класс	Аммоний-ион – 1,245 мг/дм ³ . Магний – 31 мг/дм ³ . Фенолы* – 0,0017 мг/дм ³ . Фактические концентрации аммоний-иона, магний и фенолов превышают фоновый класс.
река Актасты	Температура воды отмечена в пределах 5 – 6°С, водородный показатель 8 - 8,04, концентрация растворенного в воде кислорода 4,91 – 11,4 мг/дм ³ , БПК ₅ 1,83 – 1,62 мг/дм ³ , запах – 0 балл.	
п. Белогорка, на северо-восточной окраине поселка, в 9 км ниже слияния притоков Тересбутак и Теренсай, составляющих Актасты	4 класс	Аммоний-ион – 1,48 мг/дм ³ . Фенолы* – 0,002 мг/дм ³ . Фактическая концентрация фенолов превышает фоновый класс. Фактическая концентрация аммоний-иона не превышает фоновый класс
река Ойыл	Температура воды отмечена в пределах 3 - 12°С, водородный показатель 7,89, концентрация растворенного в воде кислорода 9,06 – 11,9 мг/дм ³ , БПК ₅ 2,33 – 2,46 мг/дм ³ , запах – 0 балл.	
п. Уил, на северо-восточной окраине поселка в 92 м выше автодорожного мост	4 класс	Аммоний-ион – 1,19 мг/дм ³ . Фенолы* – 0,0019 мг/дм ³ . Фактическая концентрация аммоний-иона и фенолов превышает фоновый класс.
река Улькен Кобда	Температура воды отмечена в пределах 3,5 – 15 °С, водородный показатель 8,05 , концентрация растворенного в воде кислорода 9,06– 10,88 мг/дм ³ , БПК ₅ – 2,44 – 3,52 мг/дм ³ , прозрачность – 20-17 см, запах – 0 балл	
п. Кобда, 1 км к юго-востоку от окраины с. Новоалексеевка,	4 класс	Аммоний-ион – 1,535 мг/дм ³ . Фенолы* – 0,0018 мг/дм ³ .

в 400 м ниже железобетонного автодорожного моста		Фактическая концентрация аммоний-иона и фенолов превышает фоновый класс.
река Кара Кобда	Температура воды отмечена в пределах 2 - 13 °С, водородный показатель 8 - 8,01, концентрация растворенного в воде кислорода 8,66 - 8,89 мг/дм ³ , БПК ₅ 1,23 – 3,16 мг/дм ³ , запах – 0 балл	
п. Альпасай, 360 м к востоку от поселка Альпасай и в 18 км от слияния с рекой Сары - Хобда	4 класс	Аммоний-ион – 1,44 мг/дм ³ . Взвешенные вещества-10,83 мг/дм ³ . Фенолы* – 0,0017 мг/дм ³ . Фактическая концентрация аммоний-иона, взвешенных веществ и фенолов превышает фоновый класс.
река Ыргыз	Температура воды отмечена в пределах 5 - 9 °С, водородный показатель 8, концентрация растворенного в воде кислорода 9,16 – 11,7 мг/дм ³ , БПК ₅ 2,14 – 2,8 мг/дм ³ , запах – 0 балл	
с. Шенбертал, в 8 км от селения и в 1,2 км от железобетонного моста	4 класс	Аммоний-ион – 1,21 мг/дм ³ . Фенолы* – 0,0016 мг/дм ³ . Фактическая концентрация фенолов превышает фоновый класс. Фактическая концентрация аммоний-иона не превышает фоновый класс.

* - вещества для данного класса не нормируются

Приложение 3

Результаты качества поверхностных вод озер на территории Актюбинской области

	Наименование ингредиентов	Единицы измерения	октябрь 2021
			озеро Шалкар
1	Визуальные наблюдения		
2	Температура	°С	4,8
3	Водородный показатель		8,15
4	Растворенный кислород	мг/дм ³	8,15
5	Запах воды	балл	2
6	БПК ₅	мг/дм ³	0,72
7	ХПК	мг/дм ³	23,35
8	Взвешенные вещества	мг/дм ³	24,66
9	Гидрокарбонаты	мг/дм ³	290
10	Жесткость	мг/дм ³	3,74
11	Минерализация	мг/дм ³	883
12	Натрий + калий	мг/дм ³	223
13	Сухой остаток	мг/дм ³	1500
14	Кальций	мг/дм ³	38
15	Магний	мг/дм ³	22
16	Сульфаты	мг/дм ³	60
17	Хлориды	мг/дм ³	250

18	Фосфат	мг/дм ³	0,021
19	Фосфор общий	мг/дм ³	0,024
20	Азот нитритный	мг/дм ³	0,082
21	Азот нитратный	мг/дм ³	0,019
22	Железо общее	мг/дм ³	0,016
23	Аммоний солевой	мг/дм ³	2,30
24	Свинец	мг/дм ³	0,007
25	Медь	мг/дм ³	0,009
26	Цинк	мг/дм ³	0,013
27	АП АВ /СП АВ	мг/дм ³	0,02
28	Фенолы	мг/дм ³	0,003
29	Нефтепродукты	мг/дм ³	0,01

Приложение 4

Справочный раздел

Предельно-допустимые концентрации (ПДК) загрязняющих веществ в воздухе населенных мест

Наименование примесей	Значения ПДК, мг/м ³		Класс опасности
	максимально разовая	средне-суточная	
Азота диоксид	0,2	0,04	2
Азота оксид	0,4	0,06	3
Аммиак	0,2	0,04	4
Бенз/а/пирен	-	0,1 мкг/100 м ³	1
Бензол	0,3	0,1	2
Бериллий	0,09	0,00001	1
Взвешенные вещества (частицы)	0,5	0,15	3
Взвешенные частицы РМ 10	0,3	0,06	
Взвешенные частицы РМ 2,5	0,16	0,035	
Хлористый водород	0,2	0,1	2
Кадмий	-	0,0003	1
Кобальт	-	0,001	2
Марганец	0,01	0,001	2
Медь	-	0,002	2
Мышьяк	-	0,0003	2
Озон	0,16	0,03	1
Свинец	0,001	0,0003	1
Диоксид серы	0,5	0,05	3
Серная кислота	0,3	0,1	2
Сероводород	0,008	-	2
Оксид углерода	5,0	3	4
Фенол	0,01	0,003	2
Формальдегид	0,05	0,01	2
Фтористый водород	0,02	0,005	2
Хлор	0,1	0,03	2
Хром (VI)	-	0,0015	1

Цинк	-	0,05	3
------	---	------	---

Приказ Министра здравоохранения Республики Казахстан от 2 августа 2022 года №КР ДСМ-70. Зарегистрирован в Министерстве юстиции Республики Казахстан 3 августа 2022 года № 29011.

Оценка степени индекса загрязнения атмосферы

Градации	Загрязнение	Показатели	Оценка за месяц
I	Низкое	СИ НП, % ИЗА	0-1 0 0-4
II	Повышенное	СИ НП, % ИЗА	2-4 1-19 5-6
III	Высокое	СИ НП, % ИЗА	5-10 20-49 7-13
IV	Очень высокое	СИ НП, % ИЗА	>10 >50 >14

РД 52.04.667–2005, Документы состояния загрязнения атмосферы в городах для информирования государственных органов, общественности и населения. Общие требования к разработке, постороению, изложению и содержанию

Дифференциация классов водопользования по категориям (видам) ВОДОПОЛЬЗОВАНИЯ

Категория (вид) водопользования	Назначение/тип очистки	Классы водопользования				
		1 класс	2 класс	3 класс	4 класс	5 класс
Рыбохозяйственное водопользование	Лососевые	+	+	-	-	-
	Карповые	+	+	-	-	-
Хозяйственно-питьевое водопользование	Простая водоподготовка	+	+	-	-	-
	Обычная водоподготовка	+	+	+	-	-
	Интенсивная водоподготовка	+	+	+	+	-
Рекреационное водопользование (культурно-бытовое)		+	+	+	-	-
Орошение	Без подготовки	+	+	+	+	-
	Отстаивание в картах	+	+	+	+	+
Промышленность:						
технологические цели, процессы охлаждения		+	+	+	+	-
гидроэнергетика		+	+	+	+	+
добыча полезных ископаемых		+	+	+	+	+
транспорт		+	+	+	+	+

Норматив радиационной безопасности*

Нормируемые величины	Пределы доз
Эффективная доза	Население
	1 мЗв в год в среднем за любые последовательные 5 лет, но не более 5 мЗв в год

*«Санитарно-эпидемиологические требования к обеспечению радиационной безопасности»

Нормативы предельно допустимых концентраций вредных веществ, загрязняющих почву

Наименование вещества	Предельно-допустимая концентрация (далее-ПДК) мг/кг в почве
Свинец(валовая форма)	32,0
Медь (подвижная форма)	3,0
Медь (валовая форма)	33
Хром(подвижная форма)	6,0
Хром ⁺⁶	0,05
Марганец (валовая форма)	1500
Никель (подвижная форма)	4,0
Цинк (подвижная форма)	23,0
Мышьяк (валовая форма)	2,0

*Совместный приказ Министерства здравоохранения РК от 30.01.2004 г. №99 и Министерства охраны окружающей среды РК от 27.01.2004 г. №21-п

ФИЛИАЛ РГП «КАЗГИДРОМЕТ» ПО АКТЮБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

АДРЕС:

ГОРОД АКТОБЕ
УЛ. АВИАГОРОДОК 14 В
ТЕЛ. 8-(7132)-22-85-72.

E MAIL:HIMLABACGM@MAIL.RU