

# 2023 жылғы сәуір айының Шымкент қаласы мен Түркістан облысының қоршаған орта жай-күйі жөніндегі ақпараттық бюллетені



Қазақстан Республикасының  
Экология, геология және табиги ресурстар Министрлігі<sup>1</sup>  
"Казгидромет" РМК  
Түркістан облысы бойынша филиалы  
Шымкент қ., Жылқышев көш., 44  
[imbzps\\_iko@meteo.kz](mailto:imbzps_iko@meteo.kz)

	<b>Мазмұны</b>	<b>Стр.</b>
	<b>Алғы сөз</b>	3
<b>1</b>	Атмосфералық ауаны ластаудың негізгі көздері	4
<b>2</b>	Атмосфералық ауа сапасының жай-күйі	4
<b>3</b>	Атмосфералық жауын-шашын сапасының жай-күйі	8
<b>4</b>	Жер үсті сулар сапасының мониторингі	13
<b>5</b>	Жер үсті сулары бойынша мониторинг нәтижелері.	14
<b>6</b>	Су обьектілерінің түптік шөгінділерінің мониторинг нәтижелері	14
<b>7</b>	Түркістан облысындағы топырақтың ауыр металдармен ластану жай-күйі	16
<b>8</b>	Радиациялық жағдай	17
<b>9</b>	<b>Қосымша 1</b>	18
<b>10</b>	<b>Қосымша 2</b>	22
<b>11</b>	<b>Қосымша 3</b>	24
<b>12</b>	<b>Қосымша 4</b>	24
<b>13</b>	<b>Қосымша 5</b>	26

## **АЛҒЫ СӨЗ**

Ақпараттық бюллетені “Қазгидромет” РМК мамандандырылған бөлімшелері Ұлттық гидрометеорологиялық қызметтің бақылау желісіндегі қоршаган ортаның жай-күйін бақылау бойынша жүргізген жұмыс нәтижелері бойынша дайындалды.

Бюллетені мемлекеттік органдарды, қоғамды және халықты Түркістан облысының аумағындағы қоршаган ортаның жай-күйі туралы хабарлауға арналған және Қазақстан Республикасының қоршаган ортаны қорғау саласындағы іс-шаралардың тиімділігін одан әрі бағалау үшін қажет ластану деңгейінің үздіксіз өзгеру тенденциясын ескеру.

## **Түркістан облысының атмосфералық ауасының сапасын бағалау. Атмосфералық ауаны ластаудың негізгі көздері**

Шымкент қаласы бойынша статистикалық мәліметтерге сәйкес ластаушы заттар шығарындыларының стационарлық көздерінің саны 5166 бірлікті құрайды, 2019 жылы нақты шығарындылардың көлемі жылына 29793,5 тоннаны құрады, ал рұқсат етілген көлемі жылына 59420,8 тонна.

Шымкентте көгілдір отынмен қамтылмаған 14716 үй бар. Түркістан облысы статистика департаментінің деректеріне сәйкес Түркістан қаласында 72123 жеке үй бар. Түркістан облысы статистика департаментінің деректеріне сәйкес Кентау қаласында 68669 жеке үй бар.

2020 жылдың қараша айындағы жағдай бойынша Шымкент қаласында 2510510 көлік бар. Оның ішінде : жеңіл автокөліктер 206292 бірлік және көлік құралдарының жалпы санының 90,4% құрайды, автобустар - 5623 бірлік, жүк машиналары 16087 бірлік 7,0 % және арнайы техника 304 бірлік 0,1% құрады, шығарындылардың жылдық есептік мөлшері 46778,9 тоннаны құрайды.

Зиянды шығарындылардың негізгі мөлшері жеңіл автокөліктердің үлесіне келеді жалпы санының 73,2%. Жүк көлігі 17,5%, автобустар 8,9% шығарады.

### **1.Шымкент қ. атмосфералық ауа сапасының жағдайы**

Аумақтағы атмосфералық ауаның жай-күйін бақылау 6 бақылау бекетінде, оның ішінде қолмен сынама алудың 4 постында және 2 автоматты станцияда жүргізіледі (қосымша-1).

Жалпы қала үшін 17-ға дейін көрсеткіштер анықталады: 1)қалқыма заттар(шан); 2)қалқыма бөлшектер PM-2.5; 3)қалқыма бөлшектер PM-10; 4)құкірт диоксиді; 5)көміртегі оксиді; 6)азот диоксиді; 7)азот оксиді; 8)формальдегид; 9)құкіртті сутек; 10)аммиак; 11)озон (жер беті); 12)бенз(a)тирен; 13)кадмий, 14) мыс; 15)қүшән; 16)қорғасын; 17) хром.

1-кестеде бақылау бекеттерінің орналасуы және әр бекетте анықталатын көрсеткіштер тізімі туралы ақпарат келтірілген. Атмосфералық ауаның жағдайын бақылау 6 стационарлық бекетте жүргізілді.

*Kesteme 1*

Бақылау бекеттерінің орналасқан жері және анықталатын қоспалар

№ бекет	Алу уақыты	Бақылау	Бекет мекен-жайлары	Анықталатын қоспалар
			Абай даңғылы, АО	қалқыма заттар (шан), құкірт диоксиді, көміртегі оксиді, азот диоксиді, аммиак, құкіртті сутек,

1			«Южполиметалл» АҚ	формальдегид, бенз(а)пирен Ауыр металлдар: кадмий, мыс, күшән, қорғасын, хром
2		Тәулігіне 3 рет	Ордабасы алаңы, Қазыбек би мен Төле би көш. өтеді	қалқыма заттар (шан), құқірт диоксиді, көміртегі оксиді, азот диоксиді, аммиак, құқіртті сутек, формальдегид, бенз(а)пирен Ауыр металлдар: кадмий, мыс, күшән, қорғасын, хром
3		Қолмен алу (дискретті әдістер)	Алдияров көш. нөмірсіз, АҚ «Шымкентцемент»	қалқыма заттар (шан), құқірт диоксиді, көміртегі оксиді, азот диоксиді, аммиак, құқіртті сутек, формальдегид, бенз(а)пирен Ауыр металлдар: кадмий, мыс, күшән, қорғасын, хром
8			Сайрам көш, 198, ЗАО «Пивзавод»	қалқыма заттар (шан), құқірт диоксиді, көміртегі оксиді, азот диоксиді, аммиак, құқіртті сутек, формальдегид, бенз(а)пирен Ауыр металлдар: кадмий, мыс, күшән, қорғасын, хром
5	Әр 20 мин сайын	Үздіксіз режимде	Самал-3 шағын ауданы	Қалқыма бөлшектер РМ 2,5 қалқыма бөлшектер РМ 10, азот диоксиді, азот оксиді, көміртегі оксиді, құқірт диоксиді, құқіртті сутек, аммиак, озон (жер беті)
6			Нұрсат шағын ауданы	Көміртегі оксиді, құқірт диоксиді, құқіртті сутек

### Шымкент қаласының 2023 жылғы сәуір айының ауа сапасын бақылау нәтижелері

Бақылау бекеттерінің мәліметтеріне сәйкес атмосфералық ауаның ластану деңгейі **көтеріңкі** болып бағаланды, ол **СИ= 1,7** (төмен деңгей) және **ЕЖК = 12%** (көтеріңкі деңгей) құқіртті суегі бойынша №5 бекет аумағында (Самал 3 ш.а.) анықталды..

Азот диоксидінің орташа концентрациясы – 1,52 ШЖШ<sub>о.т.</sub>, формальдегид – 1,71 ШЖШ<sub>о.т.</sub>, қалқыма бөлшектер -1,46ШЖШ<sub>о.т.</sub>.

Құқіртті суегінің максималды бір реттік концентрациясы - 1,71 ШЖШ<sub>м.р.</sub>, басқа ластаушы заттар ШЖШ-дан аспады (2-кесте) .

Экстремалды жоғары (ЭЖЛ) және жоғары ластану жағдайлары (ЖЛ және ЭЖЛ) : ЖЛ (10 ШЖШ-дан жоғары), ЭЖЛ (50 ШЖШ-дан жоғары) тіркелген жоқ.

Нақты мәндер, сондай-ақ сапа стандарттарынан асу жиілігі және асып кету жағдайларының саны 2 –кестеде көрсетілген.

## Атмосфералық ауаның ластануының сипаттамасы

Қоспа	Орташа концентрация		Максимальды бір реттік концентрация		ЕЖҚ %	Асу еселігінің саны ПДК <sub>м.р.</sub>			
	МГ/М <sup>3</sup>	Көптік ПДК <sub>с.с.</sub>	МГ/М <sup>3</sup>	Көптік ПДК <sub>с.с.</sub>		>ПДК %	>5 ПДК	>10 ПДК	
<b>Шымкент қаласы</b>									
Қалқыма бөлшектер (шан)	0,218	1,456	0,300	0,600	0,00	0			
Қалқыма бөлшектер PM-2,5	0,008	0,223	0,032	0,199	0,00	0			
Қалқыма бөлшектер PM-10	0,012	0,192	0,079	0,262	0,00	0			
Күкірт диоксиді	0,011	0,221	0,049	0,097	0,00	0			
Көміртегі оксиді	1,562	0,521	4,000	0,800	0,00	0			
Азот диоксиді	0,061	1,518	0,191	0,955	0,00	0			
Азот оксиді	0,021	0,348	0,111	0,278	0,00	0			
Озон (жербеті)	0,000	0,000	0,000	0,000	0,00	0			
Күкірттісугеңі	0,013		0,014	1,713	6,15	284			
Аммиак	0,018	0,457	0,0400	0,200	0,00	0			
Формальдегид	0,019	1,936	0,026	0,520	0,00	0			
Бенз(а)пирен	0,0003	0,26							
Кадмий	0,000010	0,033	0,000014						
Мыс	0,000023	0,012	0,000029						
Күшән	0,000011	0,004	0,000014						
Қорғасын	0,000019	0,064	0,000023						
Хром	0,000001	0,001	0,000002						

Корытынды:

Соңғы бес жылда ауаның ластану деңгейі келесідей өзгерді:



Шымкент қаласының атмосфералық ауасының ластану деңгейі кестеден көріп отырғанымыздай, 2019-2020 жылдары мен 2022-2023 жылдары көтерінкі деп, тек 2021 жылда төмен деп бағаланды.

Ең жоғары қайталану көрсеткішінің артуы негізінен күкірттісугеңінің есебінен байқалды.

## Метеорологиялық жағдайлар

Сәуір айында ауа ластануының қалыптасуына ауа-райының әсері байқалмады, ҚМЖ – мен күндер (қолайсыз метеорологиялық жағдайлар) тіркелген жоқ.

### 2. 2023 жылдың сәуір айына Қызылсай елді-мекеніндегі атмосфералық ауа сапасына жүргізілген мониторинг нәтижелері.

Жалпы елді-мекен бойынша 4 көрсеткішке дейін анықталады: 1) күкірт диоксиді; 2) көміртегі оксиді; 3) азот диоксиді; 4) озон.

З-кестеде бақылау бекетінің орналасқан жері және бекеттегі анықталатын көрсеткіштер тізбесі туралы ақпарат берілген.

*Кесте-3*

*Анықтайтын қоспалар мен бақылау жүргізетін бекеттердің орналасқан жері*

Бекеттің номірі	Сынама алу мерзімі	Бақылау жүргізу	Бекеттің мекен-жайы	Анықталатын қоспалар
1	әр 20 минут сайын	Үзіліссіз режимде	<i>Қызылсай елді-мекені, Омарташы, 1 көшесі.</i>	Күкірт диоксиді, көміртегі оксиді, азот диоксиді, озон.

Стационарлық бақылау желісінің деректері бойынша Қызылсай елді-мекенінің атмосфералық ауаның ластану деңгейі **төмен** деп бағаланды, ол СИ= **0,52** (төмен деңгей) және ЕЖҚ = **0,0%**(төмен деңгей).

Азот диоксидінің орташа концентрациясы-1,29 ШЖШ<sub>о.т.</sub>, озон-1,95 ШЖШ<sub>о.т.</sub>, басқа ластаушы заттардың ШЖШ - дан аспады.

Ластаушы заттардың максималды бір реттік концентрациясы ШЖШ-дан аспады (4-кесте).

Экстремалды жоғары (ЭЖЛ) және жоғары ластану жағдайлары (ЖЛ) : ЖЛ (10 ШЖШ-дан жоғары), ЭЖЛ (50 ШЖШ-дан жоғары) тіркелген жоқ.

Нақты мәндер, сондай-ақ сапа стандарттарынан асу жиілігі және асып кету жағдайларының саны 4 –кестеде көрсетілген.

*Кесте-4*

Атмосфералық ауаның ластануының сипаттамасы

Қоспа	Орташа концентрация		Максимальды бір реттік концентрация		ЕЖК	Асу еселігінің саны ПДК <sub>м.р.</sub>		
	МГ/М <sup>3</sup>	Көптік ПДК <sub>с.с.</sub>	МГ/М <sup>3</sup>	Көптік ПДК <sub>м.р.</sub>		%	>ПДК	>5 ПДК
	соның ішінде							
<b>Қызылсай</b>								
Күкірт диоксиді	0,001	0,02	0,010	0,02	0,00	0		
Көміртегі оксиді	0,568	0,19	1,378	0,28	0,00	0		
Азот диоксиді	0,052	1,29	0,104	0,52	0,00	0		
Озон	0,058	1,95	0,065	0,40	0,00	0		

### 3. Атмосфералық жауын-шашын сапасының жай-күйі

Атмосфералық жауын-шашынның химиялық құрамына бақылау 2 метеостанцияларда (Қазығұрт, Шымкент) алынған жаңбыр суына сынама алумен жүргізілді (14.4 сур.).

Жауын-шашын құрамында барлық анықталатын заттардың шоғырлары шекті рұқсат етілген шоғырлардан(ШЖШ) аспады.

Жауын-шашын сынамаларында гидрокарбонаттар 27,26%, сульфаттар 32,74%, кальций иондары 11,98%, натрий иондары 7,46 %, хлоридтер 11,15 % болды.

Ең үлкен жалпы минералдылығы Шымкент МС – 48,30 мг/л, ең азы Қазығұрт МС – 31,80 мг/л белгіленді.

Атмосфералық жауын-шашынның үлесті электрөткізгіштігі Қазығұрт МС – 52,3 мкСм/см, Шымкент МС – 87,0 мкСм/см болды.

Тұсken жауын-шашын қышқылдылығы 6,01 (Шымкент МС) - 6,33 (Қазығұрт МС) аралығында болды.

### 4. Түркістан қаласы бойынша атмосфералық ауа сапасын бағалау

Түркістан қаласының атмосфера ауасының жағдайын бақылау 1 автоматтық бекетте жүргізілді (қосымша1).

Жалпы қала бойынша 7 көрсеткішке дейін анықталады: 1) қалқыма бөлшектер (шан); 2) күкірт диоксиді; 3) көміртегі оксиді; 4) азот диоксиді; 5) азот оксиді; 6) озон; 7) күкірттісугеі.

5-кестеде бақылау бекетінің орналасқан жері және бекеттегі анықталатын көрсеткіштер тізбесі туралы ақпарат берілген.

*Кесте-5*

*Анықтайтын қоспалар мен бақылау жүргізетін бекеттердің орналасқан жері*

Бекеттің номірі	Сынама Алу мерзімі	Бақылау жүргізу	Бекеттің мекен-жайы	Анықталатын қоспалар
1	Әр 20 минут сайын	Үзіліссіз режимде	Алаша Байтақ жырау көшесі, Оралман ауданы	қалқыма бөлшектер, күкірт диоксиді, көміртегі оксиді, күкірттісугеі, диоксид және азот оксиді, озон
2			Қала орталығында	Күкірт диоксиді, көміртегі оксиді, азот диоксиді, азот оксиді, озон
3			Сансызбай к., 58В	

## **2023 жылдың сәуір айына Түркістан қаласында атмосфералық ауа сапасына жүргізілген мониторинг нәтижелері.**

Стационарлық бақылау желісінің деректері бойынша Түркістан қаласының атмосфералық ауаның ластану деңгейі **жоғары** деп бағаланды, ол **СИ=1,9** (төмен деңгей) және **ЕЖК =49,4%** (жоғары деңгей) азот диоксиді бойынша №3 бекет аумағында (Н.Назарбаев көш.1) анықталды.

\*БК деректері бойынша, егер СИ, ЕЖК әртүрлі градацияга түссе, онда атмосфераның ластану деңгейі осы көрсеткіштердің ең жоғарғы мәні бойынша бағаланады.

Азот диоксидінің орташа концентрациясы - 2,20 ШЖШ<sub>о.т.</sub> .озон-1,21 ШЖШ<sub>о.т.</sub>

Азот диоксидінің максималды бір реттік концентрациясы – 1,90 ШЖШ<sub>м.р.</sub>, күкірттісугеі - 2,33 ШЖШ<sub>м.р.</sub>, басқа ластаушы заттар ШЖШ-дан аспады (6-кесте).

Экстремалды жоғары (ЭЖЛ) және жоғары ластану жағдайлары (ЖЛ және ЭЖЛ): ЖЛ (10 ШЖШ-дан жоғары), ЭЖЛ (50 ШЖШ-дан жоғары) тіркелген жоқ.


Нақты мәндер, сондай-ақ сапа стандарттарынан асу жиілігі және асып кету жағдайларының саны 6 –кестеде көрсетілген.

## Атмосфералық ауаның ластануының сипаттамасы

Қоспа	Орташа концентрация		Максимальдыбір реттік концентрация		ЕЖК	Асу еселігінің саны ПДК <sub>м.р.</sub>		
	мг/м <sup>3</sup>	Көптік ПДК <sub>с.с.</sub>	мг/м <sup>3</sup>	Көптік ПДК <sub>м.р.</sub>		%	>ПДК	>5 ПДК
Түркістан қаласы								
Қалқыма бөлшектер	0	0	0	0	0	0		
Азот диоксиді	0,0881	2,20	0,380	1,90	16,3	1040		
Күкірт диоксид	0,0156	0,31	0,179	0,36	0,00	0		
Азот оксиді	0,0021	0,04	0,003	0,01	0,09	2		
Көміртегі окиді	0,4372	0,15	3,588	0,72	0,00	0		
Озон	0,0363	1,21	0,068	0,43	0,00	0		
Күкірттісутегі	0,0013		0,0186	2,33	0,09	2		

**Қорытынды:**

Соңғы бес жылда ауаның ластану деңгейі келесідей өзгерді:



Кестеден көріп отырғанымыздай, Түркістан қаласының атмосфералық ауасының ластану деңгейі 2019ж және 2021ж төмен деп, тек 2020ж және 2022ж көтеріңкі деп, 2023ж жоғары деп бағаланды.

Ең жоғары қайталану көрсеткішінің артуы негізінен азот диоксидінің есебінен байқалды.

**5. Кентау қаласы ауасының атмосфералық жағдайы**

Кентау қаласы аумағында атмосфералық ауаның жай-күйін бақылау 1 автоматты станцияда жүргізіледі (1-қосымша).

Жалпы қала бойынша 3 көрсеткішке дейін анықталады: 1) күкірт диоксиді; 2) көміртегі оксиді; 3) күкірт сутегі.

7-кестеде бақылау бекетінің орналасқан жері және бекеттегі анықталатын көрсеткіштер тізбесі туралы ақпарат берілген.

Кесте 7

*Анықтайтын қоспалар мен бақылау жүргізетін бекеттердің орналасқан жері*

Бекеттің номірі	Сынама алу мерзімі	Бақылау жүргізу	Бекеттің мекен-жайы	Анықталатын қоспалар
7	әр 20 минут сайын	Үзіліссіз режимде	Уалиханов көшесі, 3 «А» уч.	Көміртегі оксиді, күкірт диоксиді, күкіртсугеңі

### **2023 жылдың сәуір айына Кентау қаласында атмосфералық ауа сапасына жүргізілген мониторинг нәтижелері.**

Кентау қаласының бақылау желісінің деректері бойынша атмосфералық ауаның ластану деңгейі **төмен** деп бағаланды, ол **СИ = 0,7** (көтерінкі деңгей) және **НП = 0 %**(төменгі деңгей).

Ластаушы заттардың орташа концентрациясы ШЖШ-дан аспады.

Ластаушы заттардың максималды бір реттік концентрациясы ШЖШ-дан аспады (8-кесте).

Экстремалды жоғары және жоғары ластану (ЖЛ және ЭЖЛ) жағдайлары: ЖЛ (10 ШЖК астам) және ЭЖЛ (50 ШЖК астам) тіркелген жоқ.

Нақты мәндер, сондай-ақ сапа нормативтерінің асып кетуінің айқындылығы және асып кету жағдайларының саны 8-кестеде көрсетілген.


Кесте 8

Атмосфералық ауаның ластануының сипаттамасы

Қоспа	Орташа концентрация		Максимальды бір реттік концентрация		ЕЖК	Асу еселігінің саны ПДК <sub>м.р.</sub>		
	МГ/М <sup>3</sup>	Көптік ПДК <sub>с.с.</sub>	МГ/М <sup>3</sup>	Көптік ПДК <sub>м.р.</sub>		%	>ПДК	>5 ПДК
<b>Кентау қаласы</b>								
Күкірт диоксиді	0,003	0,06	0,211	0,42	0,00	0		
Көміртегі оксиді	0,1783	0,06	2,181	0,44	0,00	0		
Күкіртсугеңі	0,0014		0,0059	0,74	0,00	0		

## Қорытынды:

Соңғы бес жылда ауаның ластану деңгейі келесідей өзгерді:



Кестеден көріп отырғанымыздай, Кентау қаласының атмосфералық ауасының ластану деңгейі 2019-2022 жылдар аралығында төмен деп бағаланды.

## 6. 2023 жылдың сәуір айындағы Састане ауылдың атмосфералық ауа сапасына жүргізілген мониторинг нәтижелері.

Жалпы 4 көрсеткіш анықталынады: 1) күкірт диоксиді; 2) көміртегі оксиді; 3) азот диоксиді; 4) озон.

9-кестеде бақылау бекетінің орналасқан жері және бекеттегі анықталатын көрсеткіштер тізбесі туралы ақпарат берілген.

Кесте 9

Анықтайдын қоспалар мен бақылау жүргізетін бекеттердің орналасқан жері

Бекеттің номірі	Сынама алу мерзімі	Бақылау жүргізу	Бекеттің мекен-жайы	Анықталатынқоспалар
1	әр 20 минут сайын	Үзіліссіз режимде	Састане а. F. Мұратбаев көш., 1A	көміртегі оксиді, азот диоксиді, күкіртсүтегі, озон

Стационарлық бақылау желісінің деректері бойынша Састане ауылдың атмосфералық ауасының ластану деңгейі **көтеріңкі** деп бағаланды, ол **СИ= 3,15** (көтеріңкі деңгей) және **ЕЖҚ = 13,4 %**(көтеріңкі деңгей).

Азот диоксидінің орташа концентрациясы -4,04 ШЖШ<sub>0,5</sub>, басқа ластаушы заттар ШЖШ - дан аспады.

Азот диоксидінің максималды бір реттік концентрациясы – 1,69 ШЖШ<sub>м.р.</sub>, көміртегі оксиді-3,15 ШЖШ<sub>м.р.</sub>, озон-1,43 ШЖШ<sub>м.р.</sub>, басқа ластауыш заттардың концентрациясы ШЖШ-дан аспады (10-кесте).

Экстремалды жоғары (ЭЖЛ) және жоғары ластану жағдайлары (ЖЛ және ЭЖЛ) : ЖЛ (10 ШЖШ-дан жоғары), ЭЖЛ (50 ШЖШ-дан жоғары) тіркелген жоқ.

Нақты мәндер, сондай-ақ сапа стандарттарынан асу жиілігі және асып кету жағдайларының саны 10 –кестеде көрсетілген.

*Кесте-10*

Атмосфералық ауаның ластануының сипаттамасы

Қоспа	Орташа концентрация		Максимальды бір реттік концентрация		ЕЖК %	Асу еселігінің саны ПДК <sub>м.р.</sub>		
	МГ/М <sup>3</sup>	Көптік ПДК <sub>с.с.</sub>	МГ/М <sup>3</sup>	Көптік ПДК <sub>м.р.</sub>		>ПДК	>5 ПДК	>10 ПДК
<b>Састөбе</b>								
Азот диоксиді	0,1614	4,04	0,3387	1,69	13,4	282		
Күкірт диоксиді	0,0199	0,40	0,4218	0,84	0,00	0		
Көміртегі оксиді	0,518	0,17	15,7354	3,15	0,09	2		
Озон	0,0125	0,42	0,2289	1,43	1,00	21		

## 7. Түркістан облысы аумағындағы жер үсті сулар сапасының мониторингі

Жер үсті су сапасының жай-күйінә мониторинг 6 су объектілерінде, өзендер: Сырдария, Келес, Бадам, Арыс, Ақсу, Катта-бугун, 11 тұстамасында жүргізілді.

Жер үсті суларын зерттеу кезінде су сынамаларында су сапасының 40 физикалық және химиялық көрсеткіштері анықталады: *көзбен шолып бақылау, су температурасы, ерітілген оттегі, сутегі көрсеткіші, өлигенген заттар, мөлдірлік, тұз құрамының басты иондары, биогенді (азот, фосфор, темір қосылыстары) және органикалық заттар (мұнай өнімдері, фенолдар), ауыр*

*металдар (мыс, мырыш, қорғасын, кадмий, хром, никель, сынап), пестицидтер (ДДТ, ДДЕ, ДДТ, ГХЦГ альфа және гамма).*

**Тұптік шөгінділер сапасының мониторингі** Сырдария өзенінің 2 бақылау нүктелері бойынша жүргізілді. Тұптік шөгінділер сынамасында ауыр металдарға (қорғасын, кадмий, марганец, мыс, мырыш, никель, хром) және органикалық заттарға (мұнай өнімдері) талдау жүргізілді.

## **8. Түркістан облысы аумағындағы жер үсті сулар гидрохимиялық көрсеткіштері бойынша сапасының мониторинг нәтижелері.**

Қазақстан Республикасының су объектілерінің су сапасын бағалауға арналған негізгі нормативтік құжаттар «Су объектілерінде судың сапасын жіктеудің бірыңғай жүйесі» (бұдан әрі - Бірыңғай жіктеме) болып табылады.

Су объектілерінің су сапасы Бірыңғай жіктеме бойынша келесідей бағаланады:

3 кесте

Су объектісінің атауы	Су сапасының класы		Параметрлері	Өлш. бірл.	Концентрация
	Акпан 2022 г.	Акпан 2023 г.			
Сырдария өз.	4 класс	4 класс	Магний	мг/дм <sup>3</sup>	31,6
			Фенолдар*	мг/дм <sup>3</sup>	0,0015
Келес өз.	4 класс	норм-ды (>5 класс)	Қалқыма заттар	мг/дм <sup>3</sup>	549,7
Бадам өз.	3 класс	4 класс	Аммоний-ионы	мг/дм <sup>3</sup>	1,305
Арыс өз.	3 класс	4 класс	Аммоний-ионы	мг/дм <sup>3</sup>	1,34
			Магний	мг/дм <sup>3</sup>	31,2
Аксу өз.	1 класс	1 класс			
Катта-бугун өз.	норм-ды (>5 класс)	1 класс			

*Ескерте: \* - I класс – «ең жақсы сапа»*

3-кестеден көріп отырғанымыздай, 2022 жылғы ақпанмен салыстырғанда Сырдария мен Ақсу өзендерінің беткі суларының сапасы айтарлықтай өзгерген жоқ.

Катта-бугун өзенінің жер үсті суларының сапасы 5-тен жоғары кластан 1 класқа өтті – жақсарды.

Келес өзендерінің жер үсті суларының сапасы 4 кластан 5-тен жоғары класқа, Бадам мен Арыс 3 кластан 4 класқа өтті – нашарлады.

Түркістан облысының су объектілеріндегі негізгі ластаушы заттар аммоний-ионы, магний, фенолдар және қалқыма заттар болып табылады. Осы көрсеткіштер бойынша сапа нормативтерінің асып кетуі негізінен тұрмыстық, өнеркәсіптік және ауылшаруашылық төгінділеріне тән.

2023 жылғы ақпанда Түркістан облысының аумағында жоғары және экстремалды жоғары ластану жағдайлары тіркелмеді.

2 Қосымшада тұстамалар шегінде су объектілерінің сапасы бойынша ақпарат.

## **9 Түркістан облысы аумағындағы су объектілерінің тұптік шөгінділерінің мониторинг нәтижелері.**

Сырдария өзеніндегі тұптік шөгінділерді зерттеу нәтижелері бойынша ауыр металдардың құрамы келесі аралықта өзгерген: мыс 0,68-0,7мг/кг, мырыш 2,0-2,5мг/кг, никель 0,78-0,8мг/кг, марганец 0,75-0,80мг/кг, хром 0,02мг/кг, қорғасын мен кадмийдің концентрациялары табылған жоқ. Мұнай өнімдерінің мөлшері 2,1-2,3% болды.

Сырдария өзені суының тұптік шөгінділерін зерттеу нәтижелері 3 Қосымшада көрсетілген.

## **10.2022 жылғы көктем мезгілінде Түркістан облысындағы топырақтың ауыр металдармен ластану жай-күйі**

***Көктем мезгіліндегі Шымкент қаласындағы*** түрлі аудандардан алынған топырақ сынамасының құрамында қорғасын шоғыры 16,7 – 88,3 мг/кг, мыс 0,54 – 20,7 мг/кг, мырыш 1,15 – 83,7 мг/кг, хром 0,27 – 1,89 мг/кг, кадмий 0,27 – 19,8 мг/кг шамасында болды.

Ауыр металлардың ең жоғарғы көрсеткіші «Южполиметалл» ЖАҚ аумағында (0,5 км және 0,9 км қашықтықта) байқалды, мұнда қорғасын концентрациясы – 2,73 – 2,76 ШЖШ, мыс – 6,2 - 6,9 ШЖШ, мырыш – 2,85 -3,64 ШЖШ көрсетті.

Орталық саябақ, №9 мектеп аумағында және Ордабасы алаңында ауыр металдардың концентрациясы норма шегінде болды.

***Көктем мезгіліндегі Туркістан қаласында*** түрлі аудандардан алынған топырақ сынамасының құрамындағы қорғасын концентрациясы 8,36 – 49.9 мг/кг, мыс 0,42 – 0,71 мг/кг, мырыш 0,60 – 17.7 мг/кг, хром 0,15 – 0.37 мг/кг, кадмий 0,23 – 1,33 мг/кг шамасында болды.

Қазметалпродакшн ауданында қорғасын концентрациясы 1,56 ШЖШ құрады.

Ауыр металдардың қалған концентрациясы қалыпты шектерде болды.

***Көктем мезгіліндегі Кентау қаласында*** түрлі аудандарында алынған топырақ сынамасы құрамында қорғасын шоғыры 8.67 – 88.3 мг/кг, мыс 0,33 – 1.67 мг/кг, мырыш 8.83 – 24,6 мг/кг, хром 0,52 – 1,63 мг/кг, кадмий 0,81 – 5.38 мг/кг шамасында болды.

"Южполиметалл" ЖАҚ (500м) ауданында топырақ сынамаларында қорғасын бойынша - 2,73 ШЖШ, мырыш бойынша – 1,05 ШЖШ артқаны анықталды.

"Южполиметалл" байыту фабрикасы ауданында 1.5 км қорғасын концентрациясы - 2,76 ШЖШ, мырыш бойынша-1,07 ШЖШ.

***Көктем мезгіліндегі*** Түркістан облысының *Сарыагаш ауданының* әр түрлі нүктелерінде алынған топырақ сынамаларында қорғасын концентрациясы

қорғасын концентрациясы 0,42– 5,43 мг/кг, мыс 0,55 – 1,59 мг/кг, мырыш 1,15 – 3,08 мг/кг, хром 0,56-0,62 мг/кг, кадмий 0,52 – 0,64 мг/кг шегінде болды.

Ауыр металдардың құрамы норма шегінде болды.

Түркістан облысының *Мақтарал ауданындағының* әр түрлі нүктелерінде алынған топырақ сынамаларында қорғасын концентрациясы 5,69– 6,56 мг/кг, мыс 0,73 – 2,07 мг/кг, мырыш 0,50 – 1,67 мг/кг, хром 0,66-0,74 мг/кг, кадмий 0,44 - 0,84 мг/кг шегінде болды.

Ауыр металдардың құрамы норма шегінде болды.

Түркістан облысының *Ордабасы ауданындағының* әр түрлі нүктелерінде алынған топырақ сынамаларында қорғасын концентрациясы 5,48 – 6,54 мг/кг, мыс 0,61 – 0,67 мг/кг, мырыш 0,96 – 1,99 мг/кг, хром 0,13 – 0,92 мг/кг, кадмий 0,62-2,24 мг/кг шегінде болды.

Ауыр металдардың құрамы норма шегінде болды.

Түркістан облысының *Бәйдібек ауданындағының* әр түрлі нүктелерінде алынған топырақ сынамаларында қорғасын концентрациясы 5,71– 6,87 мг/кг, мыс 0,25 – 0,71 мг/кг, мырыш 1,28 – 1,65 мг/кг, хром 0,25-0,44 мг/кг, кадмий 0,35-0,84 мг/кг шегінде болды.

Ауыр металдардың құрамы норма шегінде болды.

## 11. Радиациялық жағдай

Атмосфералық ауаның ластануының гамма сәулелену деңгейіне күнсайын жергілікті 2 метеорологиялық станцияда (Шымкент, Түркістан) және атмосфералық ауаның ластануына бақылау Түркістан қаласының (№1 ЛББ) 1 автоматты бекетінде бақылау жүргізілді (14.5-сур.).

Облыстың елді-мекендері бойынша атмосфералық ауа қабатының жерге жақын қабатындағы радиациялық гамма-фонның орташа мәні 0,00-0,26 мкЗв/сағ. аралығында болды. Облыс бойынша радиациялық гамма- фонның орташа мәні 0,10 мкЗв/сағ., яғни шекті жол берілетін шамаға сәйкес келеді.

Атмосфераның жерге жақын қабатында радиоактивтердің түсү тығыздығына бақылау Түркістан облысының аумағында 2 метеорологиялық станцияда (Шымкент, Түркістан ) ауа сынамасын горизонтальді планшеттер алу жолымен жүзеге асырылды (14.5-сур.). Барлық станцияда бес тәуліктік сынама жүргізілді.


Облыс аумағында атмосфераның жерге жақын қабатында орта тәуліктік

радиоактивтердің тұсу тығыздығы 1,2-2,5 Бк/м<sup>2</sup>күрады. Облыс бойынша радиоактивті тұсулердің орташа тығыздығы 1,8 Бк/м<sup>2</sup>, бұл шекті жол берілетін деңгейінен аспады.


### Қосымша 1




Сурет 1 - Шымкент қ. атмосфералық ауаның ластануын бақылаудың стационарлық желісінің орналасу схемасы




Сурет 2 - Шымкент қ. атмосфералық ауаның ластануын бақылаудың экспедициалық желісінің орналасу схемасы



Сурет 3 – Қызылсай елді мекенінің атмосфералық ауасының ластануын бақылаудың стационарлық желісінің орналасу схемасы.




Сурет 4 – Түркістан қаласының атмосфералық ауасының ластануын бақылаудың стационарлық желісінің орналасу схемасы.



Сурет 5 - Ластанды бақылаудың стационарлық желісінің орналасу схемасы Кентай қаласының атмосфералық ауасы.



Сурет 6—Састобе елді мекенінің атмосфералық ауасының ластануын бақылаудың стационарлық желісінің орналасу схемасы.



Сурет 4 – Түркістан облысы тұстамалардың орналасу схемасы

## 2 Қосымша

### Түркістан облысы жер үсті су сапасының тұстамалар бойынша ақпараты

Су объектілері	және	Физика-химиялық параметрлердің сипаттамасы
<b>тұстамалары</b>		
<b>Сырдария өзені</b>		судың температурасы 1,4-4,0°C, сутек көрсеткіші 8,0-8,3, суда еріген оттегінің концентрациясы 10,4-15,5 мг/дм <sup>3</sup> , ОБТ <sub>5</sub> мәні 0,36-0,9 мг/дм <sup>3</sup> , мөлдірлігі – 25,0 см.
тұстама - Көкбұлақ а. (бекеттен ССБ қарай 10,5 км)	4 класс	аммоний-ионы – 1,18 мг/дм <sup>3</sup> , фенолдар* - 0,0016 мг/дм <sup>3</sup> . Аммоний-ионның нақты концентрациясы фондық кластан асады, фенолдың нақты концентрациясы фондық кластан аспайды.
тұстама - Шардара т/б (Шардара б. кіре-берісінен 2,0 км төмен)	4 класс	сульфаттар – 384,2 мг/дм <sup>3</sup> , магний – 31,2 мг/дм <sup>3</sup> . Сульфаттар мен магнийдің нақты концентрациясы фондық кластан аспайды.
тұстама – Азаттық а. (Сырдария өзенінің көпірі - ауылдан 5 км)	4 класс	аммоний-ионы – 1,13 мг/дм <sup>3</sup> , магний – 34,8 мг/дм <sup>3</sup> , фенолдар* - 0,0018 мг/дм <sup>3</sup> .

<b>Келес өзені</b>	судың температуrases 0,0-5,0°C, сутек көрсеткіші 7,6-8,1, суда еріген оттегінің концентрациясы 11,7-12,6 мг/дм <sup>3</sup> , ОБТ <sub>5</sub> мәні 0,3-0,6 мг/дм <sup>3</sup> , мөлдірлігі – 2,0-4,0 см.	
тұстама – Казыгурт а. (ауылдан 0,2 км жоғары, г/п 0,8 км жоғары)	норм-ды (>5 класс)	қалқыма заттар – 895,0 мг/дм <sup>3</sup> . Қалқыма заттардың нақты концентрациясы фондық кластан асады.
Келес-сағасы (сағасынан 1,2 км жоғары)	5 класс	сульфаттар – 605,2 мг/дм <sup>3</sup> . Сульфаттардың нақты концентрациясы фондық кластан аспайды.
<b>Бадам өзені</b>		судың температуrases 2,8-5,5°C, сутек көрсеткіші 7,3-7,4, суда еріген оттегінің концентрациясы 13,4-13,6 мг/дм <sup>3</sup> , ОБТ <sub>5</sub> мәні 0,3-0,6 мг/дм <sup>3</sup> , мөлдірлігі – 2,0-25,0 см.
тұстама - Шымкент гидробекеті (Шымкентен 2,0 км төмен)	3 класс	аммоний-ионы – 0,92 мг/дм <sup>3</sup> , магний – 24,0 мг/дм <sup>3</sup> , минерализация – 1134,5 мг/дм <sup>3</sup> . Магнийдің нақты концентрациясы фондық кластан аспайды, минерализация мен аммоний-ионның нақты концентрациясы фондық кластан асады.
тұстама - Қараспан а. (жол көпірінен 0,1 км төмен)	4 класс	аммоний-ионы – 1,69 мг/дм <sup>3</sup> . Аммоний-ионның нақты концентрациясы фондық кластан асады.
<b>Арыс өзені</b>	судың температуrases 3,0°C, сутек көрсеткіші 7,5, суда еріген оттегінің концентрациясы 11,7 мг/дм <sup>3</sup> , ОБТ <sub>5</sub> 0,7 мг/дм <sup>3</sup> , мөлдірлігі – 3,0 см.	
тұстама – Арыс қ. (жд станция)	4 класс	аммоний-ионы – 1,34 мг/дм <sup>3</sup> , магний – 31,2 мг/дм <sup>3</sup> . Магнийдің нақты концентрациясы фондық кластан аспайды, аммоний-ионның нақты концентрациясы фондық кластан асады.
<b>Аксу өзені</b>	судың температуrases 2,1-7,1°C, сутек көрсеткіші 7,7, суда еріген оттегінің концентрациясы 11,0-11,6 мг/дм <sup>3</sup> , ОБТ <sub>5</sub> 0,6-0,7 мг/дм <sup>3</sup> , мөлдірлігі – 6,0-9,0 см.	
тұстама - Сарқырама а. (ауылдан онтүстік-батысқа қарай, сағадан қаш. 52 км)	1 класс	-
тұстама - Көлкент а. (ауылдан солтүстікке қарай 1,5-2 км, су бекетінен 10 м төмен)	3 класс	аммоний-ионы – 0,59 мг/дм <sup>3</sup> .
<b>Катта-бугун өзені</b>	судың температуrases 3,4°C, сутек көрсеткіші 7,9, суда еріген оттегінің концентрациясы 9,7 мг/дм <sup>3</sup> , ОБТ <sub>5</sub> 0,3 мг/дм <sup>3</sup> , мөлдірлігі – 10,0 см.	
тұстама - Жарықбас а. (ауылдан 1,5 км жоғары)	1 класс	-

### **3 Қосымша**

#### **Түркістан облысы Сырдария өзені суының тұптік шөгінділерін**

#### **2023 жылғы ақпандығы зерттеу нәтижелері**

№ п/п	Сынама алу орны	Шоғыр, мг/кг							
		Мұнай өнімдері %	Мыс	Хром	Кад- мий	Никел ь	Марга- нец	Корга- сын	Мырыш
1	Сырдария өз. Көкбұлак а.	2,3	0,68	0,02	0,0	0,78	0,75	0,0	2,5
2	Сырдария өз, Шардара т/б, Шардара су қойм платинсынан 2км төменде.	2,1	0,7	0,02	0,0	0,8	0,80	0,0	2,0

### **4 Қосымша**

#### **Анықтамалық бөлім**

#### **Елді мекендердің ауасындағы ластаушы заттардың шекті рұқсат етілген концентрациясы (ШЖШ)**

Қоспалардың атауы	ШЖШ мәні, мг/м³		Қауіп сыйныбы
	Максимальды бір реттік	Орташа тәуліктік	
Азот диоксиді	0,2	0,04	2
Азотоксиді	0,4	0,06	3
Аммиак	0,2	0,04	4
Бенз/а/пирен	-	0,1 мкг/100 м³	1
Қалқыма заттар (частицы)	0,5	0,15	3
Қалқыма бөлшектер PM 10	0,3	0,06	
Қалқыма бөлшектер PM 2,5	0,16	0,035	
Кадмий	-	0,0003	1
Кобальт	-	0,001	2
Марганец	0,01	0,001	2
Мыс	-	0,002	2
Күшән	-	0,0003	2
Озон	0,16	0,03	1
Корғасын	0,001	0,0003	1
Күкірт диоксиді	0,5	0,05	3

Күкірт қышқылы	0,3	0,1	2
Күкірттісутек	0,008	-	2
Көміртегі оксиді	5,0	3	4
Фенол	0,01	0,003	2
Формальдегид	0,05	0,01	2
Хлор	0,1	0,03	2
Хром (VI)	-	0,0015	1
Цинк	-	0,05	3

«Қалалық және ауылдық жерлердегі атмосфералық ауаның гигиеналық стандарты» (СанПин №ҚР ДСМ-70 2тамыз 2022 жылдан бастап)

### Атмосфераның ластану индексінің дәрежесін бағалау

Градация	Ауаның ластануы	Көрсеткіштер	Ай сайынғы бағалау
I	Төменгі	СИ ЕЖҚ, %	0-1 0
II	Көтеріңкі	СИ ЕЖҚ, %	2-4 1-19
III	Жоғары	СИ ЕЖҚ, %	5-10 20-49
IV	Өте жоғары	СИ ЕЖҚ, %	>10 >50

РД 52.04.667–2005, Мемлекеттік органдарды, халықты және халықты ақпараттандыру үшін қалалардағы ауаның ластану жағдайы туралы құжаттар. Әзірлеуге, құрылышқа, презентацияға және мазмұнға қойылатын жалпы талаптар.

### Радиациялық қауіпсіздік стандарты\*

Стандартталған мәндер	Мөлшер шектері	
	Халық	Кез-келген 5 жыл ішінде орта есеппен жылына 1мЗв, бірақ жылына 5мЗв аспайды.
Тиімді мәндер		

\*«Радиациялық қауіпсіздікті қамтамасыз етуге қойылатын санитарлық эпидемиологиялық талаптар »

### Су пайдалану санаттары (түрлері) бойынша су пайдалану сыйынтарын саралау

Су пайдаланукатегориясы (түрі)	Тазалау мақсаты / түрі	Су пайдаланукластары				
		1 класс	2 класс	3 класс	4 класс	5 класс
Балықшаруашылығы суын пайдалану	Лосось	+	+	-	-	-
	Түкі	+	+	-	-	-
Шаруашылық-ауыз су пайдалану	Қарапайым су дайындау	+	+	-	-	-
	Қәдімгі су дайындау	+	+	+	-	-

	Қарқынды су дайындау	+	+	+	+	-
Рекреациялық су пайдалану (мәдени-тұрмыстық)		+	+	+	-	-
Суару	Дайындықсыз	+	+	+	+	-
	Карталардатундыру	+	+	+	+	+
Өнеркәсіп:						
технологиялық мақсаттар, процестер салқыннату		+	+	+	+	-
гидроэнергетика		+	+	+	+	+
пайдалықазбалардың дірі		+	+	+	+	+
көлік		+	+	+	+	+

Су обьектілеріндегі су сапасын жіктеудің бірыңғай жүйесі (АШМ СРК 09.11.2016 ж. №151 Бұйрығы)

## Қосымша 5

### Зиянды микроорганизмдердің, топырақты ластайтын басқа да биологиялық және зиянды заттардың берілетін шекті шоғырлану нормативтері

№№ п/п	Заттыңнатауы	Шектірұқсатетілген концентрация (бұданәрі - ШРК), топырақтағы килограмғамиллиграмм	Шектеушікөрсеткіш	Ескертпе
Химиялық заттар				
1	Марганец	1500	жалпысанитарлық	
2	Мыс	3,0 (жылжымалынысан)	жалпысанитарлық	Мыстыңжылжымалыформасы РН 4,8 ацетатты аммоний буферлікерітіндісіменалынады.
3	Мышьяк	2,0 (жалпықұрамы)	транслокациялық	ШРК фонды ескереотырыпберілген.
4	Никель	4,0 (жылжымалынысан)	жалпысанитарлық	Никельдіңжылжымалыформасы РН 4,6 ацетатты аммоний буферлікерітіндісіменалынады.
5	Сынап	2,1 (жалпы мазмұны)	транслокациялық	ШРК фонды ескереотырыпберілген
6	Қорғасын	32,0 (жалпықұрамы)	жалпысанитарлық	ШРК фонды ескереотырыпберілген
7	Қорғасын + сынап	20,0 + 1,0 (жалпықұрамы)	транслокациялық	
8	Хром	6,0 (жылжымалынысан)	жалпысанитарлық	ШРК фонды ескереотырыпберілген. Хромныңқозгалмалыформасы РН 4,8 ацетатты аммоний буферлікерітіндісіменалынады.
9	Хром <sup>+6</sup>	0,05	жалпысанитарлық	

10	Мырыш	23,0 (жылжымалынысан)	транслокациялық	Мырыштың жылжымалыформасы РН 4,8 ацетатты-аммоний буферліерітіндісімен алдынады
----	-------	-----------------------	-----------------	---

**ТАБИГИ ОРТАНЫҢ ЛАСТАНУ МОНИТОРИНГІ ЗЕРТХАНАСЫ**  
**"ҚАЗГИДРОМЕТ" РМК ТҮРКІСТАН ОБЛЫСЫ БОЙЫНША ФИЛИАЛЫ**  
**МЕКЕН-ЖАЙЫ:**  
**ШЫМКЕНТ ҚАЛАСЫ**  
**ЖЫЛҚЫШИЕВ КӨШЕСІ, 44**  
**ТЕЛ. 8-(7252)-54-05-33**  
**E MAIL: [LMZPS\\_UKO@METEO.KZ](mailto:LMZPS_UKO@METEO.KZ)**