

Қазақстан Республикасы Экология және табиғи ресурстар министрлігі  
«Қазгидромет» РММ Түркістан облысы бойынша филиалы



**ШЫМКЕНТ ҚАЛАСЫ ЖӘНЕ  
ТҮРКІСТАН ОБЛЫСЫ БОЙЫНША  
ҚОРШАҒАН ОРТА ЖАЙ-КҮЙІ  
ЖӨНІНДЕГІ АҚПАРАТТЫҚ  
БЮЛЛЕТЕНІ**

сәуір 2025ж

Шымкент, 2025 жыл

	<b>Мазмұны</b>	<b>Стр.</b>
	<b>Алғы сөз</b>	3
<b>1</b>	Атмосфералық ауаны ластаудың негізгі көздері	4
<b>2</b>	Шымкент қ. атмосфералық ауа сапасының жай-күйі	4
<b>2.1</b>	Қызылсай а. атмосфералық ауа сапасының	
<b>3</b>	Атмосфералық жауын-шашын сапасының жай-күйі	8
<b>4</b>	Түркістан қ. атмосфералық ауа сапасының жай-күйі	8
<b>4.1</b>	Кентау қ. атмосфералық ауа сапасының жай-күйі	
<b>4.2</b>	Састөбе а. атмосфералық ауа сапасының жай-күйі	
<b>5</b>	Топырақтың ауыр металдармен ластану жай-күйі	12
<b>6</b>	Жер үсті сулар сапасының мониторингі	13
<b>6.1</b>	Жер үсті сулары бойынша мониторинг нәтижелері.	14
<b>7</b>	Радиациялық жағдай	15
	<b>Қосымша 1</b>	15
	<b>Қосымша 2</b>	19
	<b>Қосымша 3</b>	20
	<b>Қосымша 4</b>	22

## **Алғы сөз**

Ақпараттық бюллетень «Қазгидромет» РМК мамандандырылған бөлімшелері Ұлттық гидрометеорологиялық қызметтің бақылау желісіндегі қоршаған ортаның жай-күйін бақылау бойынша жүргізген жұмыс нәтижелері бойынша дайындалды.

Бюллетень мемлекеттік органдарды, қоғамды және халықты Түркістан облысының аумағындағы қоршаған ортаның жай-күйі туралы мемлекеттік органдарды, қоғамдастықтарды және тұрғындарды ақпараттандыруға арналған және ластану деңгейінің болып жатқан өзгерістер үрдісін ескере отырып, ҚР Қоршаған ортаны қорғау саласындағы іс-шаралардың тиімділігін одан әрі бағалау үшін қажет.

## **Түркістан облысының атмосфералық ауасының сапасын бағалау.**

### **1. Атмосфералық ауаны ластаудың негізгі көздері**

Шымкент қаласы бойынша статистикалық мәліметтерге сәйкес ластаушы заттар шығарындыларының стационарлық көздерінің саны 3976 бірлікті құрайды, 2023 жылы нақты шығарындылардың көлемі жылына 29,3 тоннаны құрады, ал рұқсат етілген көлемі жылына 416,4 тонна.

Түркістан облысы бойынша ластаушы заттар шығындаларының стационарлық көдерінің саны 8363 бірлікті құрайды, 2023 жылы нақты шығарындылар көлемі жылына 26,7 тонна құрады.

2024 жылғы жағдай бойынша Шымкент қаласында 450000 автокөліктер бар. Оның ішінде : жеңіл автокөліктер 418500 бірлік және көлік құралдарының жалпы санының 93,0% құрайды, автобустар - 12600 бірлік, 2,8 % құрайды.

Шымкент қаласы бойынша автомобиль көлігінен зиянды ластаушы заттар шығарындыларының көлемі 2024 жылы 26611 тоннаны, Түркістан облысы бойынша 26,7 тоннаны құрады.

Зиянды шығындылардың негізгі мөлшері жеңіл автокөліктердің үлесіне келеді, жалпы санының 32,7% құрады. Жұк көліктерінен 10,6% және автобустардан 8,3% бөлінеді.

### **2. Шымкент қ. атмосфералық ауа сапасының жағдайы**

Аумақтағы атмосфералық ауаның жай-күйін бақылау 6 бақылау бекетінде, оның ішінде қолмен сынама алушын 4 постында және 2 автоматты станцияда жүргізіледі (қосымша-1).

Жалпы қала үшін 13-ке дейін көрсеткіштер анықталады: 1) қалқыма заттар(шан); 2)күкірт диоксиді; 3)көміртегі оксиді; 4)азот диоксиді; 5)азот оксиді; 6)формальдегид; 7)күкіртті сутек; 8)аммиак; 9) бенз(а)пирен; 10)кадмий, 11) мыс; 12)қорғасын; 13) хром.

1-кестеде бақылау бекеттерінің орналасуы және әр бекетте анықталатын көрсеткіштер тізімі туралы ақпарат келтірілген. Атмосфералық ауаның жағдайын бақылау 6 стационарлық бекетте жүргізілді.

*Kestme 1*

Бақылау бекеттерінің орналасқан жері және анықталатын қоспалар

№ бекет	Алу уақыты	Бақылау	Бекет мекен-жайлары	Анықталатын қоспалар
1			Абай даңғылы, АО «Южполиметалл» АҚ	қалқыма заттар (шан), күкірт диоксиді, көміртегі оксиді, азот диоксиді, аммиак, күкіртті сутек, формальдегид, бенз(а)пирен

				Ауыр металлдар: кадмий, мыс, қорғасын, хром
2	Тәулігіне 3 рет  Қолмен алу (дискретті әдістер)	Ордабасы алаңы, Қазыбек би мен Төле би көш. Әтеді  Алдияров көш.нөмірсіз, АҚ «Шымкентцемент»  Сайрам көш, 198, ЗАО «Пив завод»	Ордабасы алаңы, Қазыбек би мен Төле би көш. Әтеді  Алдияров көш.нөмірсіз, АҚ «Шымкентцемент»  Сайрам көш, 198, ЗАО «Пив завод»	қалқыма заттар (шан), күкірт диоксиді, көміртегі оксиді, азот диоксиді, аммиак, күкірттісутек, формальдегид, бенз(а)пирен Ауыр металлдар: кадмий, мыс, қорғасын, хром
3				қалқыма заттар (шан), күкірт диоксиді, көміртегі оксиді, азот диоксиді, аммиак, күкірттісутек, формальдегид, бенз(а)пирен Ауыр металлдар: кадмий, мыс, қорғасын, хром
8				қалқыма заттар (шан), күкірт диоксиді, көміртегі оксиді, азот диоксиді, аммиак, күкірттісутек, формальдегид, бенз(а)пирен Ауыр металлдар: кадмий, мыс, қорғасын, хром
5	Әр 20 мин сайын  Үздіксіз режимде	Самал-3 шағын ауданы  Нұрсат шағын ауданы	Самал-3 шағын ауданы  Нұрсат шағын ауданы	азот диоксиді, азот оксиді, аммиак, күкірт диоксиді, күкірттісутек
6				Күкірт диоксиді, күкірттісутек

## Шымкент қаласының 2025 жылғы сәуір айының ауа сапасын бақылау нәтижелері

Бақылау бекеттерінің мәліметтеріне сәйкес атмосфералық ауаның ластану деңгейі **көтеріңкі** болып бағаланды, ол **ЕЖҚ =9%** (көтеріңкі деңгей) және **СИ= 3,0** (көтеріңкі деңгей) күкірттісутегі бойынша №5 бекет аумағында (Самал-3 ш.а.) анықталды.

Азот диоксидінің орташа концентрациясы – 1,18 ШЖШ<sub>о.т.</sub>, формальдегид – 1,68 ШЖШ<sub>о.т.</sub>, қалқыма бөлшектер -1,38 ШЖШ<sub>о.т.</sub>, басқа ластаушы заттар ШЖШ-дан аспады.

Күкірттісутегінің максималды бір реттік концентрациясы – 3,04 ШЖШ<sub>м.р.</sub>, көміртегі оксиді-1,38 ШЖШ<sub>м.р.</sub>, басқа ластаушы заттар ШЖШ-дан аспады (2-кесте).

Экстремалды жоғары (ЭЖЛ) және жоғары ластану жағдайлары (ЖЛ және ЭЖЛ): ЖЛ (10 ШЖШ-дан жоғары), ЭЖЛ (50 ШЖШ-дан жоғары) тіркелген жоқ.

Нақты мәндер, сондай-ақ сапа стандарттарынан асу жиілігі және асып кету жағдайларының саны 2 –кестеде көрсетілген.

## Атмосфералық ауаның ластануының сипаттамасы

Қоспа	Орташа шоғыр		Ең үлкен бір реттік шоғыр		ЕЖҚ %	Асу еселігінің саны ШЖШ		
	МГ/М <sup>3</sup>	ШЖШ <sub>т.</sub> Асу еселігі	МГ/М <sup>3</sup>	ШЖШ <sub>м.р</sub> Асу еселігі		>ШЖШ	>5 ШЖШ	>10 ШЖШ
	Соныншінде							
Шымкент қаласы								
Қалкыма бөлшектер (шан)	0,2071	1,38	0,400	0,80	0,0	0	0	0
Күкірт диоксиді	0,0095	0,19	0,054	0,11	0,00	0	0	0
Көміртегі оксиді	1,9205	0,64	6,000	1,20	0,32	1	0	0
Азот диоксиді	0,0473	1,18	0,080	0,40	0,00	0	0	0
Азот оксиді	0,0177	0,29	0,040	0,10	0,00	0	0	0
Күкірттісутегі	0,0115		0,024	3,04	4,36	202	0	0
Аммиак	0,0229	0,57	0,040	0,20	0,00	0	0	0
Формальдегид	0,0168	1,68	0,023	0,46	0,00	0	0	0
Бенз(а)пирен	0,000021	0,2						
Кадмий	0,000012	0,039	0,000015					
Мыс	0,000011	0,005	0,000014					
Қорғасын	0,000015	0,049	0,000019					
Хром	0,000001	0,001	0,000002					

**Қорытынды:**

Соңғы бес жылда ауаның ластану деңгейі сәуір айында келесідей өзгерді:



Шымкент қаласының атмосфералық ауасының ластану деңгейі кестеден көріп отырғанымыздай, 2021ж төмен деп, 2022-2025жж көтерінкі деп бағаланды.

Ең жоғары қайталану көрсеткішінің артуы күкірттісуге тән есебінен байқалды.

## Метеорологиялық жағдайлар

Сәуір айында ауа ластануының қалыптасуына ауа-райының өсері байқалмады, ҚМЖ күндер (қолайсыз метеорологиялық жағдайлар) тіркелген жоқ.

### 2.1 2025 жылдың сәуір айына Қызылсай елді-мекеніндегі атмосфералық ауа сапасына жүргізілген мониторинг нәтижелері

Жалпы елді-мекен бойынша 4 көрсеткішке дейін анықталады: 1) күкірт диоксиді; 2) көміртегі оксиді; 3) азот диоксиді; 4) озон.

З-кестеде бақылау бекетінің орналасқан жері және бекеттегі анықталатын көрсеткіштер тізбесі туралы ақпарат берілген.

*Кесте-3*

*Анықтайтын қоспалар мен бақылау жүргізетін бекеттердің орналасқан жері*

Бекеттің номірі	Сынама алу мерзімі	Бақылау жүргізу	Бекеттің мекен-жайы	Анықталатын қоспалар
4	әр 20 минут сайын	Үзіліссіз режимде	<i>Қызылсай елді-мекені, Омарташиы, I көшесі.</i>	Күкірт диоксиді, көміртегі оксиді, азот диоксиді, озон.

Стационарлық бақылау желісінің деректері бойынша Қызылсай елді-мекенінің атмосфералық ауаның ластану деңгейі **көтеріңкі** деп бағаланды, ол **ЕЖҚ = 15%** (көтеріңкі деңгей) және **СИ= 2,5** (көтеріңкі деңгей) азот диоксиді бойынша анықталды.

Азот диоксидінің орташа концентрациясы – 4,00 ШЖШ<sub>о.т.</sub>, басқа ластаушы заттардың ШЖШ - дан аспады.

Азот диоксидінің максималды бір реттік концентрациясы -1,91 ШЖШ<sub>м.р.</sub>, көміртегі оксиді-2,53 ШЖШ<sub>м.р.</sub>, озон-1,46 ШЖШ<sub>м.р.</sub>, басқа ластаушы заттардың ШЖШ - дан аспады (4-кесте).

Экстремалды жоғары (ЭЖЛ) және жоғары ластану жағдайлары (ЖЛ): ЖЛ (10 ШЖШ-дан жоғары), ЭЖЛ (50 ШЖШ-дан жоғары) тіркелген жоқ.

Нақты мәндер, сондай-ақ сапа стандарттарынан асу жиілігі және асып кету жағдайларының саны 4 –кестеде көрсетілген.

*Кесте-4*

*Атмосфералық ауаның ластануының сипаттамасы*

Қоспа	Орташа шоғыр	Ең үлкен бір реттік шоғыр	ЕЖҚ	Асу еселігінің саны ШЖШ <sub>м.р.</sub>
-------	--------------	---------------------------	-----	---

	МГ/М <sup>3</sup>	ШЖШ <sub>о.т.</sub> Асу еселігі	МГ/М <sup>3</sup>	ШЖШ <sub>м.р</sub> Асу еселігі	%	>ШЖШ	>5 шжш	>10 шжш
							соның ішінде	
<b>Қызылсай</b>								
Күкірт диоксиді	0,0195	0,39	0,4277	0,86	0,00	0	0	0
Көміртегі оксиді	0,5592	0,19	12,6695	2,53	0,05	1	0	0
Азот диоксиді	0,1600	4,00	0,3822	1,91	14,68	317	0	0
Озон	0,0089	0,30	0,2334	1,46	0,51	11	0	0

### 3. Атмосфералық жауын-шашын сапасының жай-күйі

Атмосфералық жауын-шашынның химиялық құрамына бақылау 2 метеостанцияларда (Қазығұрт, Шымкент) алынған жаңбыр сүнина сынама алумен жүргізілді (14.4 сур.).

Жауын-шашын құрамында анықталатын заттардың шоғырлары шекті рұқсат етілген шоғырлардан (ШЖШ) аспады.

Жауын-шашын сынамаларында гидрокарбонаттар 26,67%, сульфаттар 25,57%, кальций иондары 15,31%, натрий иондары 7,35 %, хлоридтер 14,02% , калий иондары 2,05 %, магний иондары 3,12 %, аммоний иондары 2,13 % болды.

Ең үлкен жалпы минералдылығы Қазығұрт МС – 73,23 мг/л, ең азы Шымкент МС – 36,32 мг/л белгіленді.

Атмосфералық жауын-шашынның үлесті әлектрөткізгіштігі Қазығұрт МС – 123,6 мкСм/см, Шымкент МС – 36,32 мкСм/см болды.

Тұсken жауын-шашын қышқылдылығы 5,08 (Шымкент МС) – 7,05 (Қазығұрт МС) аралығында болды.

### 4. Түркістан қаласындағы атмосфералық ауа сапасының мониторингі

Түркістан қаласының атмосфера ауасының жағдайын бақылау 1 автоматтық бекетте жүргізілді (қосымша1).

Жалпы қала бойынша 6 көрсеткішке дейін анықталады: 1) күкірт диоксиді; 2) көміртегі оксиді; 3) азот диоксиді; 4) азот оксиді; 5) озон; 6) күкірттісуге.

5-кестеде бақылау бекетінің орналасқан жері және бекеттегі анықталатын көрсеткіштер тізбесі туралы ақпарат берілген.

*Кесте-5*

*Анықтайтын қоспалар мен бақылау жүргізетін бекеттердің орналасқан жері*

Бекеттің номірі	Сынама Алу мерзімі	Бақылау жүргізу	Бекеттің мекен-жайы	Анықталатын қоспалар
1	әр 20 минут сайын	Үзіліссіз режимде	Алаша Байтақ жырау көшесі, Оралман ауданы	күкірт диоксиді, көміртегі оксиді, күкірттісуге, диоксид және азот оксиді, озон
2			Қала орталығында	көміртегі оксиді, азот диоксиді, азот оксиді, озон

		<i>Б. Саттарханов даңғылы</i>	
3		<i>A. Сандыбай к., 58B Бекзат ш.а.</i>	Күкірт диоксиді, көміртегі оксиді, азот диоксиді, азот оксиді, озон

## 2025 жылдың сәуір айына Түркістан қаласында атмосфералық ауа сапасына жүргізілген мониторинг нәтижелері

Стационарлық бақылау желісінің деректері бойынша Түркістан қаласының атмосфералық ауаның ластану деңгейі **жоғары** деп бағаланды, ол **ЕЖҚ =47%** (жоғары деңгей) азот диоксиді бойынша және **СИ=3,4**(көтерінкі деңгей) күкірт диоксиді бойынша №3 бекет аумағында (А.Сандыбай көш.58В) анықталды.

\*БК деректері бойынша, егер СИ, ЕЖҚ әртурлі градацияга түссе, онда атмосфераның ластану деңгейі осы көрсеткіштерідің ең жоғарғы мәні бойынша бағаланады.

Азот диоксидінің орташа концентрациясы – 1,69 ШЖШ<sub>о.т.</sub>, озон-1,16 ШЖШ<sub>о.т.</sub>, басқа ластаушы заттар ШЖШ-дан аспады.

Азот диоксидінің максималды бір реттік концентрациясы – 2,34 ШЖШ<sub>м.р.</sub>, күкірт диоксиді – 3,38 ШЖШ<sub>м.р.</sub>, басқа ластаушы заттар ШЖШ-дан аспады (6-кесте).

Экстремалды жоғары (ЭЖЛ) және жоғары ластану жағдайлары (ЖЛ және ЭЖЛ): ЖЛ (10 ШЖШ-дан жоғары), ЭЖЛ (50 ШЖШ-дан жоғары) тіркелгендік жоқ.

Нақты мәндер, сондай-ақ сапа стандарттарынан асу жиілігі және асып кету жағдайларының саны 6 –кестеде көрсетілген.


*Kесте-6*

Атмосфералық ауаның ластануының сипаттамасы

Қоспа	Орташа шоғыр		Ең үлкен бір реттік шоғыр		ЕУК %	Асу еселігінің саны ШЖШ <sub>м.р.</sub>			
	МГ/М <sup>3</sup>	ШЖШ <sub>о.т.</sub> Асу еселігі	МГ/М <sup>3</sup>	ШЖШ <sub>м.р.</sub> Асу еселігі.		>ШЖ III	>5 ШЖШ	>10 ШЖШ	
						сөнүншіндегі			
<b>Түркістан қаласы</b>									
Азот диоксиді	0,067	1,69	0,468	2,34	15,79	1023	0	0	
Күкірт диоксиді	0,029	0,58	1,691	3,38	2,25	97	0	0	
Азот оксиді	0,001	0,01	0,002	0,00	0,00	0	0	0	
Көміртегі оқиді	0,574	0,19	3,765	0,75	0,00	0	0	0	
Озон	0,035	1,16	0,058	0,36	0,00	0	0	0	
Күкірттісутегі	0,0011		0,004	0,55	0,00	0	0	0	

### Қорытынды:

Соңғы бес жылда ауаның ластану деңгейі сәуір айында келесідей өзгерді:



Кестеден көріп отырғанымыздай, Түркістан қаласының атмосфералық ауасының ластану деңгейі 2021- 2022жж көтеріңкі деп, 2023-2025жж жоғары деп бағаланды.

Ең жоғары қайталану көрсеткішінің артуы негізі азот диоксидінің есебінен байқалды.

#### **4.1 Кентау қаласындағы атмосфералық ауа сапасының мониторингі**

Кентау қаласы аумағында атмосфералық ауаның жай-күйін бақылау 1 автоматты станцияда жүргізіледі (1-қосымша).

Жалпы қала бойынша 3 көрсеткішке дейін анықталады: 1) күкірт диоксиді; 2) көміртегі оксиді; 3) күкірттісуге.

7-кестеде бақылау бекетінің орналасқан жері және бекеттегі анықталатын көрсеткіштер тізбесі туралы ақпарат берілген.

Кесте 7

*Анықтайтын қоспалар мен бақылау жүргізетін бекеттердің орналасқан жері*

Бекеттің номірі	Сынама алу мерзімі	Бақылау жүргізу	Бекеттің мекен-жайы	Анықталатын қоспалар
7	әр 20 минут сайын	Үзіліссіз режимде	Уалиханов көшесі, 3 «А» уч.	Көміртегі оксиді, күкірт диоксиді, күкірттісуге

#### **2025 жылдың сәуір айындағы Кентау қаласында атмосфералық ауа сапасына жүргізілген мониторинг нәтижелері.**

Кентау қаласының бақылау желісінің деректері бойынша атмосфералық ауаның ластану деңгейі **көтеріңкі** деп бағаланды, ол **СИ =1,6** (көтеріңкі деңгей) және **НП =2%** (көтеріңкі деңгей) күкірттісуге бойынша анықталды.

Ластаушы заттардың орташа бір реттік концентрациясы ШЖШ-дан аспады. Күкірттісуге максималды бір реттік концентрациясы – 1,63 ШЖШ<sub>м.р.</sub>, басқа ластаушы заттар ШЖШ-дан аспады (8-кесте).

Экстремалды жоғары және жоғары ластану (ЖЛ және ЭЖЛ) жағдайлары: ЖЛ (10 ШЖК астам) және ЭЖЛ (50 ШЖК астам) тіркелген жоқ.

Нақты мәндер, сондай-ақ сапа нормативтерінің асып кетуінің айқындылығы және асып кету жағдайларының саны 8-кестеде көрсетілген.


Кесте 8

Атмосфералық ауаның ластануының сипаттамасы

Қоспа	Орташа шоғыр		Ең үлкен бір реттік шоғыр		ЕЖК %	Асу еселігінің саны ШЖШ <sub>м.р.</sub>		
	МГ/М <sup>3</sup>	ШЖШ <sub>о.т.</sub> Асу еселігі	МГ/М <sup>3</sup>	ШЖШ <sub>м.р.</sub> Асу еселігі		>ШЖШ	>5 ШЖШ	>10 ШЖШ
				соның ішінде				
<b>Кентау қаласы</b>								
Күкірт диоксиді	0,0028	0,06	0,0197	0,04	0,00	0	0	0
Көміртегі оксиді	0,1775	0,06	2,1165	0,42	0,00	0	0	0
Күкірттісутегі	0,0013		0,013	1,63	2,41	52	0	0

### Корытынды:

Соңғы бес жылда ауаның ластану деңгейі сәуір айында келесідей өзгерді:



Кестеден көріп отырғанымыздай, Кентау қаласының атмосфералық ауасының ластану деңгейі 2022-2023жж төмен деп, 2021ж және 2024-2025жж көтеріңкі деп бағаланды.

### 4.2 2025 жылғы сәуір айындағы Түркістан облысы Сағтебе ауылдың атмосфералық ауаның сапасына мониторинг

Жалпы 4 көрсеткіш анықталынады: 1) күкірт диоксиді; 2) көміртегі оксиді; 3) азот диоксиді; 4) озон.

9-кестеде бақылау бекетінің орналасқан жері және бекеттегі анықталатын көрсеткіштер тізбесі туралы ақпарат берілген.

Кесте 9  
Анықтайтын қоспалар мен бақылау жүргізетін бекеттердің орналасқан жері

Бекет номірі	Сынама алу мерзімі	Бақылау жүргізу	Бекеттің мекен-жайы	Анықталатын қоспалар
1	әр 20 минут сайын	Үзіліссіз режимде	Сағтебе а. F. Мұратбаев көш., 1А	көміртегі оксиді, азот диоксиді, күкірттісутегі, озон

Стационарлық бақылау желісінің деректері бойынша Сағтебе ауылдың атмосфералық ауаның ластану деңгейі **төмен** деп бағаланды, ол СИ= **0,5** (төменгі деңгей) және ЕЖК = **0 %** (төменгі деңгей).

Азот диоксидінің орташа концентрациясы - 1,34 ШЖШ<sub>о.т.</sub>, озон – 1,93 ШЖШ<sub>о.т.</sub> басқа ластаушы заттар ШЖШ - дан аспады.

Ластаушы заттардың максималды бір реттік концентрациясы ШЖШ-дан аспады (10-кесте).

Экстремалды жоғары (ЭЖЛ) және жоғары ластану жағдайлары (ЖЛ және ЭЖЛ): ЖЛ (10 ШЖШ-дан жоғары), ЭЖЛ (50 ШЖШ-дан жоғары) тіркелген жоқ.

Нақты мәндер, сондай-ақ сапа стандарттарынан асу жиілігі және асып кету жағдайларының саны 10 –кестеде көрсетілген.

*Кесте-10*

Атмосфералық ауаның ластануының сипаттамасы

Қоспа	Орташа шоғыр		Ең үлкен бір реттік концентрация		ЕЖҚ %	Асу еселігінің саны ШЖШ <sub>м.р.</sub>			
	МГ/М <sup>3</sup>	ШЖШ <sub>о.т.</sub> Асу еселігі	МГ/М <sup>3</sup>	ШЖШ <sub>м.р.</sub> Асу еселігі		>ШЖШ	>5 ШЖШ	>10 ШЖШ	
						Соның ішінде			
<b>Састөбе</b>									
Азот диоксиді	0,0011	0,02	0,1496	0,30	0,00	0	0	0	
Күкірт диоксиді	0,5882	0,20	1,4355	0,29	0,00	0	0	0	
Көміртегі оксиді	0,0534	1,34	0,1017	0,51	0,00	0	0	0	
Озон	0,0578	1,93	0,0640	0,40	0,00	0	0	0	

## 5.2025 жылғы көктем мезгілінде Түркістан облысындағы топырактың ауыр металдармен ластану жай-күйі

*Көктем мезгіліндегі Шымкент қаласындағы* түрлі аудандардан алынған топырақ сынамасының құрамында қорғасын шоғыры 15,1 – 33,9 мг/кг, мыс 2,03 – 2,82 мг/кг, мырыш 3,02 – 4,56 мг/кг, хром 0,49 – 0,98 мг/кг, кадмий 2,02 – 17,4 мг/кг шамасында болды.

Ауыр металлардың ең жоғарғы көрсеткіші «Южполиметалл» ЖАҚ аумағында (0,5 км және 0,9 км қашықтықта) байқалды, мұнда қорғасын концентрациясы – 1,01 – 1,03 ШЖШ көрсетті.

Орталық саябақ, №9 мектеп аумағында және Ордабасы алаңында ауыр металдардың концентрациясы норма шегінде болды.

*Көктем мезгіліндегі Түркістан қаласында* түрлі аудандардан алынған топырақ сынамасының құрамындағы қорғасын концентрациясы 18,6 – 34,9 мг/кг, мыс 1,96 – 2,12 мг/кг, мырыш 2,67 – 3,62 мг/кг, хром 0,85 – 1,33 мг/кг, кадмий 2,67 – 3,61 мг/кг шамасында болды.

Қызылорда даңғылында қорғасын концентрациясы 1,06 ШЖШ құрады.

Қазметалпродакшн ауданында қорғасын концентрациясы 1,04 ШЖШ құрады.

Ауыр металдардың қалған концентрациясы қалыпты шектерде болды.

**Көктем мезгіліндегі Кентай қаласында** түрлі аудандарында алынған топырақ сынамасы құрамында қорғасын шоғыры 15,6 – 35,2 мг/кг, мыс 1,47 – 2,36 мг/кг, мырыш 2,87 – 7,23 мг/кг, хром 1,09 – 1,87 мг/кг, кадмий 1,54 – 9,84 мг/кг шамасында болды.

"Южполиметалл" ЖАҚ (500м) ауданында топырақ сынамаларында қорғасын бойынша – 1,07 ШЖШ құрады.

"Южполиметалл" байыту фабрикасы ауданында 1,5 км қорғасын концентрациясы – 1,05 ШЖШ құрады.

**Көктем мезгіліндегі** Түркістан облысының *Сарыагаш ауданының* әр түрлі нүктелерінде алынған топырақ сынамаларында қорғасын концентрациясы қорғасын концентрациясы 13,5 – 14,4 мг/кг, мыс 2,65 – 2,88 мг/кг, мырыш 2,98 – 3,63 мг/кг, хром 0,58-0,89 мг/кг, кадмий 0,89 – 1,34 мг/кг шегінде болды.

Ауыр металдардың құрамы норма шегінде болды.

Түркістан облысының *Мақтарап ауданынданының* әр түрлі нүктелерінде алынған топырақ сынамаларында қорғасын концентрациясы 13,8 – 14,8 мг/кг, мыс 2,02 – 2,67 мг/кг, мырыш 2,69 – 3,28 мг/кг, хром 0,56 – 0,88 мг/кг, кадмий 0,92-1,26 мг/кг шегінде болды.

Ауыр металдардың құрамы норма шегінде болды.

Түркістан облысының *Ордабасы ауданынданының* әр түрлі нүктелерінде алынған топырақ сынамаларында қорғасын концентрациясы 7,16 – 10,2 мг/кг, мыс 1,94 – 2,41 мг/кг, мырыш 1,99 – 2,87 мг/кг, хром 0,66 – 0,93 мг/кг, кадмий 1,11-1,38 мг/кг шегінде болды.

Ауыр металдардың құрамы норма шегінде болды.

Түркістан облысының *Бәйдібек ауданынданының* әр түрлі нүктелерінде алынған топырақ сынамаларында қорғасын концентрациясы 7,85 – 9,36 мг/кг, мыс 1,38 – 1,96 мг/кг, мырыш 2,06 – 2,68 мг/кг, хром 0,88-1,02 мг/кг, кадмий 1,28-1,82 мг/кг шегінде болды.

Ауыр металдардың құрамы норма шегінде болды.

## **5. Түркістан облысы аумағындағы жер үсті сулар сапасының мониторингі**

Жер үсті су сапасының жай-күйіне мониторинг 6 су объектілерінде, өзендер: Сырдария, Келес, Бадам, Арыс, Ақсу, Катта-бугун, 11 тұстамасында жүргізілді.

Жер үсті суларын зерттеу кезінде су сынамаларында су сапасының **40** физикалық және химиялық көрсеткіштері анықталады: *көзбен шолып бақылау*,

су температурасы, ерітілген оттегі, сутегі көрсеткіші, өлиенген заттар, мөлдірлік, тұз құрамының басты иондары, биогенді (азот, фосфор, темір қосылыстары) және органикалық заттар (мұнай өнімдері, фенолдар), ауыр металдар (мыс, мырыш, қорғасын, кадмий, хром, никель, сынап), пестицидтер (ДДТ, ДДЕ, ДДТ, ГХЦГ альфа және гамма).

Түптік шөгінділер сапасының мониторингі Сырдария өзенінің 2 бақылау нүктелері бойынша жүргізілді. Түптік шөгінділер сынамасында ауыр металдарға (қорғасын, кадмий, марганец, мыс, мырыш, никель, хром) және органикалық заттарға (мұнай өнімдері) талдау жүргізілді.

### **5.1 Түркістан облысы аумағындағы жер үсті сулар гидрохимиялық көрсеткіштері бойынша сапасының мониторинг нәтижелері.**

Қазақстан Республикасының су объектілерінің су сапасын бағалауга арналған негізгі нормативтік құжаттар «Су объектілерінде судың сапасын жіктеудің бірыңғай жүйесі» (бұдан әрі - Бірыңғай жіктеме) болып табылады.

Су объектілерінің су сапасы Бірыңғай жіктеме бойынша келесідей бағаланады:

3 кесте

Су объектісінің атауы	Су сапасының класы		Параметрлер	Өлш. бірл.	Концентрация
	Сәуір 2024 ж	Сәуір 2025 ж			
Сырдария өз.	–	3 класс (аz ластанған)	Сульфаттар	мг/дм <sup>3</sup>	227,357
Келес өз.	–	6 класс (қатты ластанған)	Қалқыма заттар	мг/дм <sup>3</sup>	451,2
Бадам өз.	–	6 класс (қатты ластанған)	Сульфаттар	мг/дм <sup>3</sup>	192,1
Арыс өз.	–	3 класс (аz ластанған)	Сульфаттар	мг/дм <sup>3</sup>	163,3
Аксу өз	–	3 класс (аz ластанған)	Сульфаттар	мг/дм <sup>3</sup>	144,1
Катта-бөген өз.	–	3 класс (аz ластанған)	Сульфаттар	мг/дм <sup>3</sup>	163,3

Ескертпе: \* - I класс – «ең жақсы сапа»

\*\*\*- заттар берілген клас бойынша нормаланбайды

3-кестеден көріп отырғанымыздай Сырдария, Бадам, Арыс, Ақсу және Катта-бөген өзендері 3-класқа, Келес өзені 6-сыныпқа жатады.

Түркістан облысының су объектілеріндегі негізгі ластаушы заттар сульфаттар және қалқыма заттар болып табылады. Осы көрсеткіштер бойынша сапа нормативтерінің асып кетуі негізінен тұрмыстық, өнеркәсіптік және ауылшаруашылық төгінділеріне тән.

2025 жылғы сәуір айында Түркістан облысының аумағында жоғары және экстремалды жоғары ластану жағдайлары тіркелмеді.

2 Қосымшада тұстамалар шегінде су объектілерінің сапасы бойынша ақпарат.

## 6. Радиациялық жағдай

Атмосфералық ауаның ластануының гамма сәулелену деңгейіне күнсайын жергілікті 2 метеорологиялық станцияда (Шымкент, Түркістан) бақылау жүргізілді (14.5-сур.).

Облыстың елді-мекендері бойынша атмосфералық ауа қабатының жерге жақын қабатындағы радиациялық гамма-фонның орташа мәні 0,08-0,28 мкЗв/сағ аралығында болды. Облыс бойынша радиациялық гамма-фонның орташа мәні 0,15 мкЗв/сағ, яғни шекті жол берілетін шамага сәйкес келеді.


Атмосфераның жерге жақын қабатында радиоактивтердің тұсу тығыздығына бақылау Түркістан облысының аумағында 2 метеорологиялық станцияда (Шымкент, Түркістан) ауа сынамасын горизонтальді планшеттер алу жолымен жүзеге асырылды (14.5-сур.). Барлық станцияда бес тәуліктік сынама жүргізілді.

Облыс аумағында атмосфераның жерге жақын қабатында орта тәуліктік радиоактивтердің тұсу тығыздығы 1,8-2,7 Бк/м<sup>2</sup>күрады. Облыс бойынша радиоактивті тұсулердің орташа тығыздығы 2,15 Бк/м<sup>2</sup>, бұл шекті жол берілетін деңгейінен аспады.


## Қосымша 1




## Сурет 1 - Шымкент қ. атмосфералық ауаның ластануын бақылаудың стационарлық желісінің орналасу схемасы




## Сурет 2 - Шымкент қ. атмосфералық ауаның ластануын бақылаудың экспедициалық жөлісінің орналасу схемасы




Сурет 3 – Қызылсай елді мекенінің атмосфералық ауасының ластануын бақылаудың стационарлық желісінің орналасу схемасы.




Сурет 4 – Түркістан қаласының атмосфералық ауасының ластануын бақылаудың стационарлық желісінің орналасу схемасы.



Сурет 5 - Ластануды бақылаудың стационарлық желісінің орналасу схемасы Кентау қаласының атмосфералық ауасы.



Сурет 6–Састобе елді мекенінің атмосфералық ауасының ластануын бақылаудың стационарлық желісінің орналасу схемасы.



Сурет 4 – Түркістан облысы тұстамалардың орналасу схемасы

## 2 Қосымша

### Түркістан облысы жер үсті су сапасының тұстамалар бойынша ақпараты

Су объектілері тұстамалары	және	Физика-химиялық параметрлердің сипаттамасы
Сырдария өзені		судың температурасы 12,2-19,0°C, сутегі көрсеткіші 7,8-8,0, суда еріген оттегінің концентрациясы 9,8-11,7 мг/дм <sup>3</sup> , ОБТ <sub>5</sub> мәні 1,6-2,0 мг/дм <sup>3</sup> , мөлдірлігі – 9,0-23,0 см, кермектелігі – 7,4-8,2 мг/дм <sup>3</sup>
тұстама - Кекбұлақ а. (бекеттен ССБ қарай 10,5 км)	3 класс	сульфаттар – 192,12 мг/дм <sup>3</sup> . Сульфаттардың нақты концентрациясы фондық кластан аспайды.
тұстама - Шардара т/б (Шардара б. кіре-берісінен 2,0 км төмен)	3 класс	сульфаттар – 240,15 мг/дм <sup>3</sup> . Сульфаттардың нақты концентрациясы фондық кластан аспайды.
тұстама – Азаттық а. (Сырдария өзенінің көпірі -аудылдан 5 км)	3 класс	сульфаттар – 249,8 мг/дм <sup>3</sup>
Келес өзені		судың температурасы 7,5-16,2°C, сутегі көрсеткіші 7,9-8,0, суда еріген оттегінің концентрациясы 12,3-13,1 мг/дм <sup>3</sup> , ОБТ <sub>5</sub> мәні 1,7-2,9 мг/дм <sup>3</sup> , мөлдірлігі – 7,0-20,0 см, кермектелігі – 6,4-8,6 мг/дм <sup>3</sup>
тұстама – Казыгурт а. (аудылдан 0,2 км жоғары, г/п 0,8 км жоғары)	3 класс	сульфаттар – 192,12 мг/дм <sup>3</sup> . Сульфаттардың нақты концентрациясы фондық кластан аспайды.
Келес-сағасы (сағасынан 1,2 км жоғары)	6 класс	қалқыма заттар – 871,6 мг/дм <sup>3</sup> . Қалқыма заттардың нақты концентрациясы фондық

		кластан асады.
<b>Бадам өзені</b>		судың температурасы 12,0-15,2°C, сутегі көрсеткіші 7,8, суда еріген оттегінің концентрациясы 8,1-10,1 мг/дм <sup>3</sup> , ОБТ <sub>5</sub> мәні 1,6-1,8 мг/дм <sup>3</sup> , мөлдірлігі – 14,0-18,0 см, кермектелігі – 5,0-7,0 мг/дм <sup>3</sup>
тұстама - Шымкент гидро бекеті (Шымкентен 2,0 км төмен)	3 класс	сульфаттар – 201,7 мг/дм <sup>3</sup> . Сульфаттардың нақты концентрациясы фондық кластан аспайды.
тұстама - Қараспан а. (жол көпірінен 0,1 км төмен)	3 класс	сульфаттар – 182,5 мг/дм <sup>3</sup> . Сульфаттардың нақты концентрациясы фондық кластан аспайды.
<b>Арыс өзені</b>		судың температурасы 16,5°C, сутегі көрсеткіші 7,9, суда еріген оттегінің концентрациясы – 8,5 мг/дм <sup>3</sup> , ОБТ <sub>5</sub> – 1,0 мг/дм <sup>3</sup> , мөлдірлігі – 9,0 см, кермектелігі – 7,6 мг/дм <sup>3</sup>
тұстама – Арыс қ. (жд станция)	3 класс	сульфаттар – 163,3 мг/дм <sup>3</sup> . Сульфаттардың нақты концентрациясы фондық кластан аспайды.
<b>Ақсу өзені</b>		судың температурасы 7,4-16,0°C, сутегі көрсеткіші 7,7, суда еріген оттегінің концентрациясы 8,1-8,5 мг/дм <sup>3</sup> , ОБТ <sub>5</sub> – 0,9-1,5 мг/дм <sup>3</sup> , мөлдірлігі – 22,0-25,0 см, кермектелігі – 3,8-5,2 мг/дм <sup>3</sup>
тұстама - Сарқырама а. (ауылдан оңтүстік-батысқа қарай, сағадан қаш. 52 км)	3 класс	сульфаттар – 134,5 мг/дм <sup>3</sup> . Сульфаттардың нақты концентрациясы фондық кластан асады.
тұстама - Көлкент а. (ауылдан солтүстікке қарай 1,5-2 км, су бекетінен 10 м төмен)	3 класс	сульфаттар – 153,7 мг/дм <sup>3</sup> . Сульфаттардың нақты концентрациясы фондық кластан асады.
<b>Катта-бөген өзені</b>		судың температурасы 13,8°C, сутегі көрсеткіші 7,8, суда еріген оттегінің концентрациясы – 9,1 мг/дм <sup>3</sup> , ОБТ <sub>5</sub> 1,5 мг/дм <sup>3</sup> , мөлдірлігі – 25,0 см, кермектелігі – 6,0 мг/дм <sup>3</sup>
тұстама - Жарықбас а. (ауылдан 1,5 км жоғары)	3 класс	сульфаттар – 163,3 мг/дм <sup>3</sup> . Сульфаттардың нақты концентрациясы фондық кластан асады.

Ескерте: \* - I класс – «ең жақсы сапа»

\*\*\*- заттар берілген класс бойынша нормаланбайды

### 3 Қосымша

#### Анықтамалық бөлім

#### Елді мекендердің ауасындағы ластаушы заттардың шекті рұқсат етілген концентрациясы (ШЖШ)

Қоспалардың атауы	ШЖШ мәні, мг/м3		Қауіп сыйыбы
	Максимальды бір реттік	Орташа тәуліктік	
Азот диоксиді	0,2	0,04	2
Азотоксиді	0,4	0,06	3
Аммиак	0,2	0,04	4
Бенз/а/пирен	-	0,1 мкг/100 м <sup>3</sup>	1
Қалқыма заттар (частицы)	0,5	0,15	3
Қалқыма бөлшектер PM 10	0,3	0,06	
Қалқыма бөлшектер PM 2,5	0,16	0,035	
Кадмий	-	0,0003	1
Кобальт	-	0,001	2
Марганец	0,01	0,001	2
Мыс	-	0,002	2
Күшән	-	0,0003	2
Озон	0,16	0,03	1

Корғасын	0,001	0,0003	1
Құқірт диоксиді	0,5	0,05	3
Құқірт қышқылы	0,3	0,1	2
Құқірттісүтек	0,008	-	2
Көміртегі оксиді	5,0	3	4
Фенол	0,01	0,003	2
Формальдегид	0,05	0,01	2
Хлор	0,1	0,03	2
Хром (VI)	-	0,0015	1
Цинк	-	0,05	3

«Қалалық және ауылдық жерлердегі атмосфералық ауаның гигиеналық стандарты» (СанПин №ҚР ДСМ-70 2тамыз 2022 жылдан бастап)

### Атмосфераның ластану индексінің дәрежесін бағалау

Градация	Ауаның ластануы	Көрсеткіштер	Ай сайынғы бағалау
I	Төменгі	СИ ЕЖҚ, %	0-1 0
II	Көтеріңкі	СИ ЕЖҚ, %	2-4 1-19
III	Жоғары	СИ ЕЖҚ, %	5-10 20-49
IV	Өте жоғары	СИ ЕЖҚ, %	>10 >50

РД 52.04.667–2005, Мемлекеттік органдарды, халықты және халықты ақпараттандыру үшін қалалардағы ауаның ластану жағдайы туралы құжаттар. Әзірлеуге, құрылышқа, презентацияға және мазмұнға қойылатын жалпы талаптар.

### Радиациялық қауіпсіздік стандарты\*

Стандартталған мәндер	Мөлшер шектері	
	Халық	Кез-келген 5 жыл ішінде орта есеппен жылына 1мЗв, бірақ жылына 5мЗв аспайды.
Тиімді мәндер		

\*«Радиациялық қауіпсіздікті қамтамасыз етуге қойылатын санитарлық – эпидемиологиялық талаптар »

### Су пайдалану санаттары (түрлері) бойынша су пайдалану сыйынтарын саралау

Суды пайдалану класы	Тазалау мақсаты/түрі	Су пайдалану кластары					
		1 класс	2 класс	3 класс	4 класс	5 класс	6 класс

Су экожүйелерінің қызметі	-	+	+	-	-	-	-
Балық есіру/ихтиофаунаны корғау	Албырт балық Тұқы балық	+	+	-	-	-	-
Ауыз су- шаруашылық сүмен жабдықтау және тамақ өнеркәсібі кәсіпорындарын сүмен жабдықтау	Қарапайым өндідеу Дағдылы өндідеу Қарқынды өндідеу	+	+	-	-	-	-
Мәдени-тұрмыстық су пайдалану	Туризм, спорт, демалыс, шомылу	+	+	+	-	-	-
Суару	Дайындыксыз Тұндыру карталарын пайдалану кезінде	+	+	+	+	-	-
Өнеркәсіптік су пайдалану	Технологиялық процестер, салындару процестері	+	+	+	+	+	-
Гидроэнергетика	-	+	+	+	+	+	+
Су көлігі	-	+	+	+	+	+	+
Тау-кен өндірісі	-	+	+	+	+	+	+

Ескертпе:

"+" – судың сапасы мақсатын қамтамасыз етеді;

"-" - судың сапасы мақсатын қамтамасыз етпейді.

Су объектілеріндегі су сапасын жіктеудің бірынғай жүйесі (КР СРИМ СРК 20.03.2024 ж. №70  
Бұйрығы)

#### Қосымша 4

##### Зиянды микроорганизмдердің, топырақты ластайтын басқа да биологиялық және зиянды заттардың берілетін шекті шоғырлану нормативтері

№№ п/п	Заттыңатауы	Шектірүқсатетілгенконцентрация (бұданәрі - ШРК), топырақтағыкилограмғамилиграмм	Шектеушікөрсеткіш	Ескертпе
Химиялықзаттар				
1	Марганец	1500	жалпысанитарлық	
2	Мыс	3,0 (жылжымалынысан)	жалпысанитарлық	Мыстыңжылжымалыформасы РН 4,8 ацетатты аммоний буферлікерітіндісіменалынады.
3	Мышьяк	2,0 (жалпықұрамы)	транслокациялық	ШРК фонды ескереотырыпберілген.
4	Никель	4,0 (жылжымалынысан)	жалпысанитарлық	Никельдіңжылжымалыформасы РН 4,6 ацетатты аммоний буферлікерітіндісіменалынады.
5	Сынап	2,1 (жалпымазмұны)	транслокациялық	ШРК фонды ескереотырыпберілген

6	Корғасын	32,0 (жалпықұрамы)	жалпысанитарлық	ШРК фонды ескереотырыпберілген
7	Корғасын + сынап	20,0 + 1,0 (жалпықұрамы)	транслокациялық	
8	Хром	6,0 (жылжымалынысан)	жалпысанитарлық	ШРК фонды ескереотырыпберілген. Хромныңқозгалмалыформасы РН 4,8 ацетатты аммоний буферлікерітіндісіменалынады.
9	Хром <sup>+6</sup>	0,05	жалпысанитарлық	
10	Мырыш	23,0 (жылжымалынысан)	транслокациялық	Мырыштыңжылжымалыформасы РН 4,8 ацетатты-аммоний буферліерітіндісіменалынады

**ТАБИҒИ ОРТАНЫҚ ЛАСТАНУ МОНИТОРИНГІ ЗЕРТХАНАСЫ  
"ҚАЗГИДРОМЕТ" РМК ТҮРКІСТАН ОБЛЫСЫ БОЙЫНША ФИЛИАЛЫ**

**МЕКЕН-ЖАЙЫ:  
ШЫМКЕНТ ҚАЛАСЫ  
ЖЫЛҚЫШИЕВ КӨШЕСІ, 44  
ТЕЛ. 8-(7252)-54-05-33  
E MAIL: [LMZPS\\_UKO@METEO.KZ](mailto:LMZPS_UKO@METEO.KZ)**