

Министерство экологии и природных ресурсов Республики Казахстан
Республиканское Государственное Предприятие «Казгидромет»
Филиал по Актыбинской области



ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ О СОСТОЯНИИ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ ПО АКТЮБИНСКОЙ ОБЛАСТИ.

Май 2025 год

Актобе, 2025 г

	СОДЕРЖАНИЕ	Стр.
	Предисловие	3
1	Основные источники загрязнения атмосферного воздуха	4
2	Состояние качества атмосферного воздуха в г. Актобе	4
2.1	Состояние атмосферного воздуха по данным эпизодических наблюдений г. Актобе	6
2.2	Состояние качества атмосферного воздуха в г. Хромтау	6
2.3	Состояние качества атмосферного воздуха в г. Кандыагаш	7
2.4	Состояние качества атмосферного воздуха в п. Шубарши	8
2.5	Состояние качества атмосферного воздуха в п. Кенкияк	9
3	Состояние качества поверхностных вод	12
4	Радиационная обстановка	13
5	Химический состав атмосферных осадков	13
6	Химический состав снежного покрова	14
	Приложение 1	15
	Приложение 2	19
	Приложение 3	22
	Приложение 4	23

Предисловие

Информационный бюллетень подготовлен по результатам работ, выполняемых Филиалом РГП «Казгидромет» по Актыбинской области.

Бюллетень предназначен для информирования государственных органов, общественности и населения о состоянии окружающей среды на территории Актыбинской области и необходим для дальнейшей оценки эффективности мероприятий в области охраны окружающей среды РК с учетом тенденции происходящих изменений уровня загрязнения.

Оценка качества атмосферного воздуха

1. Основные источники загрязнения атмосферного воздуха

Загрязнение воздушного бассейна области обусловлено в основном крупными предприятиями: АО «СНПС-Актобемунайгаз», ТОО «КазахойлАктобе», Актюбинский завод ферросплавов и ДГОК филиалы АО «ТНК «Казхром», АО «Интергаз Центральная Азия», УМГ «Актобе», АО «Актобе ТЭЦ». Из общего объема выбросов от стационарных источников доля выбросов от сжигания попутного газа на факелах составляет 11,67 тыс. тонн 97% всех выбросов от факельных установок приходится на 3 нефтегазодобывающие и перерабатывающие предприятия: АО «СНПС-Актобемунайгаз», ТОО «КазахойлАктобе» и ТОО «Аман Мунай».

Кроме этого, одними из основных загрязнителей атмосферного воздуха Актюбинской области являются выхлопные газы от передвижных источников.

2. Мониторинг качества атмосферного воздуха в г. Актобе.

Наблюдения за состоянием атмосферного воздуха на территории г. Актобе проводятся на 6 постах наблюдения, в том числе на 3 постах ручного отбора проб и на 3 автоматических станциях (Приложение 1).

В целом по городу определяется до 14 показателей: 1) взвешенные частицы (пыль); 2) взвешенные частицы РМ-2,5; 3) взвешенные частицы РМ-10; 4) диоксид серы; 5) оксид углерода; 6) диоксид азота; 7) оксид азота; 8) сероводород; 9) формальдегид; 10) хром; 11) бензол; 12) этилбензол; 13) толуол; 14) ортоксил.

В таблице 1 представлена информация о местах расположения постов наблюдений и перечне определяемых показателей на каждом посту.

Таблица 1

Место расположения постов наблюдений и определяемые примеси

№	Отбор проб	Адрес поста	Определяемые примеси
1	ручной отбор проб	Авиагородок 14, район аэропорта	взвешенные частицы (пыль), диоксид серы, оксид углерода, оксид азота, диоксид азота, формальдегид, хром, сероводород, бензол, этилбензол, толуол, ортоксил.
2		ул. Белинский 5, район Жилгородка	
3		ул. Ломоносова 7, район ЖД вокзала	
4	в непрерывном режиме – каждые 20 минут	ул. Рыскулова 4, район Шанхай	оксид углерода, диоксид азота, оксид азота, сероводород
5		ул. Есет батыра 109	оксид углерода, диоксид азота, оксид азота, сероводород
6		ул. Жанкожа батыра 89, район Курмыш	взвешенные частицы РМ-2,5, взвешенные частицы РМ-10, оксид углерода, диоксид азота, оксид азота

Помимо стационарных постов наблюдений в городе Актобе действует передвижная лаборатория, с помощью которой измерение качества воздуха проводится

дополнительно по 3 точкам области по 7 показателям: 1) взвешенные частицы (пыль); 2) диоксид серы; 3) оксид углерода; 4) диоксид азота; 5) оксид азота; 6) сероводород; 7) формальдегид.

Результаты мониторинга качества атмосферного воздуха в г. Актобе за май 2025 года.

Уровень загрязнения атмосферного воздуха оценивался как **высокий**, он определялся значением СИ=8,3 (высокий уровень) по сероводороду в районе поста №3 и НП=6% (повышенный уровень) по сероводороду в районе поста №3.

**Согласно РД 52.04.667-2005, если СИ и НП попадают в разные градации, то степень загрязнения атмосферы оценивается по наибольшему значению из этих показателей.*

В загрязнение атмосферного воздуха основной вклад вносит оксид углерода (количество превышений ПДК за месяц: 1 случай), сероводород (количество превышений ПДК за месяц: 130 случаев).

Максимально-разовая концентрация сероводорода составила 8,3 ПДК_{м.р.}, оксида углерода составила 1,2 ПДК_{м.р.}, концентрации остальных загрязняющих веществ не превышали ПДК.

Случаи высокого загрязнения (ВЗ) и экстремально высокого загрязнения (ЭВЗ) не обнаружены.

Фактические значения, а также кратность превышений нормативов качества и количество случаев превышения указаны в Таблице 2.

Таблица 2

Характеристика загрязнения атмосферного воздуха

Примесь	Средняя концентрация		Максимально-разовая концентрация		НП	Число случаев превышения ПДК _{м.р.}		
	мг/м ³	Кратность ПДК _{с.с.}	мг/м ³	Кратность ПДК _{м.р.}	%	>ПДК	>5 ПДК	>10 ПДК
						в том числе		
г. Актобе								
Взвешенные частицы (пыль)	0,0163	0,1088	0,1000	0,2000	0,00	0	0	0
Взвешенные частицы РМ-2,5	0,0013	0,0371	0,0013	0,0081	0,00	0	0	0
Взвешенные частицы РМ-10	0,0014	0,0240	0,0015	0,0050	0,00	0	0	0
Диоксид серы	0,0023	0,0450	0,0050	0,0100	0,00	0	0	0
Оксид углерода	0,5319	0,1773	5,9981	1,1996	0,02	1	0	0
Диоксид азота	0,0232	0,5789	0,1031	0,5155	0,00	0	0	0
Оксид азота	0,0308	0,5126	0,2751	0,6878	0,00	0	0	0
Сероводород	0,0006		0,0665	8,3125	2,77	130	0	0
Формальдегид	0,0026	0,2627	0,0040	0,0800	0,00	0	0	0
Хром (+6)	0,0003	0,2058	0,0005		0,00	0	0	0
Бензол	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,00	0	0	0
Этилбензол	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,00	0	0	0
Толуол	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,00	0	0	0
Ортоксилол	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,00	0	0	0

2.1. Состояние атмосферного воздуха по данным эпизодических наблюдений г. Актобе

Наблюдения за состоянием атмосферного воздуха города Актобе ведутся с помощью передвижной лаборатории на 3 точках: *точка №1 – п.Кирпичный, район СШ №18; точка № 2 – п.Ясный, 41 разъезд, возле школы-гимназии №41; точка №3 – Батыс 2, район СШ №64.*

На передвижной лаборатории определяются **7 показателей**: 1) взвешенные частицы (пыль); 2) сероводород; 3) формальдегид; 4) оксид азота; 5) диоксид серы; 6) диоксид азота; 7) оксид углерода. (Таблица 3).

Таблица 3

Результаты экспедиционных измерений качества атмосферного воздуха

Определяемые примеси	Ясный-2	
	Точка №1	
	мг/м³	ПДК
Взвешенные частицы (пыль)	0,0036	0,0120
Сероводород	0,0024	0,3000
Формальдегид	0,0025	0,0500
Оксид азота	0,0033	0,0083
Диоксид серы	0,0036	0,0072
Диоксид азота	0,0033	0,0165
Оксид углерода	2,0049	0,4010

2.2 Мониторинг качества атмосферного воздуха в г. Хромтау.

Наблюдения за состоянием атмосферного воздуха на территории г. Хромтау проводятся на 1 посту наблюдения.

В целом по городу определяется до 4 показателей: 1) *диоксид серы*; 2) *оксид углерода*; 3) *диоксид азота*; 4) *сероводород*.

В таблице 4 представлена информация о месте расположения поста наблюдения.

Таблица 4

Место расположения постов наблюдений и определяемые примеси

№	Отбор проб	Адрес поста	Определяемые примеси
	в непрерывном режиме – каждые 20 минут	Ул. Горького 9	диоксид серы, оксид углерода, диоксид азота, сероводород

Результаты мониторинга качества атмосферного воздуха в г.Хромтау за май 2025 года.

Уровень загрязнения атмосферного воздуха оценивался как **низкий**, он определялся значением СИ=1,2 (низкий уровень) по сероводороду и НП=0%

(низкий уровень).

Максимально-разовая концентрация сероводорода – 1,2 ПДК_{м.р.}, концентрации остальных загрязняющих веществ не превышали ПДК.

Случаи высокого загрязнения (ВЗ) и экстремально высокого загрязнения (ЭВЗ) не обнаружены.

Фактические значения, а также кратность превышений нормативов качества и количество случаев превышения указаны в Таблице 5.

Таблица 5

Характеристика загрязнения атмосферного воздуха

Примесь	Средняя концентрация		Максимально-разовая концентрация		НП	Число случаев превышения ПДК _{м.р.}		
	мг/м³	Кратность ПДК _{с.с.}	мг/м³	Кратность ПДК _{м.р.}	%	>ПДК	>5 ПДК	>10 ПДК
						в том числе		
г. Хромтау								
Диоксид серы	0,0023	0,0458	0,0850	0,1700	0,00	0	0	0
Оксид углерода	0,0496	0,0165	1,6830	0,3366	0,00	0	0	0
Диоксид азота	0,0011	0,0267	0,0456	0,2280	0,00	0	0	0
Сероводород	0,0010		0,0097	1,2125	0,09	2	0	0

2.3 Мониторинг качества атмосферного воздуха в г. Кандыагаш.

Наблюдения за состоянием атмосферного воздуха на территории г. Кандыагаш проводятся на 1 посту наблюдения.

По городу определяется 4 показателей: 1) *диоксид серы*; 2) *оксид углерода*; 3) *диоксид азота*; 4) *сероводород*.

В таблице 6 представлена информация о месте расположения поста наблюдения.

Таблица 6

Место расположения постов наблюдений и определяемые примеси

№	Отбор проб	Адрес поста	Определяемые примеси
	в непрерывном режиме – каждые 20 минут	Ул. Жабаяева 64А	диоксид серы, оксид углерода, диоксид азота, сероводород

Результаты мониторинга качества атмосферного воздуха в г.Кандыагаш за май 2025 года.

Уровень загрязнения атмосферного воздуха оценивался как **повышенный**, он определялся значением СИ=1,7 (низкий уровень) по сероводороду и НП=1% (повышенный уровень).

Максимально-разовая концентрация диоксида азота – 1,2 ПДК_{м.р.}, сероводорода – 1,7 ПДК_{м.р.}, концентрации остальных загрязняющих веществ не превышали ПДК.

Среднесуточная концентрация диоксида азота – 2,5 ПДК_{с.с.}.

Случаи высокого загрязнения (ВЗ) и экстремально высокого загрязнения (ЭВЗ) не обнаружены.

Фактические значения, а также кратность превышений нормативов качества и количество случаев превышения указаны в Таблице 7.

Таблица 7

Характеристика загрязнения атмосферного воздуха

Примесь	Средняя концентрация		Максимально-разовая концентрация		НП	Число случаев превышения ПДК _{м.р.}		
	мг/м³	Кратность ПДК _{с.с.}	мг/м³	Кратность ПДК _{м.р.}	%	>ПДК	>5 ПДК	>10 ПДК
						в том числе		
г. Кандыагаш								
Диоксид серы	0,0163	0,3254	0,2112	0,4224	0,00	0	0	0
Оксид углерода	0,0093	0,0031	1,0419	0,2084	0,00	0	0	0
Диоксид азота	0,1002	2,5038	0,2378	1,1890	0,63	14	0	0
Сероводород	0,0021		0,0134	1,6750	0,85	19	0	0

2.4 Мониторинг качества атмосферного воздуха в п.Шубарши

Наблюдения за состоянием атмосферного воздуха на территории п.Шубарши проводятся на 1 посту наблюдения.

На точке наблюдения определяется 4 показателя: 1) диоксид серы; 2) оксид углерода; 3) диоксид азота; 4) сероводород.

В таблице 8 представлена информация о месте расположения поста наблюдения.

Таблица 8

Место расположения постов наблюдений и определяемые примеси

№	Отбор проб	Адрес поста	Определяемые примеси
	в непрерывном режиме – каждые 20 минут	ул.Геолог 25Д	диоксид серы, оксид углерода, диоксид азота, сероводород

Результаты мониторинга качества атмосферного воздуха в п.Шубарши за май 2025 года.

Уровень загрязнения атмосферного воздуха оценивался как **высокий**, он определялся значением СИ=9,7 (высокий уровень) по сероводороду и НП=21% (высокий уровень).

Максимально-разовая концентрация диоксида серы – 6,0 ПДК_{м.р.}, сероводорода – 9,7 ПДК_{м.р.}, концентрации остальных загрязняющих веществ не превышали ПДК.

Среднесуточная концентрация диоксида серы – 2,8 ПДК_{с.с.}.

Случаи высокого загрязнения (ВЗ) и экстремально высокого загрязнения (ЭВЗ) не обнаружены.

Фактические значения, а также кратность превышений нормативов качества и количество случаев превышения указаны в Таблице 9.

Таблица 9

Характеристика загрязнения атмосферного воздуха

Примесь	Средняя концентраци я		Максимально- разовая концентрация		НП	Число случаев превышения ПДК _{м.р.}		
	мг/м ³	Кратно сть ПДК _{с.с.}	мг/м ³	Кратно сть ПДК _{м.р.}	%	>ПДК	>5 ПДК	>10 ПДК
						в том числе		
п.Шубарши								
Диоксид серы	0,1389	2,7790	2,9584	5,9168	7,2133	161	5	0
Оксид углерода	0,0229	0,0076	2,1535	0,4307	0,00	0	0	0
Диоксид азота	0,0363	0,9075	0,1872	0,9360	0,00	0	0	0
Сероводород	0,0063		0,0777	9,7125	20,9677	468	69	0

2.5 Мониторинг качества атмосферного воздуха в п.Кенкияк

Наблюдения за состоянием атмосферного воздуха на территории п.Кенкияк проводятся на 1 посту наблюдения.

Наточке наблюдения определяется 4 показателей: 1) диоксид серы; 2) оксид углерода; 3) диоксид азота; 4) сероводород.

В таблице 10 представлена информация о месте расположения поста наблюдения.

Таблица 10

Место расположения постов наблюдений и определяемые примеси

№	Отбор проб	Адрес поста	Определяемые примеси
	в непрерывном режиме – каждые 20 минут	ул. Алтынсарина 11 Б	диоксид серы, оксид углерода, диоксид азота, сероводород

Результаты мониторинга качества атмосферного воздуха в п.Кенкияк за май 2025 года.

Уровень загрязнения атмосферного воздуха оценивался как **высокий**, он определялся значением СИ=8,9 (высокий уровень) и НП=7% (повышенный уровень) по сероводороду.

Максимально-разовая концентрация сероводорода – 8,9 ПДК_{м.р.}, диоксида азота – 1,0 ПДК_{м.р.}, оксида углерода – 1,4 ПДК_{м.р.}, концентрации остальных загрязняющих веществ не превышали ПДК.

Среднесуточная концентрация диоксида азота – 1,7 ПДК_{с.с.}.

Случаи высокого загрязнения (ВЗ) и экстремально высокого загрязнения (ЭВЗ) не обнаружены.

Фактические значения, а также кратность превышений нормативов качества и количество случаев превышения указаны в Таблице 11.


Таблица 11

Характеристика загрязнения атмосферного воздуха

Примесь	Средняя концентраци я		Максимально- разовая концентрация		НП	Число случаев превышения ПДК _{м.р.}		
	мг/м ³	Кратно сть ПДК _{с.с.}	мг/м ³	Кратность ПДК _{м.р.}	%	>ПДК	>5 ПДК	>10 ПДК
						в том числе		
п. Кенкияк								
Диоксид серы	0,0029	0,0581	0,1837	0,3674	0,00	0	0	0
Оксид углерода	0,3473	0,1158	7,0441	1,4088	0,09	2	0	0
Диоксид азота	0,0678	1,6954	0,2028	1,0140	0,04	1	0	0
Сероводород	0,0030		0,0713	8,9125	7,35	164	31	0

Выводы:

За последние пять лет уровень загрязнения атмосферного воздуха за май:



Как видно из графика, за май в 2021-2022 и 2025 гг. наблюдался высокий, в 2023 г. повышенный, в 2024 г. очень высокий уровень загрязнения. Основной вклад в загрязнение атмосферного воздуха вносит сероводород.

Метеоусловия

Первая декада месяца большей частью периода была под влиянием циклонической деятельности, вторая и третья декада была под влиянием антициклона. Дождь наблюдался часто в первой декаде мая, всего по городу Актобе за месяц выпало 9,3 мм. Ветер юго-восточный с переходом на северо-западный 9-14, в отдельные дни порывы достигали 15-20 м/с.

3. Мониторинг качества поверхностных вод на территории Актюбинской области

Наблюдения за качеством поверхностных вод по Актюбинской области проводились на **19** створах **12** водных объектов (реки Елек, Каргалы, Эмба, Темир, Орь, Актасты, Косестек, Ойыл, Улькен Кобда, Кара Кобда, Ыргыз, озеро Шалкар).

При изучении поверхностных вод в отбираемых пробах воды определяются **42** физико-химических показателей качества: *температура, взвешенные вещества, прозрачность, водородный показатель (pH), растворенный кислород, БПК₅, ХПК, главные ионы солевого состава, биогенные элементы, органические вещества (нефтепродукты, фенолы), тяжелые металлы.*

Результаты мониторинга качества поверхностных вод на территории Актюбинской области

Основным нормативным документом для оценки качества воды водных объектов Республики Казахстан является «Единая система классификации качества воды в водных объектах» (далее – Единая Классификация).

По Единой классификации качество воды оценивается следующим образом:

Таблица 3

наименование водного объекта	класс качества воды		параметры	единица измерения	концентрация
	май 2024 год	май 2025 год			
река Елек	-	4 класс (загрязненные)	фенолы	мг/л	0,0013
			хром (6 ⁺)	мг/л	0,064
река Каргалы	-	4 класс (загрязненные)	фенолы	мг/л	0,0016
			взвешенные вещества	мг/л	12,87
река Эмба	-	4 класс (загрязненные)	фенолы	мг/л	0,0016
			взвешенные вещества	мг/л	16,955
река Темир	-	4 класс (загрязненные)	фенолы	мг/л	0,0015
река Орь	-	4 класс (загрязненные)	фенолы	мг/л	0,0016
река Актасты	-	4 класс (загрязненные)	фенолы	мг/л	0,0014
			взвешенные вещества	мг/л	15,13
река Косестек	-	4 класс (загрязненные)	фенолы	мг/л	0,0014
река Ойыл	-	4 класс (загрязненные)	фенолы	мг/л	0,0011
			хлориды	мг/л	389
река Улькен Кобда	-	4 класс (загрязненные)	фенолы	мг/л	0,0013
река Кара Кобда	-	4 класс (загрязненные)	взвешенные вещества	мг/л	13,46
			фенолы	мг/л	0,0018

река Ыргыз	-	4 класс (загрязненные)	фенолы	мг/л	0,0019
			взвешенные вещества	мг/л	17,3
			хлориды	мг/л	369

За май 2025 года реки Елек, Каргалы, Эмба, Темир, Орь, Актасты, Косестек, Ойыл, Улькен Кобда, Кара Кобда, Ыргыз относятся к 4 классу.

Основными загрязняющими веществами в водных объектах Актюбинской области являются хром (6⁺), взвешенные вещества, фенолы, хлориды.

За май 2025 года на территории Актюбинской области случаев ВЗ не обнаружено.

Информация по качеству водных объектов в разрезе створов указана в Приложении 2.

4. Радиационная обстановка

Наблюдения за уровнем гамма-излучения на местности осуществлялись ежедневно на 7 метеорологических станциях (Актобе, Караул-Кельды, Новоалексеевка, Родниковка, Уил, Шалкар, Жагабулак).

Средние значения радиационного гамма-фона приземного слоя атмосферы в Актюбинской области находились в пределах 0,02–0,20 мкЗв/ч (норматив–до 5 мкЗв/ч). В среднем по области радиационный гамма-фон составил 0,10 мкЗв/ч.

Наблюдение за радиоактивным загрязнением приземного слоя атмосферы на территории Актюбинской области проводилась на метеостанциях Актобе, Караул-Кельды, Шалкар путем пятисуточного отбора проб воздуха горизонтальными планшетами.

Среднесуточная плотность радиоактивных выпадений в приземном слое атмосферы Актюбинской области колебалась в пределах 1,6-2,6 Бк/м². Средняя величина плотности выпадений составила 2,0 Бк/м², что не превышает предельно-допустимый уровень.

5. Химический состав атмосферных осадков на территории Актюбинской области

Наблюдения за химическим составом атмосферных осадков заключались в отборе проб дождевой воды на 6 метеостанциях (Актобе, Аяккум, Жагабулак, Мугоджарская, Новороссийское, Шалкар). Концентрации всех определяемых загрязняющих веществ, в осадках не превышают предельно допустимые концентрации (ПДК).

В пробах осадков преобладало содержание сульфатов 26,21%, гидрокарбонатов 32,19%, хлоридов 10,47%, ионов кальция 13,79%, ионов натрия 7,20%, ионов магния 2,58% и ионов калия 2,67%.

Наибольшая общая минерализация отмечена на МС Шалкар – 66,2 мг/л, наименьшая – 16,1 мг/л на МС Актобе.

Удельная электропроводимость атмосферных осадков находилась в пределах от 26,6 мкСм/см (МС Актобе) до 101,9 мкСм/см (МС Шалкар).

Кислотность выпавших осадков находится в пределах от 5,91 (МС Новороссийское) до 7,01 (МС Шалкар).

6. Химический состав снежного покрова за 2024-2025 год на территории Актюбинской области


Наблюдения за химическим составом атмосферных осадков заключались в отборе проб дождевой воды на 6 метеостанциях (Актобе, Иргиз, Жагабулак, Мугоджарская, Новороссийское, Шалкар). Концентрации всех определяемых загрязняющих веществ, в осадках не превышают предельно допустимые концентрации (ПДК).

В пробах осадков преобладало содержание сульфатов 19,15%, гидрокарбонатов 41,14%, хлоридов 8,25%, ионов кальция 13,18%, ионов натрия 6,09% и ионов калия 2,68%.


Наибольшая общая минерализация отмечена на МС Шалкар – 65,79 мг/л, наименьшая – 15,12 мг/л на МС Жагабулак.

Удельная электропроводимость атмосферных осадков находилась в пределах от 25,5 мкСм/см (МС Жагабулак) до 101,0 мкСм/см (МС Шалкар).

Кислотность выпавших осадков находится в пределах от 5,50 (МС Новороссийское) до 7,18 (МС Мугоджарская).



Карта мест расположения постов наблюдения и метеостанции г. Актобе




Карта места расположения точки отбора п. Кирпичный, район СШ №18




Карта места расположения точки отбора п. Ясный, район школы-гимназии №41




Карта места расположения точки отбора на Батыс-2, район СШ №64



Карта места расположения поста наблюдения г. Хромтау



Карта места расположения поста наблюдения г. Кандыагаш



Карта места расположения поста наблюдения п. Шубарши

км ниже выхода подземных вод.		Аммоний-ион – 1,21 мг/дм ³ . Взвешенные вещества – 15,6 мг/дм ³ . Фактические концентрации фенолов, хрома (6+), взвешенных веществ не превышают фоновый класс. Фактическая концентрация аммоний-иона превышает фоновый класс.
1,0 км на юго-восток п.Целинный, на левом берегу р. Елек.	4 класс	Фенолы – 0,0013 мг/дм ³ . Аммоний-ион – 1,07 мг/дм ³ . Хром (6+) – 0,054 мг/дм ³ . Фактические концентрации фенолов, хрома (6+) не превышают фоновый класс. Фактическая концентрация аммоний-иона превышает фоновый класс.
река Каргалы	Температура воды отмечена 18°C, водородный показатель 7,98, концентрация растворенного в воде кислорода 7,65 мг/дм ³ , БПК ₅ 1,74 мг/дм ³ , запах – 0 балл.	
п. Каргалинский, в западной части поселка в 1 км ниже впадения правого притока р. Бутак:	4 класс	Фенолы – 0,0016 мг/дм ³ . Взвешенные вещества – 12,87 мг/дм ³ . Фактическая концентрация фенолов и взвешенных веществ превышает фоновый класс.
река Эмба	Температура воды отмечена 20°C, водородный показатель 7,91 – 7,96 мг/дм ³ , концентрация растворенного в воде кислорода 6,39 – 6,69 мг/дм ³ , БПК ₅ 0,53 – 0,71 мг/дм ³ , запах 0 баллов во всех створах.	
п. Жагабулак, 1,0 км на северо-запад отп. Жагабулак	4 класс	Фенолы – 0,0015 мг/дм ³ . Взвешенные вещества – 16,7 мг/дм ³ . Фактические концентрации фенолов не превышают фоновый класс. Фактические концентрации взвешенных веществ превышают фоновый класс.
п. Сага, 1,0 км к юго-западу от поселка	4 класс	Фенолы – 0,0017 мг/дм ³ . Взвешенные вещества – 17,21 мг/дм ³ . Фактическая концентрация фенолов и взвешенных веществ превышает фоновый класс.
река Темир	Температура воды отмечена в пределах 18 – 18,2°C, водородный показатель 7,96 – 7,98, концентрация растворенного в воде кислорода 6,83 – 7,14 мг/дм ³ , БПК ₅ 0,53 – 1,43 мг/дм ³ , запах – 0 баллов во всех створах.	
с.Покровское, вс. Покровское, в 400 м ниже впадения левого притока р. Чилисай	4 класс	Фенолы – 0,0016 мг/дм ³ . Фактическая концентрация фенолов не превышает фоновый класс.
с. Ленинское, в 9 км ниже селения, в 2 км ниже устья левобережного притока р. Кульден-Темир	4 класс	Фенолы – 0,0016 мг/дм ³ . Взвешенные вещества – 16,28 мг/дм ³ . Фактические концентрации фенолов не превышают фоновый класс. Фактические концентрации взвешенных веществ превышают фоновый класс.

река Орь	Температура воды 19°C, водородный показатель – 8,02, концентрация растворенного в воде кислорода – 7,45 мг/дм ³ , БПК ₅ – 0,93 мг/дм ³ , прозрачность 20 см, запах 0 балл.	
с. Бугетсай, 0,3 км ниже села, 0,2 км ниже впадения р. Богетсай	4 класс	Фенолы – 0,0016 мг/дм ³ . Фактическая концентрация фенолов не превышает фоновый класс.
река Косестек	Температура воды отмечена 16°C, водородный показатель – 7,98, концентрация растворенного в воде кислорода – 6,61, БПК ₅ – 1,57 мг/дм ³ , запах 0 балл.	
п. Кос-Естек, в юго-западной части села примерно в 1 км выше устья левого притока без названия, в 2 км ниже слияния рек Тарангул и Айтпайка	4 класс	Фенолы – 0,0014 мг/дм ³ . Фактическая концентрация фенолов не превышает фоновый класс.
река Актасты	Температура воды отмечена 17,3°C, водородный показатель – 8,01, концентрация растворенного в воде кислорода – 7,08 мг/дм ³ , БПК ₅ – 0,64 мг/дм ³ , запах 0 балл.	
п. Белогорка, на северо-восточной окраине поселка, в 9 км ниже слияния притоков Тересбутак и Теренсай, составляющих Актасты	4 класс	Взвешенные вещества – 15,13 мг/дм ³ . Фенолы – 0,0014 мг/дм ³ . Фактическая концентрация фенолов и взвешенных веществ превышает фоновый класс.
река Ойыл	Температура воды отмечена 22,1°C, водородный показатель – 7,95, концентрация растворенного в воде кислорода – 6,26 мг/дм ³ , БПК ₅ – 0,56 мг/дм ³ , запах 1 балл.	
п. Уил, на северо-восточной окраине поселка в 92 м выше автодорожного мост	4 класс	Хлориды – 389 мг/дм ³ . Фенолы – 0,0011 мг/дм ³ . Фактическая концентрация фенолов не превышает фоновый класс. Фактическая концентрация хлоридов превышает фоновый класс.
река Улькен Кобда	Температура воды 20,3°C, водородный показатель – 8,0, концентрация растворенного в воде кислорода – 6,77 мг/дм ³ , БПК ₅ – 1,39 мг/дм ³ , прозрачность 20 см, запах 0 балл.	
п. Кобда, 1 км к юго-востоку от окраины с. Новоалексеевка, в 400 м ниже железобетонного автодорожного моста	4 класс	Фенолы – 0,0013 мг/дм ³ . Фактическая концентрация фенолов не превышает фоновый класс.
река Кара Кобда	Температура воды 19°C, водородный показатель – 7,98, концентрация растворенного в воде кислорода – 6,62 мг/дм ³ , БПК ₅ – 1,22 мг/дм ³ , запах 0 балл.	
п. Альпасай, 360 м к востоку от поселка Альпасай и в 18	4 класс	Взвешенные вещества – 13,46 мг/дм ³ . Фенолы – 0,0018 мг/дм ³ .

км от слияния с рекой Сары - Хобда		Фактические концентрации фенолов, взвешенных веществ превышают фоновый класс.
река Ыргыз	Температура воды 15°C, водородный показатель – 7,97, концентрация растворенного в воде кислорода – 5,06 мг/дм ³ , БПК ₅ – 1,52 мг/дм ³ , запах 0 балл.	
с. Шенбертал, в 8 км от селения и в 1,2 км от железобетонного моста	4 класс	Фенолы – 0,0019 мг/дм ³ . Взвешенные вещества – 17,3 мг/дм ³ . Хлориды – 369 мг/дм ³ . Фактическая концентрация взвешенных веществ, фенолов и хлоридов превышают фоновый класс.

Приложение 3

Результаты качества поверхностных вод озер на территории Актюбинской области

№	наименование ингредиентов	единицы измерения	май 2025 год
			озеро Шалкар
1	Визуальные наблюдения		
2	Температура	°C	18
3	Водородный показатель		8,0
4	Растворенный кислород	мг/дм ³	9,21
5	Запах воды	балл	0
6	БПК ₅	мг/дм ³	1,47
7	ХПК	мг/дм ³	19,63
8	Взвешенные вещества	мг/дм ³	9,78
9	Гидрокарбонаты	мг/дм ³	140
10	Жесткость	мг/дм ³	3,9
11	Минерализация	мг/дм ³	442
12	Натрий + калий	мг/дм ³	62
13	Сухой остаток	мг/дм ³	700
14	Кальций	мг/дм ³	56
15	Магний	мг/дм ³	13
16	Сульфаты	мг/дм ³	86
17	Хлориды	мг/дм ³	85
18	Фосфат	мг/дм ³	0,016
19	Фосфор общий	мг/дм ³	0,033
20	Азот нитритный	мг/дм ³	0,003
21	Азот нитратный	мг/дм ³	0,002
22	Железо общее	мг/дм ³	0,02
23	Аммоний солевой	мг/дм ³	1,14
24	Свинец	мг/дм ³	0,002
25	Медь	мг/дм ³	0,001
26	Цинк	мг/дм ³	0,001

27	АПАВ /СПАВ	мг/дм ³	0,01
28	Фенолы	мг/дм ³	0,0018
29	Нефтепродукты	мг/дм ³	0,01

Приложение 4

Справочный раздел

Предельно-допустимые концентрации (ПДК) загрязняющих веществ в воздухе населенных мест

Наименование примесей	Значения ПДК, мг/м ³		Класс опасности
	максимально разовая	средне-суточная	
Азота диоксид	0,2	0,04	2
Азота оксид	0,4	0,06	3
Аммиак	0,2	0,04	4
Бенз/а/пирен	-	0,1 мкг/100 м ³	1
Бензол	0,3	0,1	2
Бериллий	0,09	0,00001	1
Взвешенные вещества (частицы)	0,5	0,15	3
Взвешенные частицы РМ 10	0,3	0,06	
Взвешенные частицы РМ 2,5	0,16	0,035	
Хлористый водород	0,2	0,1	2
Кадмий	-	0,0003	1
Кобальт	-	0,001	2
Марганец	0,01	0,001	2

Медь	-	0,002	2
Мышьяк	-	0,0003	2
Озон	0,16	0,03	1
Свинец	0,001	0,0003	1
Диоксид серы	0,5	0,05	3
Серная кислота	0,3	0,1	2
Сероводород	0,008	-	2
Оксид углерода	5,0	3	4
Фенол	0,01	0,003	2
Формальдегид	0,05	0,01	2
Фтористый водород	0,02	0,005	2
Хлор	0,1	0,03	2
Хром (VI)	-	0,0015	1
Цинк	-	0,05	3

Приказ Министра здравоохранения Республики Казахстан от 2 августа 2022 года №ҚР ДСМ-70. Зарегистрирован в Министерстве юстиции Республики Казахстан 3 августа 2022 года № 29011.

Оценка степени индекса загрязнения атмосферы

Градации	Загрязнение	Показатели	Оценка за месяц
I	Низкое	СИ НП, % ИЗА	0-1 0 0-4
II	Повышенное	СИ НП, % ИЗА	2-4 1-19 5-6
III	Высокое	СИ НП, % ИЗА	5-10 20-49 7-13
IV	Очень высокое	СИ НП, % ИЗА	>10 >50 >14

РД 52.04.667–2005, Документы состояния загрязнения атмосферы в городах для информирования государственных органов, общественности и населения. Общие требования к разработке, постороению, изложению и содержанию

Дифференциация классов водопользования по категориям (видам) водопользования

Категория (вид) водопользования	Назначение/тип очистки	Классы водопользования					
		1 класс	2 класс	3 класс	4 класс	5 класс	6 класс
Рыбохозяйственное водопользование	Лососевые	+	+	-	-	-	-
	Карповые	+	+	-	-	-	-
Хозяйственно-питьевое водопользование	Простая водоподготовка	+	+	-	-	-	-
	Обычная водоподготовка	+	+	+	-	-	-

	Интенсивная водоподготовка	+	+	+	+	-	-
Рекреационное		+	+	+	-	-	-

водопользование (культурно-бытовое)							
Орошение	Без подготовки	+	+	+	+	-	-
	Отстаивание в картах	+	+	+	+	+	+
Промышленность:							
технологиче ские цели, процессы охлаждения		+	+	+	+	-	-
гидроэнергетика		+	+	+	+	+	+
добыча поле зных ископаемых		+	+	+	+	+	+
транспорт		+	+	+	+	+	+

Единая система классификации качества воды в водных объектах (Приказ КВР МСХ №70 от 20.03.2024)

Норматив радиационной безопасности*

Нормируемые величины	Пределы доз
Эффективная доза	Население
	1 мЗв в год в среднем за любые последовательные 5 лет, но не более 5 мЗв в год

*«Санитарно-эпидемиологические требования к обеспечению радиационной безопасности»

Нормативы предельно-допустимых концентраций вредных веществ, загрязняющих почву

Наименование вещества	Предельно-допустимая концентрация (далее - ПДК) мг/кг в почве
Свинец	32,0
Хром	6,0

* Об утверждении Гигиенических нормативов к безопасности среды обитания» Приказ Министра здравоохранения Республики Казахстан от 21 апреля 2021 года № ҚР ДСМ-32

ФИЛИАЛ РГП «КАЗГИДРОМЕТ» ПО АКТЮБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

АДРЕС:

ГОРОД АКТОБЕ
УЛ. АВИАГОРОДОК 14 В
ТЕЛ. 8-(7132)-22-85-72.

E MAIL:HIMLABACGM@MAIL.RU