

Информационный Бюллетень о состоянии окружающей среды г. Алматы

Апрель 2021 г.



Филиал РГП «Казгидромет» по г. Алматы
Министерства экологии, геологии и
природных ресурсов
Республики Казахстан

	СОДЕРЖАНИЕ	Стр.
	Предисловие	3
1	Основные источники загрязнения атмосферного воздуха	4
2	Состояние качества атмосферного воздуха	4
3	Химический состав атмосферных осадков	9
4	Состояние качества поверхностных вод	10
5	Состояние загрязнения почв тяжёлыми металлами	11
6	Радиационная обстановка	11
	Приложение 1	13
	Приложение 2	14
	Приложение 3	15

Предисловие

Информационный бюллетень подготовлен по результатам работ, выполняемых специализированными подразделениями РГП «Казгидромет» по ведению мониторинга за состоянием окружающей среды на наблюдательной сети национальной гидрометеорологической службы.

Бюллетень предназначен для информирования государственных органов, общественности и населения о состоянии окружающей среды на территории г.Алматы и необходим для дальнейшей оценки эффективности мероприятий в области охраны окружающей среды РК с учетом тенденции происходящих изменений уровня загрязнения.

Оценка качества атмосферного воздуха г. Алматы

1. Основные источники загрязнения атмосферного воздуха

Статистические данные: суммарный фактический выброс предприятий – 46 062,23 тонны. Количество стационарных источников на предприятиях, осуществляющих выбросы – 10 359 единиц. Количество источников теплоснабжения (котельных и ТЭЦ) – 151 единица, на них установлено 500 энергоустановок.

По данным Управления зеленой экономики, количество частных домов в г.Алматы составляет – 151 059 единиц. Из них на газовом отоплении – 149 211 ед.

В городе Алматы зарегистрировано 517 500 единиц автотранспортных средств, из них: легковые автомобили – 466 803 единиц и составляют 90,2% от общего количества АТС, автобусы – 9 587 единиц, что составляет 1,8%, грузовые автомобили – 33 528 единиц и составляют 6,4%, специальная техника – 1 395 единиц и составляет 0,3% и мототранспорт – 6 186 единиц, что составляет 1,2%. Ежегодно происходит увеличение количества автотранспорта на 1 768 единиц.

2. Мониторинг качества атмосферного воздуха в г. Алматы

Наблюдения за состоянием атмосферного воздуха на территории г. Алматы проводятся на 16 постах наблюдения, в том числе на 5 постах ручного отбора проб и на 11 автоматических станциях (Приложение 1).

В целом по городу определяются **18 показателей**: 1) взвешенные частицы (пыль); 2) взвешенные частицы РМ-2,5; 3) взвешенные частицы РМ-10; 4) диоксид серы; 5) оксид углерода; 6) диоксид азота; 7) оксид азота; 8) фенол; 9) формальдегид; 10) озон; 11) кадмий; 12) медь; 13) мышьяк; 14) свинец; 15) хром (6+); 16) никель; 17) Цинк; 18) бенз(а)пирен.

В таблице 1 представлена информация о местах расположения постов наблюдений и перечне определяемых показателей на каждом посту.

Таблица 1

Место расположения постов наблюдений и определяемые примеси

Номер поста	Сроки отбора	Проведения наблюдений	Адрес поста	Определяемые примеси
1	4 раза в сутки	ручной отбор проб	ул. Амангельды, угол ул. Сатпаева	взвешенные частицы (пыль), диоксид серы, оксид углерода, диоксид азота, бенз(а)пирен, фенол, формальдегид.
12	3 раза в сутки	ручной отбор проб	пр. Райымбека, угол ул. Наурызбай батыра	
16			м-н Айнабулак-3	
25			м-н Аксай-3, ул. Маречека, угол ул. Б.Момышулы	
26			м-н Тастак-1, ул. Толе би, 249, ГУ «городская детская поликлиника №8»	

Номер поста	Сроки отбора	Проведения наблюдений	Адрес поста	Определяемые примеси
1	каждые 20 минут	в непрерывном режиме	Бостандыкский район, терр. Казахского национального университета им.Аль-Фараби	взвешенные частицы РМ-2,5, взвешенные вещества РМ-10, диоксид серы, оксид углерода, диоксид и оксид азота, озон.
2			Илийский район, Бурундайское автохозяйство, улица Аэродромная	
3			Алатауский район, ледовая арена «Алматы арена» по улице Момышулы	
4			Турксибский район, район 70 разъезда, общеобразовательная школа №32	
5			Медеуский район, ледовая арена «Халык арена», микрорайон «Думан»	
6			Жетысуский район, терр. Жетысуского акимата, микрорайон «Кулагер»	
27			метеостанция Медео, ул. Горная, 548	
28			аэрологическая станция (район Аэропорта) ул. Ахметова, 50	
29			РУВД Турксибского района, ул. Р. Зорге,14	
30			м-н «Шанырак», школа №26, ул. Жанкожа батыра, 202	
31			пр.Аль-Фараби, угол ул.Навои, м-н Орбита (территория Дендропарка АО «Зеленстрой»)	

Результаты мониторинга качества атмосферного воздуха в г. Алматы за апрель 2021 года.

По данным стационарной сети наблюдений уровень загрязнения атмосферного воздуха города, в целом оценивался как **высокий уровень загрязнения**, он определялся значением НП равным 20% (высокий уровень) в районе поста №1 (ул. Амангельды, угол ул. Сатпаева;) по концентрации диоксида азота и значением СИ=2,7 (повышенный уровень) в районе поста №3 (Алатауский район, ледовая арена «Алматы арена» по улице Момышулы) по концентрации взвешенных частиц РМ-2,5.

Максимально-разовые концентрации составили: взвешенные частицы(пыль)-1,2 ПДК_{м.р.}, взвешенные частицы РМ-2,5–2,7 ПДК_{м.р.}, взвешенные частицы РМ-10–2,1 ПДК_{м.р.}, диоксида серы -1,8 ПДК_{м.р.}, оксид углерода – 2,2 ПДК_{м.р.}, диоксида азота–1,7 ПДК_{м.р.},оксида азота–2,5 ПДК_{м.р.}, озон-1,9 ПДК_{м.р.}. Концентрации остальных загрязняющих веществ не превышали ПДК_{м.р.}

Превышения по среднесуточным нормативам наблюдались по следующим показателям: диоксид азота -1,6 ПДК_{с.с.}, формальдегид -1,0 ПДК_{с.с.}, озон-1,1 ПДК_{с.с.}. По другим показателям превышений ПДК_{с.с.} не наблюдалось.

Случаи экстремально высокого и высокого загрязнения (ВЗ и ЭВЗ): ВЗ (более 10 ПДК) и ЭВЗ (более 50 ПДК) не были отмечены.

Фактические значения, а также кратность превышений нормативов качества и количества случаев превышения указаны в Таблице 2.


Таблица 2

Характеристика загрязнения атмосферного воздуха

Примесь	Средняя концентрация		Максимальная разовая концентрация		НП	Число случаев превышения ПДК _{м.р.}		
	мг/м ³	Кратность ПДК _{с.с.}	мг/м ³	Кратность ПДК _{м.р.}	%	>ПДК	>5 ПДК	>10 ПДК
г. Алматы								
Взвешенные частицы (пыль)	0,089	0,6	0,610	1,2	1,3	1		
Взвешенные частицы РМ-2,5	0,023	0,7	0,432	2,7	3,8	148		
Взвешенные частицы РМ-10	0,034	0,6	0,616	2,1	2,8	71		
Диоксид серы	0,026	0,5	0,884	1,8	2,3	49		
Оксид углерода	0,743	0,2	11,218	2,2	3,9	87		
Диоксид азота	0,064	1,6	0,340	1,7	20,2	112		
Оксид азота	0,018	0,3	0,987	2,5	3,4	74		
Фенол	0,001	0,2	0,005	0,5				
Формальдегид	0,010	1,0	0,032	0,6				
Озон	0,034	1,1	0,308	1,9	2,4	52		
Бенз(а)пирен	0,0002	0,2						
Кадмий	0,001	0,00						
Свинец	0,015	0,05						
Мышьяк	0,001	0,00						
Хром	0,005	0,00						
Медь	0,020	0,01						
Никель	0,002	0,00						
Цинк	0,001	0,00						

Выводы:

За последние пять лет уровень загрязнения атмосферного воздуха в апреле изменялся следующим образом:



Как видно из графика, уровень загрязнения в апреле месяце за последние пять лет был на уровне «повышенный» и «высокий».

Наибольшее количество превышений максимально-разовых ПДК было отмечено по взвешенным частицам РМ-2,5 (148) и РМ-10 (71), диоксид серы (49) оксид углерода (87), диоксид азота (112), оксид азота (74), озон (52).

Превышения нормативов среднесуточных концентраций наблюдались по диоксид азоту, формальдегиду, озону (**больше всего отмечено по диоксиду азота**).

Загрязнение взвешенными частицами, в основном, характерно для зимнего сезона, сопровождающегося влиянием выбросов от теплоэнергетических предприятий и процессом отопления частного сектора.

Увеличение показателя *наибольшей повторяемости* отмечено в основном за счет взвешенных частиц (пыль), взвешенных частиц РМ-2,5, РМ-10, диоксида и оксида азота, оксида углерода, диоксида серы, что свидетельствует о значительном вкладе автотранспорта в загрязнение воздуха.

Метеорологические условия.

В апреле 2021 г. в городе наблюдалось значительное влияние антициклона, при котором погода была преимущественно без осадков. С прохождением атмосферных фронтов, в начале первой и третьей декады, в городе прошли осадки, преимущественно в виде снега. Всего за месяц выпало 113,2 мм, что больше месячной нормы. Температура воздуха в течение месяца колебалась ночью от 0-5 мороза до 13-18 тепла, днем от 2-7 тепла до 25-30 тепла.

Мониторинг качества атмосферного воздуха в г. Алматы по **9 датчикам Павла Александрова (Плотицына)**.

Определяются **2 показателя**: 1) взвешенные частицы РМ-2,5; 2) взвешенные частицы РМ-10.

Место расположения постов наблюдений и определяемые примеси

Номер поста	Сроки отбора	Проведения наблюдений	Адрес поста	Определяемые примеси
ПА4312603	каждые 30 минут	в непрерывном режиме	Акан Серы, 159Б (район роши Баума)	взвешенные частицы РМ-2,5, взвешенные вещества РМ-10
ПА4439475			Курчатова, 1Б (район Райымбека и Утеген Батыра)	
ПА7723955			Камышинская, 108 (район Аэропорта)	
ПА4438736			Мамыр 1, дом 27	
ПА39168240			Карасу, 6-я, 122	
ПА5			Толе би, 159	
ПА6			Розыбакиева, 270	
ПА38834077			Тимирязева, 28в	
ПА12			НИИ астрофизики им. В.Г. Фесенкова	

Характеристика загрязнения атмосферного воздуха датчиков ПА

Примесь	Средняя концентрация (Q _{мес.})		Максимальная разовая концентрация (Q _м)		НП	Число случаев превышения ПДК _{м.р.}		
	мг/м ³	Кратность превышения ПДК _{сс}	мг/м ³	Кратность превышения ПДК _{м.р.}		%	>ПДК	>5 ПДК
г. Алматы								
Взвешенные частицы РМ-2,5	0,0146	0,42	0,7566	4,73	4,0	53		
Взвешенные частицы РМ-10	0,0200	0,33	1,2836	4,28	0,9	12		

Мониторинг качества атмосферного воздуха в г.Алматы по 10 датчикам ТОО «Экосервис-С».

Определяются 5 показателей: 1) взвешенные частицы РМ-2,5; 2) взвешенные частицы РМ-10; 3) диоксид серы; 4) оксид углерода; 5) диоксид азота.

Место расположения постов наблюдений и определяемые примеси

Номер поста	Сроки отбора	Проведения наблюдений	Адрес поста	Определяемые примеси
Alm 001	каждые 20 минут	в непрерывном режиме	Усть-Каменаторская 1/1, детский сад №130	взвешенные частицы РМ-2,5, взвешенные вещества РМ-10, диоксид серы, оксид углерода, диоксид азота.
Alm 002			ул. Шевченко 162 К. детский сад №11	
Alm 003			Наурызбайский район города Алматы м-он Шугыла, д 340/1	
Alm 004			Кенсай №1 кладбище ул. Сарсенбайева 48	

Номер поста	Сроки отбора	Проведения наблюдений	Адрес поста	Определяемые примеси
Alm 005			Медеуский район города Алматы, ул. Пушкина, д1 общеобразовательная школа №52	
Alm 006			Турксибский район, города Алматы, ул. Дегдар, д.34 г.к.к.п.ясли-сад №149	
Alm 007			Алатауский район. Города Алматы. М-он Шапагат к.г.у. ул. Биянху, д 87 к.г.у. общеобразовательная школа №150 им. М.Хамраева	
Alm 008			Алмалинский р-он, города Алматы ул. Туркебаева. Д 93, школа -гимназия №144	
Alm 009			Школа - гимназия №86 Г. Мусрепова 6 мкр. -63 дом	
Alm 010			Alm 010 Ауэзовский р-н, города Алматы, мкр. Аксай -3 А, д.71. Карекционный ясли сад №66 для детей с тяжелыми нарушениями речи	

Характеристика загрязнения атмосферного воздуха датчиков ТОО «Экосервис-С»

Примесь	Средняя концентрация (Q _{мес.})		Максимальная разовая концентрация (Q _м)		НП %	Число случаев превышения ПДК _{м.р.}		
	мг/м ³	Кратность превышения ПДК _{с.с}	мг/м ³	Кратность превышения ПДК _{м.р}		>ПДК	>5 ПДК	>10 ПДК
г. Алматы								
Взвешенные частицы РМ-2,5	0,015	0,4	1,641	10,3	1,1	23	1	1
Взвешенные частицы РМ-10	0,020	0,3	0,429	1,4	0,3	5		
Диоксид серы	0,054	1,1	0,979	2,0	6,8	135		
Оксид углерода	0,436	0,1	4,326	0,9	0,0			
Диоксид азота	0,059	1,5	0,241	1,2	0,7	14		

3. Химический состав атмосферных осадков

Наблюдения за химическим составом атмосферных осадков заключались в отборе проб дождевой воды на 4 метеостанциях (Алматы, Есик, Капчагай, Мынжылки).

Концентрации всех определяемых загрязняющих веществ в осадках не превышают предельно допустимые концентрации (ПДК).

В пробах осадков преобладало содержание гидрокарбонатов 23,44%, сульфатов 30,27%, ионов кальция 13,61%, хлоридов 11,01%, ионов натрия 6,86 %.

Наибольшая общая минерализация отмечена на МС Есик – 59,78 мг/л, наименьшая на МС Капчагай – 16,71мг/л.

Удельная электропроводимость атмосферных осадков находилась в пределах от 28,00 (МС Капчагай) до 99,60 мкСм/см (МС Есик).

Кислотность выпавших осадков имеет характер слабокислой среды и находится в пределах от 4,72 (МС Мынжылкы) до 6,11 (МС Алматы).

4. Мониторинг качества поверхностных вод на территории города Алматы.

Наблюдения за качеством поверхностных вод по г. Алматы проводились на 8 створах 3 водных объектов (реки Киши Алматы, Есентай, Улькен Алматы).

При изучении поверхностных вод в отбираемых пробах воды определяются **31** физико-химических показателя качества: *температура, взвешенные вещества, прозрачность, водородный показатель (pH), растворенный кислород, БПК₅, ХПК, главные ионы солевого состава, биогенные элементы, органические вещества (нефтепродукты, фенолы), тяжелые металлы.*

Результаты мониторинга качества поверхностных вод на территории города Алматы

Основным нормативным документом для оценки качества воды водных объектов Республики Казахстан является «Единая система классификации качества воды в водных объектах» (далее – Единая Классификация).

По Единой классификации качество воды оценивается следующим образом:

Таблица 3

Наименование водного объекта	Класс качества воды		Параметры	ед. изм.	Концентрация
	апрель 2020 г.	апрель 2021г.			
река Киши Алматы	3класс	3 класс	Аммоний ион	мг/дм ³	0,81
река Есентай	2 класс	5 класс**	Взвешенные вещества	мг/дм ³	57,5
река Улкен Алматы	2класс	4 класс	Аммоний ион	мг/дм ³	1,09

Как видно из таблицы, в сравнении с апрелем 2020 года качество поверхностных вод реки Киши Алматы - существенно не изменилось; рек Есентай, Улкен Алматы- ухудшилось.

Основными загрязняющими веществами в водных объектах города Алматы являются взвешенные вещества, аммоний ион. Превышения нормативов качества по данным показателям в основном характерны для сбросов сточных городских вод в условиях многочисленного населения.

Информация по качеству водных объектов в разрезе створов указана в Приложении 2.

5. Состояние загрязнения почв тяжёлыми металлами г. Алматы

В городе Алматы в пробах почвы, отобранных в различных районах, содержание хрома находилось в пределах 0,15-0,96 мг/кг, меди – 0,36-1,9 мг/кг, цинка – 4,8-15,6 мг/кг, свинца – 12,3-38,5 мг/кг, кадмия – 0,11-0,62 мг/кг.

В пробах почв, отобранных по улице Майлина в районе автоцентра «Mercur» и в районе Аэропорта было обнаружено превышение ПДК по свинцу -1,2. Концентрация свинца в 0,5 км ниже оз. Сайран составила 1,04 ПДК.

В районах парковой зоны Казахстанского Национального Университета, на пересечении пр-та Абая и пр-та Сейфуллина, роци Баума, и в микрорайоне Дорожник, содержание определяемых тяжелых металлов за весенний период находилось в пределах нормы.

6. Радиационная обстановка

Наблюдения за уровнем гамма излучения на местности осуществлялись ежедневно 1-ой метеорологической станцией г. Алматы. (Приложение 1).

Средние значения радиационного гамма-фона приземного слоя атмосферы по г. Алматы находились в пределах 0,19 мкЗв/ч.

Наблюдения за радиоактивным загрязнением приземного слоя атмосферы на территории г. Алматы осуществлялись на 1-ой метеорологической станции г. Алматы путем отбора проб воздуха горизонтальными планшетами. На станции проводился пятисуточный отбор проб.

Среднесуточная плотность радиоактивных выпадений в приземном слое атмосферы г. Алматы колебалась в пределах 1,4-2,0 Бк/м². Средняя величина плотности радиоактивных выпадений по городу Алматы составила 1,8 Бк/м², что не превышает предельно-допустимый уровень.




Рис.1 Схема расположения стационарной сети наблюдений за загрязнением атмосферного воздуха города Алматы



Рис. 2 - Схема расположения метеостанций по наблюдениям уровня радиационного гамма-фона и плотности радиоактивных выпадений на территории Алматинской области

Информация о качестве поверхностных вод г. Алматы по створам

Водный объект и створ	Характеристика физико-химических параметров	
река Киши Алматы	температура воды отмечена в пределах 4-10,1 °С, водородный показатель 7,49-7,99, концентрация растворенного в воде кислорода – 9,7-10,9 мг/дм ³ , БПК ₅ – 0,70-1,0 мг/дм ³ .	
створ г. Алматы 11 км выше города.	1 класс	
створ г. Алматы пр. Рыскулова 0,2 км выше моста.	3 класс	магний – 25,3 мг/дм ³ , фосфор общий- 0,24 мг/дм ³ , аммоний ион- 0,97 мг/дм ³ , Фактическая концентрация магния, фосфора общего, аммония иона превышает фоновый класс.
створ г. Алматы 4.0 км ниже города.	5 класс	взвешенные вещества – 139 мг/дм ³ . Фактическая концентрация взвешенных веществ превышает фоновый класс.
река Есентай	температура воды отмечена в пределах 5,7-6,8 °С, водородный показатель – 7,73-7,81, концентрация растворенного в воде кислорода – 10,3-11,0 мг/дм ³ , БПК ₅ – 1-1,2 мг/дм ³ .	
створ г. Алматы пр. Аль-Фараби; 0,2 км выше моста.	5 класс	взвешенные вещества – 58 мг/дм ³ . Фактическая концентрация взвешенных веществ превышает фоновый класс.
створ г. Алматы пр. Рыскулова; 0,2 км выше моста.	5 класс	взвешенные вещества – 57 мг/дм ³ . Фактическая концентрация взвешенных веществ превышает фоновый класс.
р.Улкен Алматы	температура воды отмечена в пределах 5,3-8,4 °С, водородный показатель 7,7-7,91, концентрация растворенного в воде кислорода – 10,7-11,0 мг/дм ³ , БПК ₅ – 0,8-1,5 мг/дм ³ .	
створ г. Алматы 9,1 км выше города.	4 класс	взвешенные вещества – 15,0 мг/дм ³ . Фактическая концентрация взвешенных веществ превышает фоновый класс.
створ г. Алматы 0,5 км ниже оз. Сайран.	4 класс	аммоний ион – 1,07 мг/дм ³ . Фактическая концентрация аммония иона превышает фоновый класс.
створ г. Алматы 0,2 км выше автодорожного моста, пр. Рыскулова.	4 класс	аммоний ион – 1,17 мг/дм ³ . Фактическая концентрация аммония иона превышает фоновый класс.

Приложение 3

Справочный раздел Предельно - допустимые концентрации (ПДК) загрязняющих веществ в воздухе

Наименование примесей	Значения ПДК, мг/м ³		Класс Опасности
	максимально разовая	средне-суточная	
Азота диоксид	0,2	0,04	2
Азота оксид	0,4	0,06	3
Аммиак	0,2	0,04	4
Бенз/а/пирен	-	0,1 мкг/100 м ³	1
Бензол	0,3	0,1	2
Бериллий	0,09	0,00001	1
Взвешенные вещества (частицы)	0,5	0,15	3
Взвешенные частицы РМ 10	0,3	0,06	
Взвешенные частицы РМ 2,5	0,16	0,035	
Хлористый водород	0,2	0,1	2
Кадмий	-	0,0003	1
Кобальт	-	0,001	2
Марганец	0,01	0,001	2
Медь	-	0,002	2
Мышьяк	-	0,0003	2
Озон	0,16	0,03	1
Свинец	0,001	0,0003	1
Диоксид серы	0,5	0,05	3
Серная кислота	0,3	0,1	2
Сероводород	0,008	-	2
Оксид углерода	5,0	3	4
Фенол	0,01	0,003	2
Формальдегид	0,05	0,01	2
Фтористый водород	0,02	0,005	2
Хлор	0,1	0,03	2
Хром (VI)	-	0,0015	1
Цинк	-	0,05	3

«Гигиенический норматив к атмосферному воздуху в городских и сельских населенных пунктах» (СанПин №168 от 28 февраля 2015 года)

Оценка степени индекса загрязнения атмосферы

Градации	Загрязнение атмосферного воздуха	Показатели	Оценка за месяц
I	Низкое	СИ НП, %	0-1 0
II	Повышенное	СИ НП, %	2-4 1-19
III	Высокое	СИ НП, %	5-10 20-49
IV	Очень высокое	СИ НП, %	>10 >50

РД 52.04.667–2005, Документ состояния загрязнения атмосферы в городах для информирования государственных органов, общественности и населения. Общие требования к разработке, постороению, изложению и содержанию

Дифференциация классов водопользования по категориям (видам) водопользования

Категория (вид) водопользования	Назначение/тип очистки	Классы водопользования				
		1 класс	2 класс	3 класс	4 класс	5 класс
Рыбохозяйственное водопользование	Лососевые	+	+	-	-	-
	Карповые	+	+	-	-	-
Хозяйственно-питьевое водопользование	Простая водоподготовка	+	+	-	-	-
	Обычная водоподготовка	+	+	+	-	-
	Интенсивная водоподготовка	+	+	+	+	-
Рекреационное водопользование (культурно-бытовое)		+	+	+	-	-
Орошение	Без подготовки	+	+	+	+	-
	Отстаивание в картах	+	+	+	+	+
Промышленность:						
технологические цели, процессы охлаждения		+	+	+	+	-
гидроэнергетика		+	+	+	+	+
добыча полезных ископаемых		+	+	+	+	+
транспорт		+	+	+	+	+

Единая система классификации качества воды в водных объектах (Приказ КВР МСХ №151 от 09.11.2016)

Норматив радиационной безопасности*

Нормируемые величины	Пределы доз
Эффективная доза	Население
	1 мЗв в год в среднем за любые последовательные 5 лет, но не более 5 мЗв в год

*«Санитарно-эпидемиологические требования к обеспечению радиационной безопасности»

**ДЕПАРТАМЕНТ ЭКОЛОГИЧЕСКОГО МОНИТОРИНГА
РГП «КАЗГИДРОМЕТ»**

АДРЕС:

ГОРОД АЛМАТЫ

АБАЯ 32

ТЕЛ. 8-(7272)-2675233 (внутр. 732)

E MAIL:OHAINACHALM@METEO.KZ