

Краткий агрометеорологический обзор за 2-ю декаду июля 2025 года.

Во второй декаде июля в зерносеющих регионах страны средняя температура воздуха в основном была около и ниже нормы, выше нормы на западе, осадков выпало меньше нормы, около нормы в Восточно-Казахстанской области.

На севере республики у яровых зерновых культур отмечается фаза развития «цветение» - «колошение», в отдельных районах «молочная спелость». Состояние яровой пшеницы в основном хорошее и отличное, местами удовлетворительное. Проводится обработка полей гербицидами и ядохимикатами против вредителей, болезней и сорной растительности.

На западе на посевах яровой пшеницы наблюдаются фазы развития «цветение» - «молочная и восковая спелость», в отдельных участках «полная спелость». Состояние ярового ячменя в основном хорошее и удовлетворительное.

На востоке в Бородулихинском и Уржарском районах Абайской области на посевах яровой пшеницы наблюдается фаза развития «молочная спелость» - «восковая и полная спелость», в окрестности метеостанции Дмитриевка Бородулихинского района на посевах ярового ячменя наблюдается фаза развития «полная спелость», состояние ярового ячменя отличное. В Восточно-Казахстанской области на посевах яровой пшеницы наблюдается фаза развития «колошение» - «молочная спелость», в окрестности агропоста Первороссийское в районе Алтай и станции Саратовка Уланского района «цветение». Состояние растений отличное и хорошее.

В центре на посевах яровой пшеницы наблюдаются фазы развития «цветение» - «молочная спелость», на отдельных полях «восковая спелость», на поздних посевах «образование узловых корней» - «кущение». Состояние растений в основном хорошее и удовлетворительное.

На юге и юго-востоке республики продолжается уборка урожая зерновых культур. На наблюдаемых полях у озимых и яровых зерновых культур в основном отмечается фаза развития «восковая спелость» - «полная спелость», в горных местностях в окрестности метеостанции Лепсы Алакольского района «колошение». Отдельные районы к концу декады приступили к уборочным работам.

Состояние теплолюбивых культур (рис, кукуруза на зерно, сахарная свекла, соя, хлопчатник) отличное и хорошее, проводится вегетационный полив. На юге и юго-востоке страны в яблоневых садах отмечается фаза развития «формирование плодов» - «созревание плодов». Состояние плодовых культур отличное и хорошее. В южных областях продолжается укос трав люцерны и эспарцета.

На последний день декады скот на пастбищах выпасался повсеместно. В Курмангазинском районе Атырауской области продолжаются ветеринарные мероприятия. На западе и в центре фермеры продолжают подвоз кормов. Уборка трав на пастбищах продолжается в Алгинском районе Актюбинской области, в Кызылкогинском районе Атырауской области, в Каратальском

районе области Жетісу, в Сырымском, Джаныбекском и Акжайкском районах Западно-Казахстанской области, в Мангистауском районе Мангистауской области.

Во второй декаде июля по результатам наблюдений за влажностью почвы оптимальные и удовлетворительные запасы влаги в метровом слое почвы в основном сложились на севере, западе, востоке, юге и юго-востоке, но в тоже время в отдельных районах отмечаются низкие показатели увлажнения, т.е. менее 50 % от НПВ (наименьшая полевая влагемкость). Иссущение верхнего пахотного слоя почвы отмечается на большей части территории страны.

2025 жылдың шілде айының 2-ші онкүндігіне қысқаша агрометеорологиялық шолу

Шілденің екінші онкүндігінде елдің астық егетін аймақтарында ауаның орташа температурасы көбінесе нормаға жуық және нормадан төмен, батыста нормадан жоғары болған, жауын-шашын нормадан аз түскен, тек Шығыс Қазақстан облысында нормаға шамасында байқалған.

Республиканың солтүстігінде жаздық дәнді дақылдарда «гүлдену» - «масақтану» даму фазалары, жеке аудандарда «дәннің сүттенуі» байқалған. Жаздық бидайдың жағдайы көбінесе жақсы және өте жақсы, кейбір жерлерде қанағаттанарлық. Егістіктерді зиянкестерге, ауруларға және арамшөптерге қарсы гербицидтермен және улы химикаттармен өңдеу жүргізген.

Батыста жаздық бидай дақылдарында «гүлдену» - «дәннің сүттенуі» және «дәннің уыздануы», кейбір егістерде «толық пісу» даму фазалары байқалған. Көктемгі арпаның жағдайы көбінесе жақсы және қанағаттанарлық.

Шығыста Абай облысының Бородулиха және Ұржар аудандарында жаздық бидай егістіктерінде «дәннің сүттенуі» - «дәннің уыздануы және толық пісу» даму фазалары байқалған, Бородулиха ауданының Дмитриевка метеостанциясының маңайында жаздық арпа егістіктерінде «толық пісу» даму фазасы байқалады, жаздық арпаның жағдайы өте жақсы. Шығыс Қазақстан облысында жаздық бидай егістіктерінде «масақтану» - «дәннің сүттенуі» даму кезеңі, Алтай ауданының Первороссийское агропосты және Ұлан ауданының Саратовка станциясы маңайларында «гүлдену» фазалары байқалады. Өсімдіктердің жағдайы өте жақсы және жақсы.

Елдің орталығында жаздық бидай дақылдарында «гүлдену» - «дәннің сүттенуі», жеке егістерде «дәннің уыздануы», кеш себілген егістіктерде «түйін тамырының пайда болуы» - «түптену» даму кезеңдері байқалады. Өсімдіктердің жағдайы көбінесе жақсы және қанағаттанарлық.

Республиканың оңтүстігі мен оңтүстік-шығысында дәнді дақылдарды жинау жалғасуда. Күздік және жаздық дәнді дақылдар бақыланатын егістерде көбінесе «дәннің уыздануы» - «толық пісу», Алакөл ауданы Лепсі метеостанциясының маңындағы таулы жерлерде «масақтану» фазалары байқалады. Онкүндіктің соңында жеке аудандарда егін жинау жұмыстарын бастаған.

Жылу сүйгіш дақылдардың жағдайы (күріш, дәнді жүгері, қант қызылшасы, соя, мақта) өте жақсы және жақсы, вегетациялық суару жұмыстары жүргізілуде. Елдің оңтүстігі мен оңтүстік-шығысында алма бақтарында «жемістердің қалыптасуы» - «жемістердің пісуі» даму фазалары байқалады. Жеміс дақылдарының жағдайы өте жақсы және жақсы. Оңтүстік аймақтарда жоңышқа мен эспарцет шөптерін шабу жалғасуда.

Шілденің екінші онкүндігінде топырақ ылғалдылығын бақылау нәтижелері бойынша топырақтың метрлік қабатында оңтайлы және қанағаттанарлық ылғал қоры көбінесе солтүстікте, батыста, шығыста, оңтүстікте және оңтүстік-шығыста қалыптасқан, бірақ сонымен бірге жеке аудандарда ылғалдың төмен көрсеткіштері байқалады, яғни топырақтың (ең аз далалық ылғал сыйымдылығы) 50%-дан төмен. Елдің көп аймағында топырақтың беткі қабатының құрғауы байқалады.