

Краткий агрометеорологический обзор за 2-ю декаду декабря 2025 года.

Во второй декаде декабря на юге и юго-востоке республики аномалия температуры воздуха была выше нормы на 2...4°C. В районах возделывания озимой пшеницы осадки выпали в основном больше нормы. Озимые зерновые культуры находились в состоянии зимнего покоя.

В Алматинской области в районах возделывания озимой пшеницы минимальная температура воздуха составила минус 16...20°C, а минимальная температура узла кущения озимой пшеницы понижалась до минус 2°C. В течение всей декады озимые находились под снежным покровом высотой 8-11 см. Глубина почвы промерзла от 3 см до 16 см.

В области Жетісу в районах возделывания озимых зерновых культур значение минимальной температуры воздуха составила минус 22...25°C. Высота снежного покрова составляла 10-18 см, глубина почвы промерзла до 11 см.

В Жамбылской области на посевах озимой пшеницы минимальная температура воздуха отмечалась минус 15...20°C и минимальная температура узла кущения озимой пшеницы составила в пределах 0°C. Высота снежного покрова в основном была менее 5 см, почва была талая, только в Кордайском районе почва промерзла до 7 см, Жуалинском и Байзакском районах до 1 см.

В районах возделывания озимых зерновых культур Туркестанской области минимальная температура воздуха составила минус 5...11°C, минимальная температура узла кущения озимой пшеницы минус 2°C. Почва в районах возделывания в основном была талая, лишь в окрестности метеостанции Шымкент почва промерзла до 3 см. Высота снежного покрова составила 3 см, лишь в Толембийском районе 9 см.

Агрометеорологические условия на юге и юго-востоке республики для зимовки озимых были удовлетворительными. Низких значений температуры воздуха и почвы, опасных для зимующих культур, не наблюдалось.

На последний день декады скот на пастбищах выпасался повсеместно. В Алгинском районе Актюбинской области и в Сырымском районе Западно-Казахстанской области скот перевели на стойловое содержание, в Мангистауском районе Мангистауской области животноводы подкармливают поголовье скота.

На пастбищах мерзлая дернина наблюдается в Алгинском районе Актюбинской области, в Жамбылском и Балхашском районах Алматинской области, в Кызылкогинском районе Атырауской области, в Жаныбекском и Сырымском районах Западно-Казахстанской области, в Актогайском районе Карагандинской области, в Аркалыкском районе Костанайской области и в Улытауском районе Улытауской области, на отдельных пастбищах на северо-западе отмечается сырая дернина.

На конец декады пастбища слабо стравлены на большей части в Актюбинской и Улытауской областях, умеренно стравлены пастбища в Балхашском районе Алматинской области, в Курмангазинском районе Атырауской области, в Каратальском районе области Жетісу, в Акжайыкском районе Западно-Казахстанской области и в Аркалыкском районе Костанайской области, сильно стравлены пастбища в Жамбылском районе Алматинской области, в Сырымском районе Западно-Казахстанской области и в Актогайском районе Карагандинской области.

**2025 ж ылдың ж елтоқсан айының 2-ші онкүндігіне қысқаша
агрометеорологиялық шолу.**

Желтоқсанның екінші онкүндігінде республиканың оңтүстігі мен оңтүстік-шығысында ауа температурасының нормадан 2...4°C жоғары болған. Күздік бидай өсірілетін аудандарда жауын-шашын нормадан көп түскен. Күздік дәнді бидай қысқы тыныштықта болған. Алматы облысының күздік бидай өсіретін аудандарында ауаның минималды температурасы минус 16...20°C дейін, ал бидайдың түптену түйіні тереңдігіндегі топырақтың минималды температурасы минус 2°C дейін төмендеген. Күздік дәнді бидай онкүндік бойы биіктігі 8-11 см қар жамылғысының астында болған. Топырақ тереңдігі 3 см 16 см дейін қатқан.

Жетісу облысында күздік дәнді дақылдар өсіретін аудандарында ауаның минималды температурасы минус 22...25°C болған. Қар жамылғысының биіктігі 10-18 см, топырақтың тереңдігі 11 см дейін қатқан.

Жамбыл облысында күздік бидай егістіктерінде ауа температурасының минималды температурасы минус 16...20°C және бидайдың түптену түйіні тереңдігіндегі топырақтың минималды температурасы 0°C шамасында болған. Қар жамылғысының биіктігі көбінесе 5 см аз, топырақ еріген күйде болған, тек Қордай ауданында топырақ 7 см дейін, Жуалы мен Байзақ аудандарында 1 см дейін қатқан.

Түркістан облысының күздік дәнді дақылдар себетін аудандарында ауаның минималды температурасы минус 5...11°C, бидайдың түптену түйіні тереңдігіндегі топырақтың минималды температурасы минус 2°C болған. Топырақ көбінесе еріген, тек Шымкент метеостанциясының маңайында топырақ 3 см дейін қатқан. Қар жамылғысының биіктігі 3 см, тек Төлеби ауданында 9 см болған.

Республиканың оңтүстігі мен оңтүстік-шығысында бидайдың қыстауына агрометеорологиялық жағдайлар қанағаттанарлық болған. Қыстайтын дақылдар үшін қауіпті ауа мен топырақ температурасының төменгі көрсеткіштері байқалмаған.

Онкүндіктің соңғы күні жайылымдағы мал тегіс жайылған. Ақтөбе облысының Алға ауданында және Батыс Қазақстан облысының Сырым

ауданында мал қораларға ауыстырылған, Маңғыстау облысының Маңғыстау ауданында малшылар мал басын азықтандыруда.

Қатқақ шым Ақтөбе облысының Алға ауданында, Алматы облысының Жамбыл және Балқаш аудандарында, Атырау облысының Қызылқоға ауданында, Батыс Қазақстан облысының Жәнібек және Сырым аудандарында, Қарағанды облысының Ақтоғай ауданында, Қостанай облысының Арқалық ауданында және Ұлытау облысының Ұлытау ауданында байқалған, солтүстік-батыстың жеке жайылымдарында шым дымқыл байқалған.

Онкүндіктің соңында Ақтөбе және Ұлытау облыстарының басым бөлігінде шым әлсіз тапталған, бірқалыпты тапталған Алматы облысының Балқаш ауданында, Атырау облысының Құрманғазы ауданында, Жетісу облысының Қаратал ауданында, Батыс Қазақстан облысының Ақжайық ауданында және Қостанай облысының Арқалық ауданында, Алматы облысының Балқаш ауданында, Қостанай облысының Арқалық ауданында жайылымдар қатты тапталған.