

Краткий агрометеорологический обзор за 2 декаду января 2026 года.

Во второй декаде января на юге и юго-востоке республики аномалия температуры воздуха была положительной и составила 1...5°C, лишь в области Жетісу аномалия была минус 1...2°C. В районах возделывания озимой пшеницы осадки выпали в основном больше нормы, и только в области Жетісу меньше нормы. Озимые зерновые культуры по-прежнему находились в состоянии зимнего покоя.

В Алматинской области в районах возделывания озимой пшеницы наблюдалось понижение минимальной температуры воздуха до минус 18...22°C, минимальная температура на глубине узла кущения озимой пшеницы составила минус 6°C. В районах возделывания озимой пшеницы количество осадков выпало больше нормы 9-13 мм (133-159% от нормы). Высота снежного покрова увеличилась до 8-13 см, глубина промерзания составила 18-45 см.

В области Жетісу в районах возделывания озимых зерновых культур минимальная температура воздуха понижалась до минус 24...28°C, местами до минус 19°C. Высота снежного покрова составляет 7-17 см, а глубина промерзания почвы 23-35 см. Осадки выпали меньше нормы 1-5 мм (до 50 % от нормы).

В Жамбылской области на посевах озимой пшеницы минимальная температура воздуха составила минус 12...19°C, минимальная температура почвы на глубине залегания узла кущения плюс 3°C. С выпадением осадков в основном больше нормы 16-29 мм (198-235% от нормы), образовался снежный покров высотой 10-14 см. На последний день декады почва промерзла в основном до глубины 3-18 см, но местами оставалась талой.

В районах возделывания озимых зерновых культур Туркестанской области минимальная температура воздуха составила минус 5...11°C, минимальная температура на глубине узла кущения озимой пшеницы минус 3°C, почва в основном была талая, лишь местами промерзла до глубины 1-3 см, высота снежного покрова составила 9-11 см. Осадков выпало в основном больше среднегодовых значений 15-35 мм (108-206% от нормы).

Агрометеорологические условия на юге и юго-востоке республики для зимовки озимых были удовлетворительными. Критических значений температуры воздуха и почвы, опасных для зимующих культур, не наблюдалось.

На последний день декады скот выпасался на большей части пастбищ, в Западно-Казахстанской области, а также в Алгинском районе Актюбинской области, в Аркалыкском районе Костанайской области скот остается на стойловом содержании, в Мангистауском районе Мангистауской области животноводы подкармливают поголовье скота.

На пастбищах мерзлая дернина наблюдается в Жамбылском и Балхашском районах Алматинской области, в Жаныбекском и Сырымском районах Западно-Казахстанской области, в Аркалыкском районе Костанайской области, в Таласском районе Жамбылской области, в Актогайском районе Карагандинской

области, в Каратальском районе области Жетісу и в Улытауском районе Улытауской области. На северо-западе и на отдельных пастбищах в Жамбылской и Мангистауской областей отмечается сырая дернина.

На конец декады пастбища слабо стравлены на большей части Актюбинской области, умеренная стравленность отмечается на отдельных пастбищах в Мангистауской, Алматинской областях, сильно стравлены пастбища на большей части Западно-Казахстанской области и на отдельных пастбищах в Карагандинской области.

2026 ж ыпдың қаңтар айының 2 онкүндігіне қысқаша агрометеорологиялық шолу.

Қаңтардың екінші онкүндігінде республиканың оңтүстігі мен оңтүстік-шығысында ауа температурасының аномалиясы оң болған $1...5^{\circ}\text{C}$, тек Жетісу облысында аномалия минус $1...2^{\circ}\text{C}$ болған. Күздік бидай өсіретін аудандарда жауын-шашын нормадан көп түскен, тек Жетісу облысында нормадан аз болған. Қысқы дәнді бидай әлі де қысқы тыныштықта.

Алматы облысында күздік бидай өсіретін аудандарда ауаның минималды температурасы минус $18...22^{\circ}\text{C}$ дейін төмендегені байқалады, күздік бидайдың түптену түйіні тереңдігіндегі топырақтың минималды температурасы минус 6°C болған. Күздік бидайды өсіретін аудандарында жауын-шашын мөлшері нормадан көп болған 9-13 мм (нормадан 133-159%). Қар жамылғысының биіктігі 8-13 см дейін өскен, топырақтың қату тереңдігі 18-45 см болған.

Жетісу облысында күздік дәнді бидай өсіретін аудандарда ауаның минималды температурасы минус $24...25^{\circ}\text{C}$ дейін төмендеген. Қар жамылғысының биіктігі 7-17 см, топырақтың қату тереңдігі 23-35 см. Жауын-шашын нормадан аз жауған 1-5 мм (нормадан 50% дейін).

Жамбыл облысында күздік бидай егістіктерінде ауаның минималды температурасы минус $12...19^{\circ}\text{C}$, күздік бидайдың түптену түйіні тереңдігіндегі топырақтың минималды температурасы плюс 3°C болған. Көбінесе 16-29 мм (нормадан 198-235%) нормадан көп жауған жауын-шашынмен, биіктігі 10-14 см қар жамылғысы пайда болған. Онкүндіктің соңғы күнінде топырақ көбінесе 3-18 см тереңдікке дейін қатқан, бірақ кейбір жерлерде еріген күйінде қалған.

Түркістан облысының күздік дәнді бидай өсіретін аудандарында ауаның минималды температурасы минус $5...11^{\circ}\text{C}$ болған, күздік бидайдың түптену түйіні тереңдігіндегі топырақтың минималды температурасы минус 3°C , топырақ көбінесе еріген, тек кейбір жерлерде 1-3 см тереңдікке дейін қатқан, қар жамылғысының биіктігі 9-11 см болған. Жауын-шашын көбінесе 15-35 мм орташа көпжылдық мәндерден (нормадан 108-206%) көп болған.

Республиканың оңтүстігі мен оңтүстік-шығысында күздік бидайдың қыстауына орын алған агрометеорологиялық жағдайлар қанағаттанарлық болған.

Қыстайтын дақылдар үшін қауіпті ауа мен топырақ температурасының критикалық мәндері байқалмаған.

Онкүндіктің соңғы күні жайылымдардың басым бөлігінде мал жайылған, Батыс Қазақстан облысында, сондай-ақ Ақтөбе облысының Алға ауданында, Қостанай облысының Арқалық ауданында малдарды қораларда ұстауда, Маңғыстау облысының Маңғыстау ауданында малшылар мал басын азықтандыруда.

Жайылымдарда қатқақ шым Алматы облысының Жамбыл және Балқаш аудандарында, Батыс Қазақстан облысының Жәнібек және Сырым аудандарында, Қостанай облысының Арқалық ауданында, Жамбыл облысының Талас ауданында, Қарағанды облысының Ақтоғай ауданында, Жетісу облысының Қаратал ауданында және Ұлытау облысының Ұлытау ауданында байқалады. Солтүстік-батыста және Жамбыл мен Маңғыстау облыстарының жеке жайылымдарында дымқыл шым байқалған.

Онкүндіктің соңында Ақтөбе облысының басым бөлігінде жайылымдар нашар тапталған, Маңғыстау, Алматы облыстарының жеке жайылымдарының бірқалыпты тапталуы байқалады, Батыс Қазақстан облысының басым бөлігінде және Қарағанды облысының жеке жайылымдарында жайылымдар қатты тапталған.