

Краткий агрометеорологический обзор за 3 декаду января 2026 года.

Во третьей декаде января на юге и юго-востоке республики аномалия температуры воздуха была положительной до плюс 7°C, в Кызылординской области минус 3°C и в предгорной местности Туркестанской области в пределах нормы аномалия минус 1°C. В районах возделывания озимой пшеницы осадки выпали в основном около нормы, в области Жетісу и Алматинской области меньше нормы. В Туркестанской области на отдельных наблюдаемых участках озимой пшеницы отмечаются всходы (станции Казыгурт, Тасарык, Шымкент), на метеостанции Аул Т. Рыскулова 3-й лист.

В Алматинской области в районах возделывания озимой пшеницы наблюдалось понижение минимальной температуры воздуха до минус 15...19°C, минимальная температура узла кущения озимой пшеницы составила минус 5°C. В районах возделывания озимой пшеницы количество осадков выпало меньше нормы 3-4 мм (33-62% от нормы). Высота снежного покрова составила 9-12 см, глубина промерзания 31-49 см.

В области Жетісу в районах возделывания озимых зерновых культур минимальная температуры воздуха составила минус 15...21°C, высота снежного покрова 7-25 см, глубина промерзания почвы 18-55 см. Осадки выпали меньше нормы 4-6 мм (60% от нормы).

В Жамбылской области на посевах озимой пшеницы минимальная температура воздуха составила минус 10...20°C, минимальная температура почвы на глубине залегания узла кущения минус 3°C. С выпадением осадков в основном около нормы 5-9 мм (71-116% от нормы), образовался снежный покров высотой до 10 см. На последний день декады почва промерзла до глубины 3-16 см, местами почва была талой.

В районах возделывания озимых зерновых культур Туркестанской области минимальная температура воздуха составила минус 9...16°C, минимальная температура на глубине узла кущения озимой пшеницы минус 2°C, почва в основном была талая, лишь местами почва промерзла до глубины 1 см, высота снежного покрова составила 2-7 см. Осадков выпало в основном около среднегодовых значений 15-41 мм (56-112% от нормы).

Результаты определения жизнеспособности растений по состоянию на 20 января показали, что в результате вымерзания в Жамбылской области в среднем погибло 2-5% посевов озимой пшеницы в окрестностях метеостанции Мерке Меркенского района, Нурлыкент Жуалинского района и агрометеорологического поста Сарыкемер Байзакского района, 7-9% посевов повреждено на метеостанции Толеби Шуского района и в районе поста Кордай Кордайского района, растения находились в фазах «проращение зерна», «всходы» и «3-лист».

В Западно-Казахстанской области в окрестности поста Переметное района Байтерек в результате вымерзания погибло 8% посевов озимой пшеницы, при отборе проб верхний слой почвы был мерзлым, высота снега 21 см.

В Туркестанской области и в области Жетісу состояние зимующих культур хорошее, повреждение с/х культур не установлено.

В Алматинской и области Жетісу отращивание проб зимующих культур продолжается, результаты будут представлены в следующем бюллетене.

На последний день декады скот выпасался на большей части пастбищ, в Западно-Казахстанской области, а также в Алгинском районе Актюбинской области. В Аркалыкском районе Костанайской области скот продолжает оставаться на стойловом содержании, в Мангистауском районе Мангистауской области животноводы подкармливают поголовье скота. Мерзлая дернина наблюдается на пастбищах в Алматинской, Западно-Казахстанской, Костанайской областях, а также на отдельных пастбищах в Карагандинской, Улытауской областях и области Жетісу, сырая дернина отмечалась в Актюбинской и Мангистауской областях. На конец декады пастбища слабо стравлены на большей части Актюбинской области, умеренная стравленность отмечается на отдельных пастбищах в Мангистауской, Алматинской областях, сильно стравлены пастбища на большей части Западно-Казахстанской области и на отдельных пастбищах в Карагандинской области.

2026 ж ыпдың қаңтар айының 3 онкүндігіне қысқаша агрометеорологиялық шолу.

Қаңтардың үшінші онкүндігінде республиканың оңтүстігінде және оңтүстік-шығысында ауа температурасының аномалиясы плюс 7°C дейін оң болған, Қызылорда облысында минус 3°C және Түркістан облысының тау бөктерінде ауа температурасының аномалиясы минус 1°C норма шамасында байқалған. Түркістан облысының күздік бидай бақыланатын жеке учаскелерінде көктеу (Қазығұрт, Тасарық, Шымкент станциялары), ауыл Т.Рысқұлов метеостанциясы жанында 3-ші жапырақ фазалары байқалған.

Алматы облысында күздік бидай себілетін аудандарда ауаның минималды температурасы минус 15...19°C дейін төмендеген, күздік бидайдың түптену түйіні тереңдігіндегі топырақтың минималды температурасы минус 5°C болған. Күздік бидай өсірілетін аудандарында жауын-шашын мөлшері нормадан аз болған 3-4 мм (нормадан 33-62%). Қар жамылғысының биіктігі 9-12 см, топырақтың қату тереңдігі 31-49 см болған.

Жетісу облысында күздік бидай өсірілетін аудандарда ауаның минималды температурасы минус 15...21°C, қар жамылғысының биіктігі 7-25 см, топырақтың қату тереңдігі 18-55 см құраған. Жауын-шашын нормадан аз түскен 4-6 мм (нормадан 60%).

Жамбыл облысында күздік бидай егістіктері аймақтарында ауаның минималды температурасы минус 10...20°C, күздік бидайдың түптену түйіні тереңдігіндегі топырақтың минималды температурасы минус 3°C болған. Биіктігі 10 см дейінгі қар жамылғысы көбінесе норма шамасында жауған 5-9 мм (нормадан 71-116%) жауын-шашынмен қалыптасқан. Онкүндіктің соңғы күнінде топырақ 3-16 см тереңдікке дейін қатып, кейбір жерлерде топырақ еріген.

Түркістан облысының күздік дәнді бидай өсіретін аудандарында ауаның минималды температурасы минус 9...16°C, күздік бидайдың түптену түйіні тереңдігіндегі топырақтың минималды температурасы минус 2°C құраған, топырақ көбінесе еріген, тек кейбір жерлерде топырақ 1 см тереңдікке дейін қатып, қар жамылғысының биіктігі 2-7 см болған. Жауын-шашын көбінесе 15-41 мм (нормадан 56-112%) яғни орташа көпжылдық мәндерге жуық жауған.

20 қаңтарда жасалған бақылау бойынша өсімдіктердің қысқа төзімділігін анықтау нәтижелері Жамбыл облысында үсік салдарынан Мерке ауданының Мерке метеостанциясы, Жуалы ауданының Нұрлыкент метеостанциясы және Байзақ ауданының Сарыкемер агрометеорологиялық бекеті маңайларында күздік бидай егістігі орта есеппен 2-5%, Шу ауданының Төлеби метеостанциясы мен Қордай ауданының Қордай бекеті маңындағы егістіктердің 7-9% үсікке шалдыққанын көрсеткен, өсімдіктер «дәннің өнуі», «көктеу» және «3-жапырақ» фазаларында болған.

Батыс Қазақстан облысында Бәйтерек ауданының Переметное агрометеорологиялық бекетінің маңайында үсікке шалу нәтижесінде күздік бидайдың 8% үсікке шалдыққан, сынама алу кезінде топырақтың жоғарғы қабаты қатқақ болып, қардың биіктігі 21 см құраған.

Түркістан және Жетісу облыстарында қыстайтын дақылдардың жағдайы жақсы, а/ш дақылдарының зақымдануы анықталмаған.

Алматы және Жетісу облыстарында қыстайтын дақылдар сынамаларын өсіру жалғасуда, нәтижелері келесі бюллетеньде ұсынылатын болады.

Онкүндіктің соңғы күні жайылымдардың басым бөлігінде мал жайылымда болған, Батыс Қазақстан облысында, сондай-ақ Ақтөбе облысының Алға ауданында. Қостанай облысының Арқалық ауданында малдарды қораларда ұсталуда, Маңғыстау облысының Маңғыстау ауданында малшылар мал басын азықтандыруда. Қатқақ шым Алматы, Батыс Қазақстан, Қостанай облыстарының жайылымдарында, сондай-ақ Қарағанды, Ұлытау облыстары мен Жетісу облысының жеке жайылымдарында байқалады, дымқыл шым Ақтөбе және Маңғыстау облыстарында орын алған. Онкүндіктің соңында Ақтөбе облысының басым бөлігінде жайылымдар әлсіз тапталған, Маңғыстау, Алматы облыстарының жеке жайылымдарында бірқалыпты тапталу байқалады, Батыс Қазақстан облысының басым бөлігінде және Қарағанды облысының жеке жайылымдарында жайылымдар қатты тапталған.